

ณัฐวดี ภูคำ 2551: ความหลากหลายชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดในน่านน้ำไทย
ทะเลอันดามัน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สาขา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประธานกรรมการที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัทรจินดา, M.S. 247 หน้า.

ความหลากหลายชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดในน่านน้ำไทยทะเลอันดามัน จำนวน 142
สถานี เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงพฤษภาคม 2550 โดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาด
ช่องตา 330 ไมโครเมตร ลากทั้งในแนวราบ แนวตั้ง และแนวเฉียง พบคาลานอยด์โคพีพอด
ทั้งหมด 80 ชนิด 28 สกุล โดยเป็นชนิดที่รายงานครั้งแรกในน่านน้ำไทย ทะเลอันดามัน 59 ชนิด
25 สกุล ในจำนวนนี้เป็นชนิดที่รายงานครั้งแรกในน่านน้ำไทย (อ่าวไทยและทะเลอันดามัน) 19
ชนิด 9 สกุล ได้แก่ *Centropages calaninus* (Dana), *C. elongatus* Giesbrecht, *Euchaeta rimana*
Bradford, *E. wolfendeni* A. Scott, *Haloptilus spiniceps* (Giesbrecht), *Labidocera pectinata*
Thompson & Scott, *L. bengalensis* Krishnaswamy, *Pontella danae* Giesbrecht, *P. diagonalis*
Wilson, *P. fera* Dana, *P. investigatoris* Sewell, *P. spinipes* Giesbrecht, *P. valida* Dana, *Pontellina*
morii Fleminger & Hulsemann, *Pontellopsis armata* (Giesbrecht), *P. krameri* (Giesbrecht), *P. scotti*
Sewell, *Rhincalanus cornutus* Dana และ *Scolecithrix danae* (Lubbock) และเป็นชนิดที่คาดว่าเป็น
ชนิดที่รายงานครั้งแรกในน่านน้ำไทยในสกุล *Labidocera* 3 ชนิด, *Pontella* 2 ชนิด และ
Pontellopsis 1 ชนิด

