



ภาพที่ 19 *Dactylosolen blavyanus* (H. Peragallo) Hasle (1)
Dactylosolen fragilissima (Bergon) Hasle (2-5)
Dactylosolen phuketensis (Sundström) Hasle (5-7)

- (1) เซลล์ตรง รอยต่อของแถบตรงกัน (LM)
- (2) ภาพวาดด้านगेठेठ
- (3-5) เซลล์ตรง ต่อกันเป็นสาย (LM)
- (6) ภาพวาดด้านगेठेठ เซลล์รูปทรงกระบอกโค้ง
- (7) (DIC), (8) เซลล์โค้ง ต่อกันเป็นสาย (LM)




ภาพที่ 20 *Guinardia cylindrus* (Cleve) Hasle (1-3)
Guinardia striata (Stolterfoh) Hasle (4-7)

- (1) ภาพวาดด้านगेठेठ
- (2) เซลล์ต่อกันเป็นสายตรง (LM)
- (3) *Rhichelia intracellularis* อาศัยอยู่ ภายในเซลล์ (LM)
- (4) ภาพวาดปลายเซลล์ด้านगेठेठ
- (5) เซลล์รูปทรงกระบอกโค้ง
- (6-7) เซลล์เรียงต่อกันเป็นสายโค้งหรือบิดเป็นเกลียวอย่างแน่น (LM)




ภาพที่ 21 *Guinardia flaccida* (Castracane) H. Peragallo (1-6)

- (1) ภาพวาดเซลล์ด้านเกอเดิล เห็นอินเตอร์คาลารีแบนด์รูปคอปกเลื้อ
- (2-3) ทั้งเซลล์ด้านเกอเดิล ต่างโพกัน (LM)
- (4) คลอโรพลาสต์ลักษณะกลมหรือเป็นพู มีไพรีนอยด์ (DIC)
- (5) เซลล์ต่อกันเป็นสายโค้ง (LM)
- (6) ส่วนหนึ่งของหน้าฝา เห็น process อยู่ใกล้ขอบฝา (SEM)



ภาพที่ 22 *Proboscia alata* (Brightwell) Sundström (1-6)


- (1, 2) ทั้งเซลล์ด้านเกอเดล (LM)
- (3) ส่วนปลายเซลล์ เห็นอินเตอร์คาลารีแบนด์ชัดเจน(LM),
- (4) ภาพวาดปลายเซลล์ด้านหนึ่ง
- (5) ส่วนปลายของเซลล์ที่พอม (LM)
- (6) ปลายวง (SEM)



ภาพที่ 23 *Pseudosolenia calcar avis* (Schultze) Sundström (1-6)

Rhizosolenia acuminata (H. Peragallo) H. Peragallo (7-8)

- (1) เซลล์ต่อกัน (DIC)
- (2) ภาพวาดบางส่วน of เซลล์
- (3) อินเตอร์คาลารีแบนด์มากกว่า 4 คอลัมน์ (LM)
- (4) (SEM), (5) ลักษณะของ process คล้ายอุ้งเล็บ ไม่มีโอทาเรีย (DIC)
- (6) ส่วนหนึ่งของเซลล์เห็นลักษณะการเรียงของ areolae (LM)
- (7) ภาพวาดปลายด้านหนึ่งของเซลล์ ทั้งด้านท้อง ด้านหลัง และ process
- (8) ทั้งเซลล์ด้านเกอเดิล (DIC)



ภาพที่ 24 *Rhizosolenia bergonii* H. Peragallo (1-3)

Rhizosolenia clevei Ostenfeld var. *clevei* Sundström (4-9)

- (1) ส่วนปลายของเซลล์ เห็น process แยกเป็น 2 แฉก (DIC)
- (2) ภาพวาดปลายด้านหนึ่งของเซลล์
- (3) ด้านเกอเดิล (DIC)
- (4) เซลล์ด้านท้อง (เอียงเล็กน้อย)
- (5) เซลล์ด้านหลัง
- (6) ส่วนปลาย เห็นส่วนท้อง และอินเตอร์คาลารีแบน เป็นเกล็ด (DIC)
- (7) *Rhichelia intracellularis* ที่อาศัยอยู่ในเซลล์
- (8-9) ปลายเซลล์เห็นรูปร่างของ proces (DIC)

