



ภาพที่ 25 *Rhizosolenia clevei* var. *communis* Sundström (1-7)

- (1-2) ภาพวาดเซลล์ด้านगेดเดิล เห็นอินเตอร์คาลารีแบนด์ชัดเจน (LM)
- (3) ลักษณะการต่อกันของเซลล์ (DIC)
- (4) *Rhizosolenia intracellularis* อาศัยอยู่ในเซลล์ของ *R. clevei* var. *communis* (LM)
- (5) ภาพขยายส่วนปลายเซลล์ (SEM)
- (6) ด้านหลัง (LM)
- (7) ด้านท้อง (LM)






ภาพที่ 26 *Rhizosolenia hyalina* Ostenfeld (1-5)

- (1) (DIC), (2-3) ทั้งเซลล์ด้านเกอเดิล (LM)
- (4) ลักษณะการต่อกันของเซลล์ (LM)
- (5) ภาพขยายส่วนปลายเซลล์ด้วยกล้อง SEM (SEM)



ภาพที่ 27 *Rhizosolenia imbricata* Brightwell (1-5)

- (1) ทั้งเซลล์ด้านเกอเดิล ช้าย ด้านท้อง-หลัง (DIC) กลางและขวาด้านข้าง (LM)
- (2) ลักษณะการต่อกันของเซลล์ (DIC)
- (3) ด้านข้างของปลายเซลล์ (LM)
- (4) ส่วนปลายของเซลล์ โฟกัสต่างกัน ให้เห็นด้านท้อง และลักษณะของ process (LM)
- (5) ลวดลายบนอินเทอร์คาลารีแบนด์ เป็นรูปตัว V คว่ำ (LM)







ภาพที่ 28 *Rhizosolenia pungens* Cleve-Euler (1-2)

Rhizosolenia robusta Normann (3-4)

Rhizosolenia setigera Brightwell (5-6)

- (1) ส่วนปลายของเซลล์ (LM)
- (2) ส่วนปลายของเซลล์ (SEM)
- (3) ภาพวาดเซลล์ด้านगेดเฒล
- (4) เซลล์ด้านगेดเฒล
- (5) ภาพวาดเซลล์ด้านगेดเฒล ด้านท่ง
- (6) เซลล์ด้านगेดเฒล (DIC)



ภาพที่ 29 *Rhizosolenia striata* Greville (1-3)

- (1) เซลล์ด้านเกอเดิล ช้าย (ด้านข้าง) กลางและขวา (ด้านท้อง-หลัง) (DIC)
- (2) ส่วนปลายของเซลล์ (LM)
- (3) ด้านข้างของปลายเซลล์ เห็นลักษณะของหน้าฝาได้ชัดเจน (SEM)

