

นิติมา ศาลากิจ 2552: ความหลากหลายทางชนิดของคาลานอยด์โคฟีพอดในอ่าวไทย
ตอนบน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประชานกรรมการที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนันท์ ภัทรจินดา, M.S. 188 หน้า

ความหลากหลายทางชนิดของคาลานอยด์โคฟีพอดบริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่างปี
พ.ศ. 2546-2551 ซึ่งเก็บตัวอย่างด้วยถุงพลาสติกต่อนขนาดช่องตา 200 และ 330 ไมโครเมตร ใน
แนวโค้งและแนวเฉียง จำนวน 132 สถานี พบทั้งสิ้น 42 ชนิด 15 สกุล 9 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีความ
หลากหลายทางชนิดสูงสุด คือ Pontellidae (25 ชนิด 5 สกุล) รองลงมา คือ Acartiidae (3 ชนิด 1
สกุล) และ Centropagidae (3 ชนิด 1 สกุล) สำหรับคาลานอยด์โคฟีพอดชนิดที่พบได้ทั่วไปมี 5
ชนิด ได้แก่ *Aartia amboinensis*, *A. erythraea*, *Centropages furcatus*, *C. orsinii* และ
Acrocalanus gibber และชนิดที่พบเฉพาะพื้นที่ (หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี) มี 7 ชนิด ได้แก่
Labidocera leavidentata, *Pontella latifurca*, *P. tridactyla*, *Pontella* sp.1, *Pontellopsis krameri*,
P. macronyx และ *Pontellopsis* sp.1 นอกจากนี้พบคาลานอยด์โคฟีพอดชนิดที่รายงานเป็น
ครั้งแรกในน่านน้ำไทย (ทะเลอันดามันและอ่าวไทย) 4 ชนิด คือ *Pontella forcicular*, *P. latifurca*,
P. tridactyla และ *P. verwoorti*