

ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. terminata* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	1.81	1.99	0.84
ทิศใต้ (S)	12.18	6.25	0.18
ทิศตะวันออก (E)	14.36	6.26	1.00
ทิศตะวันตก (W)	5.72	3.22	0.002

ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. apicalis* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	5.09	3.269	0.003
ทิศใต้ (S)	19.00	8.29	0.34
ทิศตะวันออก (E)	28.81	17.69	0.5
ทิศตะวันตก (W)	9.09	5.10	0.002

ตารางผนวกที่ 11 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. collina* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	2.27	2.32	0.01
ทิศใต้ (S)	7.54	4.03	0.68
ทิศตะวันออก (E)	9.36	3.72	1.00
ทิศตะวันตก (W)	5.00	1.94	0.01

ตารางผนวกที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. laeviceps* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ(N)	4.18	2.22	0.01
ทิศใต้(S)	10.54	5.73	0.78
ทิศตะวันออก(E)	12.90	6.95	0.50
ทิศตะวันตก(W)	5.72	2.19	0.03

ตารางผนวกที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. terminata* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	2.45	1.36	0.001
ทิศใต้ (S)	12.00	6.54	0.605
ทิศตะวันออก (E)	12.90	5.12	0.50
ทิศตะวันตก (W)	3.54	3.26	2.65

ตารางผนวกที่ 14 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. apicalis* ลงเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	9.36	4.27	0.18
ทิศใต้ (S)	22.18	14.09	0.17
ทิศตะวันออก (E)	15.45	13.03	0.50
ทิศตะวันตก (W)	9.36	5.10	0.20

ตารางผนวกที่ 15 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. collina* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	1.81	2.08	0.04
ทิศใต้ (S)	3.45	3.17	0.38
ทิศตะวันออก (E)	4.72	3.58	1.06
ทิศตะวันตก (W)	1.81	1.94	0.005

ตารางผนวกที่ 16 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. laeviceps* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ(N)	4.18	2.27	0.024
ทิศใต้(S)	9.09	6.00	0.2ค
ทิศตะวันออก(E)	13.72	12.85	1.00
ทิศตะวันตก(W)	4.00	4.10	0.02

ตารางผนวกที่ 17 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. terminata* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	4.54	1.36	0.0008
ทิศใต้ (S)	16.36	6.54	0.458
ทิศตะวันออก (E)	19.90	5.12	1.000
ทิศตะวันตก (W)	4.36	3.26	0.005

ตารางผนวกที่ 18 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. apicalis* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	5.18	3.68	0.003
ทิศใต้ (S)	19.54	10.82	0.766
ทิศตะวันออก (E)	23.09	17.49	0.856
ทิศตะวันตก (W)	6.00	4.66	0.079

ตารางผนวกที่ 19 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. collina* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	3.81	3.60	0.01
ทิศใต้ (S)	9.27	2.61	0.70
ทิศตะวันออก (E)	10.18	7.40	1.00
ทิศตะวันตก (W)	3.36	1.53	0.011

ตารางผนวกที่ 20 เปรียบเทียบความแตกต่างทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. laeviceps* ลงเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	5.00	3.57	0.017
ทิศใต้ (S)	15.00	6.92	0.858
ทิศตะวันออก (E)	15.81	13.34	1.00
ทิศตะวันตก (W)	6.90	6.09	0.057

ตารางผนวกที่ 21 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. terminata* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	4.27	4.59	0.009
ทิศใต้ (S)	7.36	9.53	0.126
ทิศตะวันออก (E)	11.81	12.28	1.00
ทิศตะวันตก (W)	6.36	3.04	0.048

ตารางผนวกที่ 22 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. apicalis* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	4.72	3.08	0.0001
ทิศใต้ (S)	15.81	10.89	0.130
ทิศตะวันออก (E)	20.81	17.49	1.00
ทิศตะวันตก (W)	7.27	4.66	0.0026

ตารางผนวกที่ 23 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. collina* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	4.18	3.60	0.006
ทิศใต้ (S)	5.36	2.61	0.026
ทิศตะวันออก (E)	8.09	7.40	1.00
ทิศตะวันตก (W)	5.27	3.44	0.047

ตารางผนวกที่ 24 เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศต่าง ๆ ในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ ที่ชั้นโรงชนิด  
*T. laeviceps* ลงดอกเวลา 07.00 - 18.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

ทิศ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t
เหนือ (N)	4.63	3.57	0.005
ทิศใต้ (S)	8.27	6.92	0.194
ทิศตะวันออก (E)	11.63	13.34	1.00
ทิศตะวันตก (W)	5.18	6.09	0.010