

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกาวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคคอตีบ ที่มารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจจักษุ แผนกผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ป่วยโรคคอตีบที่มารับการตรวจรักษาระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 จำนวน 159 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางชีวสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคคอตีบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ได้แก่ ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว ต่อเดือน 2) ปัจจัยภายในตัวบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคคอตีบ ได้แก่ เจตคติต่อการดูแลตนเอง การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 3) ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคคอตีบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01

The objective of this descriptive research was to study factors influencing the self-care behaviors of glaucoma patients receiving care at Ophthalmology clinic, Out patient department of Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital. The samples are qualified 159 glaucoma patients who got follow up treatments on schedule at out patients ophthalmology clinic between December 2005 to January 2006. Data were collected by purposive sampling. The data were collected by using questionnaires and developed by the researcher and quality test was accepted. The data were analyzed by SPSS program with statistical method consisting of percentage, mean, standard deviation, Chi-square test and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results showed that 1) The bio-social factors which had significant relationship with self-care behaviors in Glaucoma patients were amount of education and income at the .01 level 2) The internal factors that had significant relationship with self-care behaviors in Glaucoma patients were attitude toward the disease, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived barriers and self-care respectively at the .01 level 3) Social support factors had significant relationship with self-care behaviors in Glaucoma patients at the .01 level