

จรัสศรี วันเพ็ญ 2550: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ปรธานกรรมการที่ปรึกษา:
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ชีรเวชเจริญชัย, วท.ม. 161 หน้า

การวิจัยเชิงสำรวจเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 445 คน
ได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และ
สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ปัจจัยนำซึ่งได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ทศนคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมป้องกันโรค การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการป้องกัน
โรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติใน
การป้องกันโรค ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับปัจจัยอื่น
ซึ่งได้แก่ การมีแหล่งบริการสุขภาพและนโยบายของโรงเรียนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
มีผลทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยเสริม ซึ่งได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การได้รับ
การกระตุ้นเตือนจากครูอนามัย และประสบการณ์จากการเจ็บป่วยหรือคนรอบข้างที่ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ปัจจัยทางชีวสังคม ซึ่งได้แก่ ที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาของบิดา
มารดาของนักเรียน และรายได้ของครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ลายมือชื่อนิสิต



ลายมือชื่อประธานกรรมการ

๕ / ๑๗ / ๕๐

Charassri Wanpen 2007: Factors Affecting Dengue Haemorrhagic Fever Prevention Behaviors of Lower Secondary Students in Pathum Thani Province. Master of Science (Health Education), Major Field: Health Education, Department of Physical Education. Thesis Advisor: Associate Professor Supat Teravecharoenchai, M.Sc. 161 pages.

The objectives of this survey research study was to determine factors affecting Dengue Haemorrhagic Fever prevention behaviors of Lower Secondary Students in Pathum Thani province. Samples were 445 students obtained by multistage random sampling method. The questionnaires constructed by the researcher were used for data collection. The data analysis was made by computer program. The relationship between the variables and prevention behaviors for Haemorrhagic Fever of Lower Secondary students were analyses for percentage, mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Stepwise method.

The results were as follows: Prevention behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever among the Lower Secondary Students were at a moderate level. The Predisposing factors namely knowledge about Dengue Haemorrhagic Fever, the attitude towards a preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever; perceived susceptibility; perceived benefits had significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever at a .01 level; perceived severity had significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever. While perceived barriers had no significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever. The Enabling factors namely the availability of health facilities and policy of schools for Dengue Haemorrhagic Fever had significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever at a .05 level. The Reinforcing factors namely peer group advocacy, information received concerned Dengue Haemorrhagic Fever warning from health education teacher, and personal illness experience or surrounding individuals with Dengue Haemorrhagic Fever had significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever at a .01 and a .05 levels respectively. The biosocial factors namely living area, education of parent, family's income had significant relationship with preventive behaviors for Dengue Haemorrhagic Fever at a .05 level.

CHARASSRI WANPEN

Student's signature

Supat Teravecharoenchai

Thesis Advisor's signature

12 / 02 / 07