

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่มาได้รับการรักษาด้วยการยับยั้งการคลอด ที่ห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และครอบครัวซึ่งหมายถึงสามีของหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีสถานภาพเป็นย่าหรือยายของบุตรที่จะเกิดจากหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โดยเลือกคนใดคนหนึ่ง ที่ใกล้ชิดกับหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมากที่สุด จำนวน 40 คู่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการตั้งครรภ์ของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของสามีและหญิงที่มีสถานภาพเป็นย่าหรือยาย แนวคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเป็นเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

1. แรงจูงใจ กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการรักษา
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด รับรู้ว่าอายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนด แต่ไม่ทราบว่าจะคลอดได้เมื่อไร รับรู้ว่าการของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ถูกต้อง รับรู้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสคลอดก่อนกำหนด และปฏิเสธว่าการรับรู้หาหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสกลับเป็นซ้ำหรือไม่
3. การรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและครอบครัวรับรู้ว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์
4. การรับรู้อุปสรรคของการรักษา กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง และระยะทางไกล แม้จะไม่มียานพาหนะของตนเอง รับรู้ว่ามีอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รับรู้ว่าไม่มีอุปสรรคเรื่องภาระหน้าที่และความยุ่งยากต่าง ๆ
5. การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา รับรู้เรื่องการรักษาว่าเป็นการรักษาเพื่อยับยั้งการคลอด และรับรู้ว่าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้บางอย่าง
6. ประสบการณ์และความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างปฏิเสธว่าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อน ไม่มีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องอาหารแสลงระหว่างตั้งครรภ์ ไม่มีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการปฏิบัติขณะตั้งครรภ์

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและรักษาการเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีการรับรู้ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดูแลหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ทั้งขณะอยู่ที่โรงพยาบาล และเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้ว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินการรับรู้ของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและครอบครัว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ได้จนครบกำหนด

This is a descriptive research, that it has the object to study a perception of the preterm labor pregnancy and her family about the preterm labor. The sample groups were the woman with preterm labor that she treats for inhibit labor in the labor room at Khonkaen center hospital and her relative, such as a husband, grandmother, one's maternal grandmother by selected someone which they were most closely with her. We used 40 people to sample by choose a purposive Sampling. The tools for researched were a memo data and a preterm labor pregnancy data. The memo data of her husband, grandmother and one's maternal grandmother. The questionnaire was point to open about the perception of a preterm labor pregnancy and her family. Used a quality of frequency and percentage to analysis. The result should conclusion as following.

1. Motivate about they need a child, the sample group they have motivated to treat.
2. The Perceive susceptibility to preterm labor: They perceived the cause about preterm labor. They perceived the gestational was not term, but they don't know when the pregnancies can delivery. They perceived the symptoms of preterm labor. The pregnancy women can perceived that she had chance to preterm delivery, and they perceived preterm labor it hasn't recur again.
3. The perceived severity of preterm labor: The sample groups, they can perceived about the child which preterm deliver don't physically strong of health.
4. The perceived barrier to treat: the sample group can perceive, it didn't problem to travel and distance although they haven't owner transport. They perceived barrier of a problem expense. They can perceive of complicate and responding didn't problem.
5. The perceive benefit to treat. the sample groups, they can perceive to treat for inhibit labor. The perceived was carrying out for some recommend from the doctor.
6. The experience and old believed of pregnant 's woman. The sample groups haven't experience before. They didn't believe a harmful food between pregnant and didn't believe the carry out until pregnant.

The result of researched to shown the pregnant women and her family could perceive of preterm labor very well. It was purpose for protection and treats of preterm labor and delivery but it has some problem to carry her until she stay at hospital and when she gone to home. Then the researcher gave the recommend for a nurse who could carry to evaluate of treat her and her family for bring the data add to carry her for continue pregnant to complete.