

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินรายปีในช่วงการเพาะปลูกกะหล่ำปลีปี พ.ศ. 2546 และ 2547

ปี	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	จำนวนวัน ฝนตก	ปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินจากแปลงทดลอง							
			CT		VG		NG		HD	
			มม.	% ของน้ำฝน	มม.	% ของน้ำฝน	มม.	% ของน้ำฝน	มม.	% ของน้ำฝน
2546	585.3	74	17.63	3.01	24.01	4.10	9.59	1.64	3.16	0.54
2547	940.5	97	6.61	0.70	4.88	0.52	2.38	0.25	0.69	0.07
เฉลี่ย	762.9		12.12	1.86	14.45	2.31	5.99	0.95	1.93	0.31
รวม		171								
% ลดลงจากปีแรก			62.51		79.68		75.18		78.16	

หมายเหตุ ฤดูเพาะปลูกกะหล่ำปลีปี พ.ศ. 2546 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม

ฤดูเพาะปลูกกะหล่ำปลีปี พ.ศ. 2547 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม

CT หมายถึง แปลงที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ VG หมายถึง แปลงแถบหญ้าแฝกแถวเดียว

NG หมายถึง แปลงแถบหญ้าธรรมชาติ HD หมายถึง แปลงคูรับน้ำขอบเขา