

ตารางผนวกที่ 38 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ช่วงได้	224	204	220	202	258	232	232	228	264	232	252	240	278	260	238	252	276	246	240	276
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	64	44	60	42	98	72	72	68	104	72	92	80	118	100	78	92	116	86	80	116
เฉลี่ย	3.20	2.20	3.00	2.10	4.90	3.60	3.60	3.40	5.20	3.60	4.60	4.00	5.90	5.26	3.90	4.60	5.80	4.53	4.00	6.44
เฉลี่ยรวม	2.63				3.88				4.35				4.92				5.19			

ตารางผนวกที่ 39 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ช่วงได้	220	230	224	208	240	240	228	224	240	260	228	230	244	246	230	230	254	230	240	216
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	60	70	64	48	80	80	68	64	80	100	68	70	84	86	70	70	94	70	80	56
เฉลี่ย	3.00	3.50	3.20	2.40	4.00	4.00	3.40	3.20	4.00	5.00	3.58	3.50	4.20	4.53	3.89	3.68	4.70	4.12	4.71	3.11
เฉลี่ยรวม	3.03				3.65				4.02				4.07				4.16			

ตารางผนวกที่ 40 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ช่วงได้	220	208	202	210	218	210	203	211	201	224	205	214	218	218	206	208	214	218	214	212
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	60	48	42	50	58	50	43	51	41	64	45	54	58	58	46	48	54	58	54	52
เฉลี่ย	3.00	2.40	2.10	2.50	2.90	2.50	2.15	2.55	2.28	3.20	2.37	2.70	3.63	2.90	2.42	2.53	3.86	3.05	2.84	3.06
เฉลี่ยรวม	2.50				2.53				2.64				2.87				3.20			

ตารางผนวกที่ 41 น้ำหนักของกุ่มฝอย (กรัม) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ช่วงได้	68	72	68	76	70	68	68	74	71	70	70	70	66	68	66	64	65	61	61	61
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	8	12	8	16	10	8	8	14	11	10	10	10	6	8	6	4	5	1	1	1
เฉลี่ย	0.40	0.60	0.40	0.80	0.53	0.42	0.44	0.82	0.58	0.53	0.56	0.63	0.38	0.67	0.35	0.36	0.63	0.33	0.33	0.50
เฉลี่ยรวม	0.55				0.55				0.57				0.44				0.45			

ตารางผนวกที่ 42 น้ำหนักของกุ้งฝอย (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีโนโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	70	68	66	70	70	72	72	72	70	66	76	70	68	62	74	66	63	64	68	68
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	10	8	6	10	10	12	12	12	10	6	16	10	8	2	14	6	3	4	8	8
เฉลี่ย	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.43	0.80	0.53	0.73	0.20	0.70	0.33	0.43	0.40	0.40	0.44
เฉลี่ยรวม	0.43				0.58				0.56				0.49				0.42			

ตารางผนวกที่ 43 น้ำหนักของกุ้งฝอย (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีโนโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	71	68	70	67	72	70	68	75	72	74	70	72	68	70	70	70	64	68	70	72
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	11	8	10	7	12	10	8	15	12	14	10	12	8	10	10	10	4	8	10	12
เฉลี่ย	0.55	0.40	0.50	0.35	0.60	0.50	0.40	0.75	0.71	0.70	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.29	0.44	0.63	0.60
เฉลี่ยรวม	0.45				0.56				0.63				0.50				0.49			

ตารางผนวกที่ 44 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซังได้	110	112	112	112	112	112	110	110	114	114	112	113	110	106	114	112	122	104	110	110
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	50	52	52	52	52	52	50	50	54	54	52	53	50	46	54	52	62	44	50	50
เฉลี่ย	2.50	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.63	2.50	2.70	2.70	2.74	2.65	2.50	2.56	2.84	2.60	3.10	2.59	2.63	2.50
เฉลี่ยรวม	2.58				2.58				2.70				2.62				2.70			

ตารางผนวกที่ 45 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซังได้	108	114	130	114	108	114	126	112	110	114	120	110	106	114	124	110	104	116	122	108
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	48	54	70	54	48	54	66	52	50	54	60	50	46	54	64	50	44	56	62	48
เฉลี่ย	2.40	2.70	3.50	2.70	2.40	2.70	3.30	2.60	2.50	2.70	3.16	2.50	2.30	2.70	3.37	2.50	2.20	2.80	3.44	2.53
เฉลี่ยรวม	2.83				2.75				2.71				2.72				2.74			

ตารางผนวกที่ 46 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ในแปลงปลูกผักกาดหอม

	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซังได้	140	110	121	117	142	118	124	109	138	120	122	112	140	118	122	108	145	122	114	109
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	80	50	61	57	82	58	64	49	78	60	62	52	80	58	62	48	85	62	54	49
เฉลี่ย	4.00	2.50	3.05	2.85	4.10	2.90	3.37	2.58	3.90	3.00	3.26	2.74	4.00	2.90	3.26	2.53	4.25	3.10	2.84	2.58
เฉลี่ยรวม	3.10				3.24				3.23				3.17				3.19			

