

ตารางผนวกที่ 15 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มควบคุม ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	168	171	170	167	171	176	172	168	173	176	175	170	174	178	176	174	180	185	178	178
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	8	11	10	7	11	16	12	8	13	16	15	10	14	18	16	14	20	25	18	18
เฉลี่ย	0.80	1.10	1.00	0.70	1.10	1.60	1.20	0.80	1.30	1.78	1.50	1.00	1.40	2.00	1.60	1.40	2.50	3.13	2.00	2.25
เฉลี่ยรวม	0.90				1.18				1.39				1.60				2.47			

ตารางผนวกที่ 16 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปิโนซาด 0.1 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	170	168	169	167	172	168	173	168	175	170	171	172	176	176	173	170	182	185	175	172
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	10	8	9	7	12	8	13	8	15	10	11	12	16	16	13	10	22	25	15	12
เฉลี่ย	1.00	0.80	0.90	0.70	1.20	0.89	1.44	0.80	1.50	1.11	1.22	1.20	1.60	1.78	1.44	1.25	2.44	2.78	1.67	1.50
เฉลี่ยรวม	0.85				1.08				1.26				1.52				2.10			

ตารางผนวกที่ 17 น้ำหนักของปลานิล (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปีนโนแซด 1.0 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	168	169	170	169	170	170	170	173	170	173	172	174	173	175	173	174	185	180	185	185
น้ำ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
น้ำหนัก	8	9	10	9	10	10	10	13	10	13	12	14	13	15	13	14	25	20	25	25
เฉลี่ย	0.80	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00	1.30	1.20	1.40	1.44	1.50	1.44	1.56	2.78	2.50	2.78	3.57
เฉลี่ยรวม	0.90				1.08				1.23				1.49				2.91			

ตารางผนวกที่ 18 น้ำหนักของกุ้งฝอย (กรัม) กลุ่มควบคุม ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	65	67	65	65	65	68	65	65	64	64	66	66	64	62	64	64	64	62	64	64
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	5	7	5	5	5	8	5	5	4	4	6	6	4	2	4	4	4	2	4	4
เฉลี่ย	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50	0.80	0.50	0.50	0.44	0.50	0.60	0.67	0.50	0.33	0.50	0.57	0.57	0.40	0.57	0.57
เฉลี่ยรวม	0.55				0.58				0.55				0.48				0.53			

ตารางผนวกที่ 19 น้ำหนักของกุ้งฝอย (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปีนโนแซด 0.1 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	64	66	64	64	64	66	64	64	64	64	63	63	63	64	62	63	62	63	62	62
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	4	6	4	4	4	6	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	2	3	2	2
เฉลี่ย	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.44	0.33	0.33	0.43	0.50	0.29	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33
เฉลี่ยรวม	0.45				0.45				0.38				0.39				0.36			

ตารางผนวกที่ 20 น้ำหนักของกุ้งฝอย (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปีนโนแซด 1.0 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ชั่งได้	66	64	65	65	66	64	65	65	65	64	64	64	65	64	64	64	65	64	61	62
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	6	4	5	5	6	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	1	2
เฉลี่ย	0.60	0.40	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.57	0.50	0.56	0.50	0.80	0.67	0.71	0.50	0.33	0.40
เฉลี่ยรวม	0.50				0.50				0.52				0.63				0.49			

ตารางผนวกที่ 21 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มควบคุม ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซังได้	78	80	80	80	80	80	80	80	78	81	81	82	78	76	80	74	78	76	78	74
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	18	20	20	20	20	20	20	20	18	21	21	22	18	16	20	14	18	16	18	14
เฉลี่ย	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.80	2.10	2.10	2.20	1.80	1.60	2.00	2.00	1.80	1.78	2.00	2.00
เฉลี่ยรวม	1.95				2.00				2.05				1.85				1.89			

ตารางผนวกที่ 22 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปีนโนแซด 0.1 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซังได้	80	81	81	79	80	80	80	79	80	78	78	78	76	76	78	74	74	74	78	74
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	20	21	21	19	20	20	20	19	20	18	18	18	16	16	18	14	14	14	18	14
เฉลี่ย	2.00	2.10	2.10	1.90	2.00	2.00	2.00	1.90	2.00	1.80	1.80	1.80	1.78	1.60	2.00	1.75	1.75	1.56	1.80	2.00
เฉลี่ยรวม	2.03				1.98				1.85				1.78				1.78			

ตารางผนวกที่ 23 น้ำหนักของหอยขม (กรัม) กลุ่มการทดลองที่มีสารสปีนโนแซด 1.0 ppm ในห้องปฏิบัติการ

	0 วัน				7 วัน				14 วัน				21 วัน				28 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
ซึ่งได้	80	80	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	78	78	76	68	74	74
น้ำ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก	20	20	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	18	18	16	8	14	14
เฉลี่ย	2.00	2.00	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.22	2.22	1.89	2.00	2.00	1.78	1.33	1.75	1.56
เฉลี่ยรวม	1.98				2.00				2.06				2.03				1.60			

