

ตารางผนวกที่ 28 ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	3.4	2.5	3.5	3.3	4.3	3.3	3.6	3.3	4.3	3.4	3.6	3.4	4.3	3.9	3.6	3.5	4.5	4.0	3.9	3.8
2	4.2	2.9	3.6	3.6	4.5	3.4	3.7	3.7	4.5	3.6	3.8	3.8	5.2	4.0	3.9	4.0	5.4	4.2	4.2	4.1
3	4.3	3.2	3.7	3.7	4.8	4.3	3.7	3.9	5.0	4.4	3.9	4.0	5.3	4.6	3.9	4.3	5.5	4.8	4.3	4.4
4	4.4	3.3	4.2	3.7	5.0	4.4	4.4	4.2	5.2	4.4	4.6	4.7	5.6	4.6	4.9	4.9	5.6	4.9	5.1	5.0
5	4.6	3.3	4.4	3.7	5.2	4.5	4.6	4.2	5.3	4.6	4.6	4.8	5.7	4.6	4.9	5.1	5.8	5.0	5.3	5.2
6	4.8	3.5	4.6	3.7	5.3	4.9	4.7	4.5	5.4	5.0	4.9	4.8	5.7	5.2	5.0	5.1	5.8	5.4	5.6	5.2
7	4.8	4.2	4.6	4.0	5.3	4.9	5.1	4.7	5.4	5.0	5.2	4.9	5.7	5.2	5.3	5.3	5.8	5.6	5.6	5.6
8	5.3	4.2	4.7	4.7	5.3	5.0	5.2	4.7	5.4	5.2	5.4	5.0	5.8	5.2	5.6	5.3	5.9	6.3	5.8	5.6
9	5.4	4.2	5.1	4.7	5.5	5.0	5.2	4.9	5.8	5.2	5.8	5.0	6.1	6.0	6.0	5.3	6.0	6.3	6.1	5.6
10	5.5	4.3	5.2	4.8	5.6	5.1	5.4	4.9	6.1	5.2	5.8	5.2	6.2	6.3	6.0	5.5	6.1	6.4	6.4	5.7
11	5.5	4.4	5.2	4.8	5.8	5.1	5.5	5.0	6.2	5.2	5.9	5.2	6.5	6.3	6.2	5.6	6.3	6.6	6.6	6.0
12	5.5	4.8	5.2	5.0	5.8	5.2	5.5	5.0	6.2	5.3	5.9	5.7	6.6	6.3	6.2	5.8	6.4	6.6	6.6	6.1
13	5.5	4.8	5.4	5.0	6.0	5.3	5.6	5.1	6.3	5.3	6.0	5.9	6.9	6.4	6.4	6.2	6.8	6.7	6.7	6.6
14	5.5	5.0	5.4	5.5	6.1	5.6	5.7	5.5	6.4	5.3	6.1	6.0	6.9	6.4	6.5	6.3	6.8	6.7	6.9	6.8
15	5.5	5.0	5.5	5.8	6.2	5.8	5.8	6.0	6.7	5.6	6.2	6.2	7.1	6.6	6.5	6.3	6.9	6.8	6.9	7.3
16	5.8	5.2	5.7	5.8	6.2	5.8	5.8	6.0	7.1	5.9	6.3	6.2	7.2	6.6	6.5	6.6	7.3	7.0	6.9	7.3
17	6.0	5.2	5.9	5.8	6.2	6.0	5.8	6.0	7.1	5.9	6.3	6.8	7.3	6.8	6.5	6.8	7.4	7.0	7.2	7.9
18	6.1	5.3	6.1	6.0	6.8	6.5	6.0	6.1	7.2	6.8	6.6	6.9	7.6	7.7	6.8	7.0	7.5	7.8	7.6	8.4
19	6.1	5.5	6.1	6.1	6.8	6.5	6.0	6.5	7.4	7.0	7.7	7.0	7.8	8.7	7.8	7.2	7.9	8.9	8.1	-
20	6.2	6.3	6.2	6.4	7.2	6.8	7.0	6.8	8.1	7.2	8.4	7.2	8.7	-	8.5	7.5	8.1	-	8.6	-

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ) ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	104	87.1	100	96.1	114	103	104	101	121	106	113	109	128	111	117	114	128	117	124	107
เฉลี่ย	5.22	4.36	5.02	4.81	5.70	5.17	5.22	5.05	6.06	5.28	5.65	5.44	6.41	5.86	5.85	5.68	6.39	6.16	6.22	5.92
ต่ำสุด - สูงสุด	2.5 – 6.4				3.3 – 7.2				3.4 – 8.4				3.5 – 8.7				3.8 – 8.9			
เฉลี่ยรวม	4.85				5.28				5.60				5.95				6.17			

ตารางผนวกที่ 29 ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	2.5	3.3	3.3	2.3	2.9	3.4	3.4	2.9	2.9	3.5	3.6	3.0	2.9	3.6	3.8	3.0	3.0	3.9	3.9	3.4
2	2.8	3.4	3.3	2.3	3.3	3.7	3.5	3.2	3.3	3.9	3.6	3.3	3.5	4.2	3.9	3.5	3.4	4.2	3.9	3.7
3	3.1	3.5	3.5	2.9	3.4	3.7	3.6	3.2	3.4	4.0	3.7	3.3	3.6	4.2	3.9	3.5	3.4	4.2	4.2	3.9
4	4.0	3.8	3.6	3.5	4.2	4.0	3.6	3.5	4.4	4.1	3.7	3.6	4.8	4.3	4.0	3.7	4.9	4.4	4.3	3.9
5	4.0	3.9	4.2	3.6	4.2	4.2	4.4	3.6	4.4	4.2	4.6	3.8	4.8	4.3	4.8	4.0	5.0	4.5	5.0	4.4
6	4.1	4.1	4.3	3.9	4.2	4.4	4.4	4.1	4.6	4.5	4.6	4.3	4.8	4.7	4.9	4.5	5.0	4.7	5.1	4.6
7	4.4	4.3	4.8	4.0	4.4	4.4	5.0	4.1	4.6	4.5	5.2	4.4	4.8	4.7	5.4	4.8	5.4	4.9	5.4	4.9
8	4.8	4.3	4.9	4.0	4.8	4.6	5.0	4.1	4.9	4.7	5.2	4.6	5.0	4.7	5.4	4.8	5.4	5.2	5.4	5.2
9	4.8	4.5	5.0	4.4	4.8	4.7	5.1	4.5	5.0	4.8	5.4	4.7	5.0	4.8	5.6	4.8	5.5	5.2	5.4	5.3
10	4.9	4.5	5.1	4.6	5.0	4.7	5.1	4.7	5.0	4.8	5.4	4.7	5.2	4.8	5.7	4.9	5.6	5.3	5.8	5.4
11	5.0	4.8	5.1	4.9	5.0	4.8	5.3	4.9	5.1	4.8	5.9	4.9	5.2	5.2	5.8	5.0	5.6	5.8	6.3	5.5
12	5.0	4.8	5.2	5.3	5.2	4.8	5.4	5.5	5.5	4.9	5.9	5.6	5.8	5.2	5.8	5.4	5.8	5.9	6.5	5.5
13	5.1	4.8	5.2	5.4	5.4	5.0	5.5	5.6	5.6	4.9	5.9	5.6	5.8	5.3	5.9	5.4	5.8	5.9	6.5	5.6
14	5.4	5.0	5.3	5.6	5.7	5.2	5.6	5.6	5.7	5.1	6.0	5.7	6.1	5.4	6.3	5.4	6.2	6.0	6.9	5.8
15	5.6	5.0	5.4	5.6	5.8	5.2	5.7	5.8	5.8	5.2	6.0	6.0	6.3	5.4	6.3	6.2	6.5	6.4	6.9	5.8
16	5.7	5.0	5.6	5.7	6.3	5.5	5.9	5.9	6.2	5.5	6.2	6.0	6.4	6.0	6.4	6.2	6.8	7.5	7.4	6.0
17	5.7	5.2	5.6	5.7	6.3	5.8	6.0	6.1	6.4	5.6	6.2	6.4	6.6	6.7	6.4	6.8	6.8	8.7	8.9	6.4
18	5.8	5.6	5.8	5.8	6.8	6.0	6.0	6.3	6.8	6.1	6.3	6.5	6.9	6.8	8.1	6.8	7.8	-	-	7.2
19	5.9	6.2	5.8	5.9	7.4	6.2	6.5	6.3	7.7	6.2	7.4	6.6	7.8	8.0	-	7.3	7.9	-	-	-
20	6.4	6.6	6.4	5.9	7.4	7.0	6.9	6.5	7.8	7.4	-	6.7	8.0	-	-	-	8.3	-	-	-

ตารางผนวกที่ 29 (ต่อ) ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูก
ผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	95.0	92.6	97.4	91.3	103	97.3	102	96.4	105	98.7	101	99.7	109	98.3	98.4	96.0	114	92.7	97.8	92.5
เฉลี่ย	4.75	4.63	4.87	4.57	5.13	4.87	5.10	4.82	5.26	4.94	5.31	4.99	5.47	5.17	5.47	5.05	5.71	5.45	5.75	5.14
ต่ำสุด - สูงสุด	2.5 – 6.6				2.9 – 7.4				2.9 – 7.8				2.9 – 8.1				3.0 – 8.9			
เฉลี่ยรวม	4.70				4.98				5.12				5.29				5.51			

ตารางผนวกที่ 30 ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปริงโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.6	3.1	2.8	3.1	3.9	3.2	2.8	3.8
2	3.0	2.9	2.5	2.6	2.9	3.3	2.8	3.4	2.9	3.5	2.8	3.4	3.8	3.6	3.4	3.6	4.0	3.6	3.4	3.8
3	3.4	3.0	2.5	3.1	3.1	3.3	2.8	3.5	3.2	3.6	3.1	3.5	4.0	3.7	3.5	3.7	4.3	3.7	3.5	4.2
4	3.5	3.2	2.6	3.9	3.1	3.3	3.3	4.0	3.4	3.6	3.4	4.2	4.1	3.8	3.5	4.5	4.3	3.9	3.7	4.7
5	3.6	3.4	3.2	4.0	3.4	3.5	3.5	4.2	3.6	3.6	3.5	4.2	4.1	3.8	3.9	4.6	4.3	3.9	4.1	4.8
6	3.7	3.6	3.8	4.0	3.4	3.6	3.9	4.2	3.6	3.8	4.0	4.4	4.1	3.8	4.2	4.7	4.4	4.2	4.2	4.8
7	3.8	3.9	3.8	4.3	3.6	3.8	3.9	4.4	3.7	3.8	4.0	4.6	4.3	3.9	4.3	4.7	4.6	4.2	4.4	5.0
8	4.2	3.9	4.0	4.3	3.7	4.0	4.2	4.5	3.8	4.2	4.4	4.6	4.3	4.3	4.4	4.7	4.7	4.4	4.5	5.2
9	4.2	4.0	4.0	4.4	3.8	4.1	4.2	4.8	3.8	4.2	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	5.0	4.7	4.6	4.7	5.7
10	4.3	4.5	4.1	4.5	3.8	4.6	4.2	4.8	3.9	4.7	4.6	5.0	4.5	4.9	4.8	5.0	4.8	5.0	4.8	5.7
11	4.3	4.5	4.2	4.6	3.8	4.8	4.4	4.8	3.9	4.9	4.6	5.2	4.6	5.0	4.8	5.2	4.8	5.2	4.8	6.0
12	4.4	4.6	4.2	4.6	3.9	4.8	4.4	4.9	4.1	4.9	4.6	5.2	4.7	5.0	4.9	5.2	5.1	5.2	5.0	6.0
13	4.6	4.7	4.2	5.4	4.1	4.8	4.6	5.5	4.4	4.9	4.8	5.6	5.7	5.2	4.9	5.8	6.6	5.4	5.1	6.8
14	4.8	4.8	4.7	5.5	4.2	5.0	4.9	5.9	4.7	5.2	5.0	6.2	5.8	5.3	5.3	6.6	6.9	5.4	5.4	6.8
15	4.8	4.8	4.8	5.5	4.3	5.1	4.9	5.9	5.1	5.5	5.2	6.3	5.8	5.6	5.4	6.6	-	5.8	5.8	6.8
16	4.9	4.8	4.8	5.5	4.7	5.2	5.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.4	5.9	5.6	5.7	6.7	-	5.8	5.9	7.2
17	5.0	4.9	5.0	5.7	4.8	5.3	5.2	6.2	5.6	5.6	5.5	6.6	-	5.7	5.7	6.8	-	6.4	6.0	7.4
18	5.3	5.0	5.0	5.8	5.0	5.3	5.3	6.4	5.8	5.8	5.8	6.7	-	6.1	6.0	6.8	-	6.5	6.2	-
19	5.8	5.5	5.5	6.1	5.5	6.3	5.4	6.5	-	6.2	6.8	6.8	-	6.6	7.1	7.0	-	7.7	7.6	-
20	6.4	6.1	6.0	6.2	5.8	6.8	6.5	6.6	-	7.1	-	6.8	-	7.3	-	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ) ขนาดความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีโนโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน ปลานิล	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	86.6	84.6	81.4	92.6	79.7	89.4	86.0	99.3	73.8	93.4	84.8	103	73.7	96.7	89.0	100	67.4	94.1	91.9	94.7
เฉลี่ย	4.33	4.23	4.07	4.63	3.99	4.47	4.30	4.97	4.10	4.67	4.46	5.17	4.61	4.84	4.68	5.28	4.81	4.95	4.60	5.57
ต่ำสุด - สูงสุด	2.5 – 6.4				2.5 – 6.8				2.8 – 7.1				2.8 – 7.3				2.8 – 7.7			
เฉลี่ยรวม	4.32				4.43				4.60				4.85				4.98			

ตารางผนวกที่ 31 ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	2.8	2.5	3.0	2.5	2.8	2.5	3.0	2.7	2.8	3.0	3.1	2.7	2.9	3.1	3.2	3.6	3.5	3.8	3.6	3.8
2	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	2.7	3.1	3.0	3.1	2.7	3.1	3.4	3.2	3.7	3.5	3.8	3.8	3.9
3	3.0	3.0	3.1	2.9	3.0	3.1	3.1	2.9	3.3	3.2	3.1	2.9	3.3	3.4	3.2	3.8	3.6	3.8	3.9	-
4	3.1	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.1	3.0	3.4	3.2	3.1	3.1	3.4	3.5	3.3	3.8	3.7	-	-	-
5	3.4	3.2	3.2	3.0	3.4	3.3	3.2	3.0	3.5	3.3	3.3	3.1	3.5	3.6	3.4	3.8	3.8	-	-	-
6	3.5	3.3	3.3	3.0	3.5	3.3	3.4	3.0	3.5	3.4	3.4	3.1	3.6	3.7	3.4	3.8	4.3	-	-	-
7	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.8	3.5	3.8	4.4	-	-	-
8	3.6	3.5	3.3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.5	3.7	3.9	3.5	3.8	4.4	-	-	-
9	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.6	3.4	3.6	3.9	4.0	3.5	3.8	-	-	-	-
10	3.6	3.6	3.4	3.5	3.7	3.7	3.4	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	4.0	4.2	3.5	3.9	-	-	-	-
11	3.8	3.7	3.4	3.6	3.8	3.7	3.4	3.7	3.8	3.9	3.5	3.6	4.2	4.3	3.5	3.9	-	-	-	-
12	3.8	3.9	3.4	3.6	3.8	3.9	3.4	3.8	3.8	4.0	3.5	3.7	4.2	4.5	3.5	-	-	-	-	-
13	4.1	4.0	3.5	3.7	4.0	4.0	3.5	3.8	4.0	4.0	3.5	3.7	4.3	-	3.5	-	-	-	-	-
14	4.2	4.0	3.5	3.7	4.1	4.1	3.5	3.8	4.1	4.1	3.6	3.7	4.3	-	3.6	-	-	-	-	-
15	4.2	4.2	3.5	3.7	4.2	4.2	3.6	3.9	4.3	4.3	3.6	3.7	4.3	-	3.6	-	-	-	-	-
16	4.2	4.3	3.6	3.8	4.2	4.4	3.6	3.9	4.3	4.5	3.6	3.9	4.5	-	3.6	-	-	-	-	-
17	4.3	4.5	3.6	3.8	4.3	4.6	3.6	4.2	4.4	4.8	3.6	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-
18	4.3	4.8	3.7	3.9	4.4	4.6	3.8	-	4.4	5.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	4.4	5.3	3.8	4.0	4.4	5.4	-	-	4.4	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4.4	5.8	4.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผนวกที่ 31 (ต่อ) ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	74.8	76.7	68.4	68.8	70.5	71.6	60.8	58.7	71.6	74.4	61.5	54.1	60.8	45.4	58.8	41.7	31.2	11.4	11.3	7.7
เฉลี่ย	3.74	3.84	3.42	3.44	3.71	3.77	3.38	3.45	3.77	3.92	3.42	3.38	3.80	3.78	3.46	3.79	3.90	3.80	3.77	3.85
ต่ำสุด – สูงสุด	2.5 – 5.8				2.5 – 5.4				2.7 – 5.9				2.9 – 4.5				3.5 – 4.4			
เฉลี่ยรวม	3.61				3.58				3.62				3.71				3.83			

ตารางผนวกที่ 32 ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีน โนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	2.7	2.5	2.6	2.5	2.7	2.5	2.6	2.5	2.7	2.5	2.6	2.5	2.7	3.3	2.6	2.6	3.3	3.3	2.6	2.6
2	3.2	3.0	2.6	2.5	3.2	3.0	2.6	2.6	3.2	3.2	2.6	2.6	3.3	3.3	2.6	2.6	3.6	3.4	2.7	2.7
3	3.2	3.1	2.6	2.6	3.2	3.1	2.7	2.9	3.2	3.3	2.7	2.9	3.4	3.6	2.7	2.7	3.7	3.5	2.7	2.8
4	3.2	3.1	2.8	2.6	3.2	3.1	2.8	3.1	3.2	3.3	2.9	3.1	3.4	3.6	2.9	2.9	3.8	3.6	2.9	2.9
5	3.2	3.1	2.9	2.8	3.2	3.1	2.9	3.1	3.2	3.3	2.9	3.2	3.6	3.6	2.9	3.1	3.9	3.6	2.9	3.1
6	3.2	3.1	2.9	2.8	3.2	3.1	2.9	3.2	3.3	3.3	2.9	3.2	3.7	3.7	2.9	3.2	4.1	3.7	2.9	3.2
7	3.2	3.2	3.0	2.8	3.3	3.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.0	3.2	3.7	3.8	3.0	3.3	4.1	3.8	3.0	3.3
8	3.3	3.2	3.1	2.8	3.4	3.2	3.1	3.3	3.4	3.4	3.1	3.3	3.8	3.8	3.1	3.3	-	3.8	3.1	3.3
9	3.3	3.3	3.1	2.8	3.4	3.3	3.1	3.3	3.4	3.5	3.2	3.4	3.8	3.9	3.3	3.3	-	3.9	3.3	3.3
10	3.4	3.3	3.1	3.3	3.5	3.3	3.2	3.4	3.5	3.6	3.2	3.4	3.9	3.9	3.3	3.4	-	3.9	3.4	3.4
11	3.4	3.4	3.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6	3.8	3.3	3.5	4.3	-	3.4	3.4	-	-	3.4	3.4
12	3.5	3.5	3.2	3.4	3.5	3.7	3.3	3.5	3.6	3.9	3.6	3.6	-	-	3.5	3.5	-	-	3.5	3.6
13	3.6	3.6	3.2	3.4	3.6	3.7	3.4	3.5	3.6	4.2	3.6	3.6	-	-	3.5	3.6	-	-	3.7	3.6
14	3.6	3.7	3.2	3.7	3.7	3.7	3.5	3.7	3.8	4.2	3.7	3.7	-	-	3.6	3.7	-	-	3.7	3.6
15	3.8	3.7	3.2	3.8	3.8	3.8	3.5	3.8	3.9	-	3.7	3.8	-	-	3.7	3.9	-	-	3.7	3.7
16	3.8	3.8	3.3	3.8	3.8	3.8	3.6	3.8	3.9	-	3.7	3.9	-	-	3.7	3.9	-	-	3.7	3.9
17	3.9	3.9	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8	4.1	4.1	-	3.8	4.1	-	-	3.8	4.0	-	-	3.8	4.0
18	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.3	4.1	4.2	4.2	-	4.2	4.2	-	-	4.0	4.2	-	-	4.1	4.2
19	4.0	4.2	4.2	4.0	4.1	4.4	4.3	4.3	4.2	-	4.2	4.4	-	-	4.1	-	-	-	4.2	-
20	4.1	4.5	4.2	4.3	4.1	4.6	4.7	4.4	4.2	-	4.6	-	-	-	4.6	-	-	-	4.6	-

ตารางผนวกที่ 32 (ต่อ) ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูก
ผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	69.6	69.2	63.8	64.9	70.3	70.3	66.3	69.3	71.5	48.9	67.5	65.6	39.6	36.5	67.2	60.6	26.5	36.5	67.9	60.6
เฉลี่ย	3.48	3.46	3.19	3.25	3.52	3.52	3.32	3.47	3.58	3.49	3.38	3.45	3.60	3.65	3.36	3.37	3.79	3.65	3.40	3.37
ต่ำสุด - สูงสุด	2.5 – 4.5				2.5 – 4.7				2.5 – 4.6				2.6 – 4.6				2.6 – 4.6			
เฉลี่ยรวม	3.34				3.45				3.47				3.49				3.55			

ตารางผนวกที่ 33 ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปริง โนเซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	3.0	2.4	2.4	2.6	3.0	2.4	2.8	2.9	3.0	3.1	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2
2	3.1	2.8	2.8	2.7	3.1	2.8	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.2
3	3.1	2.8	2.9	2.9	3.2	2.8	3.2	3.1	3.2	3.1	3.3	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.1	3.4	3.3
4	3.1	2.9	3.2	2.9	3.2	2.9	3.3	3.1	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.5	3.4
5	3.1	3.0	3.2	2.9	3.2	3.0	3.3	3.1	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.1	3.5	3.3	3.3	3.2	3.6	3.4
6	3.1	3.1	3.2	3.0	3.3	3.1	3.4	3.2	3.3	3.2	3.6	3.3	3.3	3.2	3.6	3.3	3.3	3.2	3.6	3.4
7	3.2	3.1	3.2	3.0	3.3	3.1	3.5	3.2	3.3	3.2	3.6	3.3	3.3	3.4	3.6	3.4	3.3	3.5	3.7	3.6
8	3.2	3.1	3.5	3.0	3.3	3.1	3.7	3.2	3.4	3.2	3.7	3.3	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	3.8	3.6
9	3.2	3.1	3.6	3.0	3.4	3.2	3.7	3.2	3.4	3.6	3.7	3.4	3.4	3.6	3.8	3.6	3.4	3.7	3.9	3.8
10	3.3	3.2	3.6	3.1	3.4	3.3	3.7	3.3	3.4	3.6	3.7	3.5	3.4	3.7	3.9	3.6	3.5	3.7	3.9	3.8
11	3.4	3.4	3.6	3.1	3.5	3.4	3.7	3.4	3.7	3.6	3.8	3.6	3.7	3.7	3.9	3.6	3.5	3.8	4.0	3.8
12	3.4	3.5	3.7	3.1	3.7	3.5	3.7	3.4	3.7	3.7	3.8	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	3.9
13	3.5	3.6	3.7	3.2	3.7	3.6	3.8	3.4	3.8	3.7	3.8	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	4.0	3.9
14	3.6	3.6	3.8	3.4	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	3.7	3.8	3.6	3.9	3.8	3.9	3.8	4.1	3.8	4.0	3.9
15	3.6	3.6	3.9	3.4	3.7	3.8	3.8	3.5	3.9	3.8	3.9	3.6	4.0	3.8	3.9	3.8	-	3.8	4.1	3.9
16	3.6	3.6	3.9	3.4	3.8	3.8	3.9	3.6	4.1	3.8	3.9	3.7	4.1	3.9	3.9	3.8	-	4.0	4.2	3.9
17	3.9	3.6	3.9	3.5	3.9	3.8	3.9	3.6	4.2	3.8	3.9	3.7	-	3.9	4.0	3.9	-	4.0	-	3.9
18	3.9	3.7	4.0	3.6	3.9	3.8	4.0	3.6	-	3.9	4.1	3.9	-	4.0	4.1	4.1	-	4.0	-	4.1
19	4.2	3.8	4.0	3.7	4.4	3.9	4.0	4.2	-	4.2	4.2	4.2	-	4.1	4.2	4.2	-	-	-	4.2
20	4.4	3.9	4.0	3.8	4.5	3.9	4.1	4.2	-	4.3	4.2	4.3	-	4.2	4.3	4.3	-	-	-	4.3

ตารางผนวกที่ 33 (ต่อ) ขนาดความยาวของกิ่งฝอย (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปริงโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน กิ่งฝอย	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	68.9	65.8	70.1	63.3	71.2	66.9	72.4	67.7	60.0	70.8	73.6	70.3	56.0	71.8	74.8	72.2	48.1	64.3	60.1	74.5
เฉลี่ย	3.45	3.29	3.51	3.17	3.56	3.35	3.62	3.39	3.53	3.54	3.68	3.52	3.50	3.59	3.74	3.61	3.44	3.57	3.76	3.73
ต่ำสุด - สูงสุด	2.4 – 4.4				2.4 – 4.5				2.8 – 4.3				3.0 – 4.3				3.0 – 4.3			
เฉลี่ยรวม	3.35				3.48				3.57				3.61				3.62			

ตารางผนวกที่ 34 ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน หอยขม	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5
3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6
6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7
7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7
8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
9	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
10	1.5	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
11	1.5	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8
12	1.5	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8
13	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8
14	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
15	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8
16	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8
17	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.9
18	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	-	2.0	1.9
19	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	-	1.9	1.9	2.0	-	2.0	1.9
20	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	-	2.1	1.9	1.9	-	2.1	1.9	-	-	2.1	2.3	-	-	2.1

ตารางผนวกที่ 34 (ต่อ) ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มควบคุม ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน หอยขม	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	31.8	33.2	32.7	32.7	33.2	34.3	32.2	34.7	33.5	34.3	32.0	34.8	34.1	31.0	32.2	34.7	35.6	29.3	32.8	34.9
เฉลี่ย	1.59	1.66	1.64	1.64	1.66	1.72	1.69	1.74	1.68	1.72	1.68	1.74	1.71	1.72	1.69	1.74	1.78	1.72	1.73	1.75
ต่ำสุด - สูงสุด	1.5 – 2.0				1.4 – 2.1				1.4 – 2.1				1.5 – 2.1				1.5 – 2.3			
เฉลี่ยรวม	1.63				1.70				1.70				1.71				1.74			

ตารางผนวกที่ 35 ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปิโนโนแซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน หอยขม	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6
5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6
6	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6
7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.7	1.8	1.7
8	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7
9	1.5	1.5	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7
10	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7
11	1.5	1.6	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7
12	1.5	1.7	2.1	1.6	1.7	1.8	2.1	1.7	1.7	1.8	2.1	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	2.2	1.8
13	1.5	1.7	2.1	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	2.2	1.8
14	1.5	1.8	2.2	1.7	1.7	1.8	2.2	1.8	1.7	1.8	2.2	1.8	1.7	1.9	2.3	1.8	1.7	1.9	2.3	1.8
15	1.5	1.8	2.2	1.7	1.7	1.9	2.3	1.8	1.7	1.9	2.2	1.8	1.7	1.9	2.3	1.8	1.7	1.9	2.3	1.9
16	1.7	1.8	2.2	1.7	1.7	1.9	2.4	1.8	1.7	1.9	2.3	1.8	1.7	1.9	2.4	1.8	1.7	1.9	2.4	1.9
17	1.7	1.9	2.3	1.8	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8	1.9	2.4	1.9	1.8	1.9	2.4	2.0
18	1.7	1.9	2.4	2.1	1.8	2.0	2.4	2.0	1.8	2.0	2.4	2.0	1.8	2.0	2.4	2.0	1.8	2.0	2.5	2.1
19	1.8	1.9	2.4	2.2	1.8	2.1	2.4	2.1	1.8	2.1	2.5	2.2	1.8	2.1	2.6	2.2	1.8	2.1	-	2.2
20	1.8	2.1	2.4	2.3	1.8	2.2	2.5	2.1	1.8	2.2	-	2.2	1.8	2.2	-	2.2	1.8	2.2	-	-

ตารางผนวกที่ 35 (ต่อ) ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีนโนเซดตามอัตราแนะนำ (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูก
ผักกาดหอม

จำนวน หอยขม	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	31.2	33.3	38.2	33.5	32.9	35.6	39.0	34.0	32.9	35.8	36.8	34.3	32.9	35.9	38.0	34.9	32.9	35.9	35.2	33.4
เฉลี่ย	1.56	1.67	1.91	1.68	1.65	1.78	1.95	1.70	1.65	1.79	1.94	1.72	1.65	1.80	2.00	1.75	1.65	1.80	1.96	1.76
ต่ำสุด - สูงสุด	1.5 – 2.4				1.5 – 2.5				1.5 – 2.5				1.5 – 2.6				1.5 – 2.5			
เฉลี่ยรวม	1.70				1.77				1.77				1.80				1.79			

ตารางผนวกที่ 36 ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปริง โนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูกผักกาดหอม

จำนวน หอยขม	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5
2	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5
3	1.7	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6
4	1.8	1.5	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6
5	1.8	1.5	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6
6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6
7	1.8	1.5	1.6	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7
8	1.8	1.5	1.6	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7
9	1.9	1.5	1.6	1.6	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7
10	1.9	1.6	1.6	1.6	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.8	2.1	1.8	1.7	1.8
11	1.9	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8
12	1.9	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8
13	2.0	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.8	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	2.2	1.8	1.8	1.8	2.2	1.8	1.8	1.8
14	2.0	1.8	1.7	1.7	2.0	1.8	1.9	1.8	2.1	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	1.9	1.9	2.2	1.8	1.9	1.9
15	2.2	1.8	1.8	1.7	2.2	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	1.9	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9
16	2.3	1.8	1.9	1.8	2.3	1.8	1.9	1.8	2.3	1.8	1.9	1.8	2.3	1.8	2.0	1.9	2.3	1.8	2.1	1.9
17	2.3	1.8	2.0	1.8	2.3	1.8	2.0	1.8	2.3	1.9	2.0	1.8	2.3	1.9	2.2	1.9	2.3	1.9	2.2	1.9
18	2.4	1.8	2.3	1.8	2.4	1.8	2.3	1.8	2.4	1.9	2.3	1.8	2.4	1.9	2.3	1.9	2.4	1.9	2.3	2.0
19	2.5	1.8	2.4	1.8	2.5	1.8	2.5	1.9	2.5	1.9	2.6	1.9	2.5	1.9	2.6	1.9	2.5	1.9	2.6	2.1
20	2.5	1.9	2.5	1.8	2.5	1.9	-	-	2.5	1.9	-	-	2.6	2.0	-	-	2.6	2.1	-	-

ตารางผนวกที่ 36 (ต่อ) ขนาดความยาวของหอยขม (เซนติเมตร) กลุ่มการทดลองที่มีการฉีดพ่นสารสปีนโนแซด 2 เท่าของอัตราแนะนำ (80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ในแปลงปลูก
ผักกาดหอม

จำนวน	ก่อนพ่นครั้งแรก				หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน				หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน			
หอยขม	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
รวม	39.7	32.9	35.4	32.8	39.7	33.7	34.1	32.3	39.8	34.4	34.2	32.4	41.0	34.6	34.5	33.1	41.2	34.7	34.7	33.4
เฉลี่ย	1.99	1.65	1.77	1.64	1.99	1.69	1.79	1.70	1.99	1.72	1.80	1.71	2.05	1.73	1.82	1.74	2.06	1.74	1.83	1.76
ต่ำสุด - สูงสุด	1.5 – 2.5				1.5 – 2.5				1.5 – 2.6				1.5 – 2.6				1.5 – 2.6			
เฉลี่ยรวม	1.76				1.79				1.80				1.83				1.84			

