

ตารางผนวกที่ 37 น้ำหนักเฉลี่ยของสัตว์ทดลอง จากการทดสอบผลของสารสปีโนแซด เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต ในแปลงปลูกผักกาดหอม

ระยะเวลา	น้ำหนักปลานิล (กรัม)			น้ำหนักกุ้งฝอย (กรัม)			น้ำหนักหอยขม (กรัม)		
	กลุ่มควบคุม	อัตราแนะนำ	2 เท่าของอัตราแนะนำ	กลุ่มควบคุม	อัตราแนะนำ	2 เท่าของอัตราแนะนำ	กลุ่มควบคุม	อัตราแนะนำ	2 เท่าของอัตราแนะนำ
ก่อนพ่นครั้งแรก	2.63 a ^{1/}	3.03 a	2.50	0.55	0.43	0.45	2.58	2.83	3.10
หลังพ่นครั้งแรก 2 วัน	3.88 b	3.65 ab	2.53	0.55	0.58	0.56	2.58	2.75	3.24
หลังพ่นครั้งที่สอง 4 วัน	4.35 bc	4.02 b	2.64	0.57	0.56	0.63	2.70	2.71	3.23
หลังพ่นครั้งที่สอง 11 วัน	4.92 bc	4.07 b	2.87	0.44	0.49	0.50	2.62	2.72	3.17
หลังพ่นครั้งที่สอง 18 วัน	5.19 c	4.16 b	3.20	0.45	0.42	0.49	2.70	2.74	3.19
F – test	** ^{2/}	* ^{3/}	NS ^{4/}	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SD	1.18	0.66	0.48	0.15	0.15	0.12	0.14	0.39	0.57
C.V.%	28.04	17.35	17.01	28.91	29.90	22.78	5.26	14.25	17.84

^{1/} = ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดยการเปรียบเทียบแบบ DMRT

^{2/} ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P < 0.01$)

^{3/} * = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

^{4/} NS = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ