



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ปริญญา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง ผลของเบทาอีนต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์โภชนะในกุ้งกุลาดำ
(*Penaeus monodon*, Fabricius)

Effect of Betaine on Growth Performance and Nutrient Utilization in Juvenile Black Tiger Shrimp (*Penaeus monodon*, Fabricius)

นามผู้วิจัย นายเกษฎา มณีรอด

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร, วท.ค.)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ประทักษ์ ตาบทพิยสุวรรณ, Doctorat de 3 cycle)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์สังศรี มหาสวัสดิ์, วท.ม.)

หัวหน้าภาควิชา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราห์ เทพาคูดี, Ph.D.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

(รองศาสตราจารย์วินัย อากคงหาญ, M.A.)


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๒ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๔๙

เกษญา มณีรอด 2549: ผลของเบทาอินต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์โภชนะในกึ่งกลาดำ
(*Penaeus monodon*, Fabricius) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) สาขาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรชานกรรมการที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร, วท.ค. 92 หน้า
ISBN 974-16-2902-8

การศึกษาผลของเบทาอินต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์โภชนะในกึ่งกลาดำ โดยเสริมเบทาอิน 3 ระดับ คือ ชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอินชนิดไม่เคลือบ 1 เปอร์เซ็นต์ และชุดที่เสริมเบทาอินชนิดเคลือบที่ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเบทาอินเท่ากับชนิดไม่เคลือบ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยในอาหารที่ใช้ทดลองมีระดับโปรตีน 38 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 6 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ย่อยได้ 2,830 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า กึ่งกลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเบทาอินมีการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์โภชนะในส่วนของน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย ใกล้เคียงกับกึ่งกลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่เสริมเบทาอิน ส่วนการสะสมไกลโคเจนในตับพบว่าชุดที่เสริมเบทาอิน 1 เปอร์เซ็นต์ และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่าชุดที่ไม่เสริมเบทาอินอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) โดยมีค่าเท่ากับ 6.63 ± 2.67 , 16.48 ± 2.61 และ 11.94 ± 1.35 มก./ก. เนื้อเยื่อ ในชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอิน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดพบว่าชุดที่เสริมเบทาอินชนิดเคลือบ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่าชุดที่เสริมเบทาอิน 1 เปอร์เซ็นต์ และชุดที่ไม่เสริมเบทาอินอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) โดยมีค่าเท่ากับ 96.68 ± 5.27 , 107.55 ± 6.84 และ 203.02 ± 17.09 มก./คค. ในชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอิน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ กึ่งกลาดำชุดที่เสริมเบทาอินชนิดเคลือบ 2 เปอร์เซ็นต์ มีระดับของอาร์เอนเอในกล้ามเนื้อสูงกว่าชุดที่ไม่เสริมเบทาอินอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) โดยมีค่าเท่ากับ 0.0011 ± 0.0001 , 0.0013 ± 0.0001 และ 0.0016 ± 0.0002 มก. อาร์เอนเอ/มก. เนื้อเยื่อ ในชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอิน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ระดับการสะสมของฟอสฟาติลโคลีนในเนื้อเยื่อของกึ่งกลาดำชุดที่เสริมเบทาอิน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าชุดที่ไม่เสริมเบทาอินอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) โดยที่มีค่าเท่ากับ 1.855 ± 0.088 , 2.675 ± 0.392 และ 2.417 ± 0.202 มิลลิกรัม/กรัมเนื้อเยื่อ ในชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอิน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และระยะเวลาการเข้ากินอาหารของกึ่งกลาดำชุดที่เสริมเบทาอินชนิดเคลือบ 2 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาน้อยกว่าชุดที่ไม่เสริมเบทาอินอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) โดยมีค่าเท่ากับ 5.69 ± 2.45 , 3.57 ± 1.86 และ 2.77 ± 1.29 นาที ในชุดที่ไม่เสริมเบทาอิน ชุดที่เสริมเบทาอินชนิดไม่เคลือบ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังนั้นการเสริมเบทาอินในอาหารกึ่งกลาดำจะมีผลให้การใช้ประโยชน์โภชนะดีขึ้นและกึ่งเข้ากินอาหารได้เร็วขึ้น



ลายมือชื่อนิสิต


ลายมือชื่อประธานกรรมการ

30 / ๓๓ / ๕๕

Ketsada Maneerod 2006: Effect of Betaine on Growth Performance and Nutrient Utilization in Juvenile Black Tiger Shrimp (*Penaeus monodon*, Fabricius) Master of Science (Aquaculture), Major Field: Aquaculture, Department of Aquaculture.
Thesis Advisor: Assistant Professor Orapint Jintasataporn, Ph.D. 92 pages.
ISBN 974-16-2902-8

The experiment was conducted to evaluate effect of betaine on growth performance and nutrient utilization in juvenile black tiger shrimp (*Penaeus monodon*). Three type of isonitrogenous and isocaloric diet of 38% protein, 6% lipid and digestible energy of 2,830 kcal/kg were prepared with an unsupplemented control along with incorporation of non coated betaine at 1% and 2% coated betaine which was equal to 1% non coated betaine. In three month studied, growth performances and nutrient utilization on weight gain, average daily growth, feed conversion ratio (FCR) and survival rate in group of 1%, 2% betaine were in the same range as 0% betaine ($p>0.05$). Glycogen in hepatopancreas of shrimp fed 1% and 2% betaine were higher than 0% betaine ($p\leq 0.05$). There were 6.63 ± 2.67 mg/g tissue 16.48 ± 2.61 mg/g tissue and 11.94 ± 1.35 mg/g tissue in group of 0% 1% and 2% betaine, respectively. Triglyceride in hemolymph of shrimp fed 2% betaine were higher than 1% and 0% betaine ($p\leq 0.05$). There were 96.68 ± 5.27 mg/dl 107.55 ± 6.84 mg/dl and 203.02 ± 17.09 mg/dl in group of 0%, 1% and 2% betaine, respectively. White muscle RNA in shrimp fed 2% betaine were higher than 0% betaine ($p\leq 0.05$). There were 0.0011 ± 0.0001 mg RNA/mg tissue, 0.0013 ± 0.0001 mg RNA/mg tissue and 0.0016 ± 0.0002 mg RNA/mg tissue in group of 0%, 1% and 2% betaine, respectively. Phosphatidylcholine in tissue of shrimp fed 1% and 2% betaine were higher than 0% betaine ($p\leq 0.05$). There were 1.855 ± 0.088 mg/g tissue 2.675 ± 0.392 mg/g tissue and 2.417 ± 0.202 mg/g tissue in group of 0%, 1% and 2% betaine, respectively. Shrimp fed 1% and 2% betaine demonstrated better responsibility on feed attraction period than 0% betaine ($p\leq 0.05$). There were 5.69 ± 2.45 min. 3.57 ± 1.86 min. and 2.77 ± 1.29 min. in group of 0%, 1% and 2% betaine, respectively. There fore, supplemental betaine in shrimp diet showed responsibility on promoting feed utilization and feed attraction.


Student's signature

 30 / Oct / 2006
Thesis Advisor's signature