




ภาพผนวก ข
แผนภาพการเชื่อมโยงแข็ง




ภาพผนวกที่ ข1 แผนภาพการแช่เยือกแข็งของเจลสตาร์ไขมันสำปะหลังผสมแซนแทนกัมที่ความเข้มข้น 0.00, 0.25 และ 0.50 ด้วยอัตราการแช่เยือกแข็งแบบช้า (0.05 °ซ ต่อนาที)



ภาพผนวกที่ ข2 แผนภาพการแช่เยือกแข็งของเจลสตาร์ไขมันสำปะหลังผสมแซนแทนกัมที่ความเข้มข้น 0.00, 0.25 และ 0.50 ด้วยอัตราการแช่เยือกแข็งแบบช้า (0.06 °ซ ต่อนาที)



ภาพผนวกที่ ข3 แผนภาพการแช่เยือกแข็งของเจลสตาร์ไขมันสำปะหลังผสมแซนแทนกัมที่ความเข้มข้น 0.00, 0.25 และ 0.50 ด้วยอัตราการแช่เยือกแข็งแบบปานกลาง (0.89 °ซ ต่อนาที)



ภาพผนวกที่ ข4 แผนภาพการแช่เยือกแข็งของเจลสตาร์ไขมันสำปะหลังผสมแซนแทนกัมที่ความเข้มข้น 0.00, 0.25 และ 0.50 ด้วยอัตราการแช่เยือกแข็งแบบปานกลาง (2.31 °ซ ต่อนาที)