

ตารางผนวกที่ 1 คะแนนคุณภาพด้านความงามของโกสนที่ได้รับผลกระทบจากสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

พรีทเมนต์	ระยะเวลาการใช้งาน																
	วันที่ 1	วันที่ 3	วันที่ 5	วันที่ 7	วันที่ 9	วันที่ 11	วันที่ 13	วันที่ 15	วันที่ 17	วันที่ 19	วันที่ 21	วันที่ 23	วันที่ 25	วันที่ 27	วันที่ 29	วันที่ 31	วันที่ 33
0 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	4.0	4.0	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.4	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
25 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.2	2.0	2.0	1.8	1.8	1.6
50 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	4.0	4.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
75 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.6	3.6	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.4
100 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.2	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่าหมดสภาพการใช้งาน

ตารางผนวกที่ 2 คะแนนคุณภาพด้านความงามของเทียนทองที่ได้รับผลกระทบจากสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

ทริทเมนต์	ระยะเวลาการใช้งาน							
	วันที่ 1	วันที่ 3	วันที่ 5	วันที่ 7	วันที่ 9	วันที่ 11	วันที่ 13	วันที่ 15
0 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.0	3.2	3.0	3.0	2.8	2.4	1.6
25 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.8	2.0
50 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.2	3.0	3.0	2.8	2.2	1.8
75 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.2	3.8	3.2	3.0	3.0	3.0	2.0
100 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.6	3.0	3.0	2.8	2.6	2.0

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่าหมดสภาพการใช้งาน

ตารางผนวกที่ 3 คะแนนคุณภาพด้านความงามของใบนาที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

ทริทเมนต์	ระยะเวลาการใช้งาน														
	วันที่ 1	วันที่ 3	วันที่ 5	วันที่ 7	วันที่ 9	วันที่ 11	วันที่ 13	วันที่ 15	วันที่ 17	วันที่ 19	วันที่ 21	วันที่ 23	วันที่ 25	วันที่ 27	วันที่ 29
0 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.2	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	1.8	1.6
25 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	3.6	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.6	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6
50 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.2	3.6	3.6	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.4	2.0	1.6
75 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	4.0	4.0	3.4	3.4	3.2	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.0	1.6	1.4
100 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.0	3.0	3.0	2.8	2.4	2.4	2.4	2.0

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่าหมดสภาพการใช้งาน

ตารางผนวกที่ 4 คะแนนคุณภาพด้านความงามของแพงแพวแดงที่ได้รับผลกระทบจากสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

ทริทเมนต์	ระยะเวลาการใช้งาน									
	วันที่ 1	วันที่ 3	วันที่ 5	วันที่ 7	วันที่ 9	วันที่ 11	วันที่ 13	วันที่ 15	วันที่ 17	วันที่ 19
0 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	2.4	2.2	1.4
25 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	4.0	3.6	3.2	3.2	3.0	2.8	2.2	2.0
50 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.6	3.4	3.2	3.0	2.2	1.8	1.6	1.6
75 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.8	3.4	3.4	3.2	3.2	2.4	2.2	1.8	1.6
100 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.6	2.2	1.6	1.6

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่าหมดสภาพการใช้งาน

ตารางผนวกที่ 5 คะแนนคุณภาพด้านความงามของถายีสผสมที่ได้รับผลกระทบจากสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

พริทเมนต์	ระยะเวลาการใช้งาน			
	วันที่ 1	วันที่ 3	วันที่ 5	วันที่ 7
0 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.4	3.4	2.0
25 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.8	3.0	2.0
50 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.2	1.8
75 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.4	1.8
100 มิลลิกรัม/ลิตร	5.0	4.6	3.2	2.0

คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่าหมดสภาพการใช้งาน