

ภาพที่ 27 เนื้อเยื่อตับของหนูกลุ่มทดลองชนิด CPC10 มีโครงสร้างคล้ายท่อ (D) รอบหลอดเลือดเฮพาทิก เวน (Hv) ที่ภายในบรรจุสารเนื้อเดียวกันสีแดง มีแถบไฟโบรบลาสต์ (F)แทรกเข้ามาในเนื้อเยื่อตับ (H&E ; bar = 50 μ m)

ภาพที่ 28 เนื้อเยื่อตับของหนูกลุ่มทดลองชนิด CPC11 แสดงกลุ่มเซลล์ที่มีนิวเคลียสรูปไข่มารวมกลุ่มเกิดโครงสร้างคล้ายท่อ (ลูกศร) เซลล์ตับส่วนใหญ่ตาย Hs = เม็ดเลือดแดงแตก (H&E ; bar = 50 μ m)

ภาพที่ 29 เนื้อเยื่อตับของหนูกลุ่มทดลองชนิด CPC12 แสดงเซลล์ตับตายในหลอดเลือดเซนทรัล เวน (Cv) มีเศษเซลล์บรรจุอยู่ (H&E ; bar = 50 μ m)

ภาพที่ 30 เนื้อเยื่อตับของหนูกลุ่มทดลองชนิด CPOH บางเซลล์นิวเคลียสมีขนาดใหญ่ (หัวลูกศร) และเซลล์ตับตาย (ลูกศร) (H&E ; bar = 25 μ m)