

- ภาพที่ 31 เนื้อเยื่อไตของกลุ่มควบคุมฉีดน้ำเกลือปลอดเชื้อความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ แสดง โกลเมอรูลัส (G) และท่อไตส่วนต้น (P) (H&E ; bar = 50 μ m)
- ภาพที่ 32 เนื้อเยื่อไตของหนูกลุ่มทดลองฉีดน้ำมันงา visceral layer (ลูกศร) และ parietal layer (หัวลูกศร) ตาย ท่อไตส่วนต้น (P) ตายทั้งท่อ (H&E ; bar = 50 μ m)
- ภาพที่ 33 เนื้อเยื่อไตของหนูกลุ่มทดลองฉีด CPA Bowman's capsule มีชั้นเยื่อบุทั้ง parietal (หัวลูกศร) และ visceral layer (ลูกศร) ตาย ท่อไตส่วนต้น (P) มีเศษเซลล์ของเซลล์เยื่อบุอยู่ในท่อ (H&E ; bar = 50 μ m)
- ภาพที่ 34 เนื้อเยื่อไตของหนูกลุ่มทดลองฉีด CPA พบแถบของไฟโบรบลาสต์ (F) (H&E ; bar = 100 μ m)
- ภาพที่ 35 เนื้อเยื่อไตของหนูกลุ่มทดลองฉีด CPC11 ท่อไตส่วนใหญ่ตาย (N) โกลเมอรูลัสสลาย เหลือเพียงเศษเซลล์ (หัวลูกศร) บางอันเหลือเพียงช่องว่าง (*) (H&E ; bar = 100 μ m)
- ภาพที่ 36 เนื้อเยื่อไตของหนูกลุ่มทดลองฉีด CPOH โกลเมอรูลัส (G) ขยายเต็ม Bowman's space ท่อไตส่วนต้นบางท่อ เซลล์เยื่อบุฝิตายทั้งท่อ (ลูกศร) (H&E ; bar = 50 μ m)