

การวิจัยเชิงสำรวจเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่เป็นเด็กตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาคือ ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วงที่เข้ามารับการรักษานในหอผู้ป่วยเด็กเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 104 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วง ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาที่สำคัญพบว่า พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กยังไม่ดี สำหรับการรับรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กของผู้ปกครองที่ดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วง ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคอุจจาระร่วง และการรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ส่วนการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ปกครองที่มีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

This survey study aimed at identifying caregivers behavior for a care of diarrheal child complying with health promotion approach in Police General Hospital .The study was conducted on 104 caregivers of childhood diarrheal patients admitted in ward of Chalmphrueatmaharachinee forth floor of Police Hospital. The questionnaire being constructed by the researcher was used for data collection. Data analysis was made by computer statistic program for the analysis of the relationship between selected variables and the caregiver's behavior for a care of diarrheal children's relatives by Pearson's Product Moment Correlation Coefficient

The study on the caregiver's behavior for a care of diarrheal child indicated that: The caregiver's behavior for a care of diarrheal child were unsatisfactory. Perceiving concerning a care of diarrheal child had association with the caregiver's behavior for a care of diarrheal child namely perceived severity of diarrhea and perceived benefit of action to advice for a healthcare. The social support for the caregiver resulting to the health of diarrheal child had statistically significant association with the caregiver's behavior for a care of diarrheal child at a statistical significance level of .001.