

การใช้ยา lorazepam ในโครงการวิจัย

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกันระหว่าง clozapine กับ haloperidol มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา lorazepam ดังนี้มีผู้ป่วยจำนวน 4 คนต้องใช้ยา lorazepam ขนาดวันละคนละ 2 มิลลิกรัม ในจำนวนนี้ 1 คนต้องเพิ่มขนาดยาจากวันละ 2 มิลลิกรัมเป็นวันละ 4 มิลลิกรัม มี 1 คนสามารถงดใช้ยา lorazepam ได้ ตลอดโครงการวิจัยมีการใช้ยา lorazepam เฉลี่ยคนละวันละ 0.75-1.0 มิลลิกรัม (ตารางที่ 43)

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา lorazepam ดังนี้มีผู้ป่วยจำนวน 2 คนต้องใช้ยา lorazepam ขนาดวันละคนละ 2 มิลลิกรัม ในจำนวนนี้ 1คนต้องใช้ยา lorazepam เมื่ออยู่ในระยะท้ายๆของโครงการวิจัยแล้ว ตลอดโครงการวิจัยมีการใช้ยา lorazepam เฉลี่ยวันละคนละ 0.25-0.50 มิลลิกรัม (ตารางที่ 44)

ตารางที่ 43 แสดงยา lorazepam ที่มีการใช้เพิ่มเติมจากยาหลักของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol															
ลำดับ ที่	คำ นำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	ขนาดยา lorazepam (มิลลิกรัม/วัน) ขณะอยู่ในโครงการวิจัย												
			เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24
1	นส	ศคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	นส	อาร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	นส	กรว	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	นาย	ถรพ	2	2	2	2	2	2	2	2	0	4	4	4	4
5	พระ	สมพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	นาย	บุญธ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	พระ	สุต	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	นส	จพล	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เฉลี่ย			0.75	0.75	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00

ตารางที่ 44 แสดงยา lorazepam ที่มีการใช้เพิ่มเติมจากยาหลักของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT															
ลำดับ ที่	คำ นำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	ขนาดยา lorazepam (มิลลิกรัม/วัน) ขณะอยู่ในโครงการวิจัย												
			เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24
1	นาย	สร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	นส	บสว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	นส	นพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	นาย	พม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	นส	สพต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	นาย	ศภฤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	นาย	ฉมค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	นาย	รณฤ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
เฉลี่ย			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50

การใช้ยา clonazepam ในโครงการวิจัย

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาาร่วมกันระหว่าง clozapine กับ haloperidol มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา clonazepam ดังนี้ไม่มีผู้ป่วยคนใดที่จิตแพทย์สั่งยา clonazepam ให้ใช้ควบคู่ไปกับยาหลักเลย (ตารางที่ 45)

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยา clonazepam ดังนี้มีผู้ป่วยจำนวน 2 คนเท่านั้นที่ต้องใช้ยา clonazepam บางเดือนบางคนใช้วันละ 4 มิลลิกรัม บางวันบางคนใช้วันละ 2 มิลลิกรัม โดยเฉลี่ยทั้งกลุ่มมีการใช้ยา clonazepam วันละคนละ 0.25-0.75 มิลลิกรัม (ตารางที่ 46)

ตารางที่ 45 แสดงยา clonazepam ที่มีการใช้เพิ่มเติมจากยาหลักของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาาร่วมกันระหว่างยา clozapine กับ haloperidol

ลำดับ ที่	คำ นำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	ขนาดยา clonazepam (มิลลิกรัม/วัน) ขณะอยู่ในโครงการวิจัย													
			เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24	
1	นส	ศคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	นส	อาร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	นส	กรว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	นาย	ถรพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	พระ	สมพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	นาย	บุญธ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	พระ	สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	นส	จพล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เฉลี่ย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ตารางที่ 46 แสดงยา clonazepam ที่มีการใช้เพิ่มเติมจากยาหลักของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยา clozapine เสริมด้วย ECT

ลำดับ ที่	คำ นำหน้า ชื่อ	ชื่อย่อ	ขนาดยา clonazepam (มิลลิกรัม/วัน) ขณะอยู่ในโครงการวิจัย													
			เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24	
1	นาย	สร	0	4	4	4	4	4	2	2	2	0	0	0	2	
2	นส	บสว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	นส	นพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	นาย	พม	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	นส	สพต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	นาย	ศภฤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	นาย	ฉมค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	นาย	รณฤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เฉลี่ย			0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	

ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาและหรือ ECT

ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + haloperidol เกิดฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยา ดังนี้ (ตารางที่ 51, 52)

อาการที่เป็นเล็กน้อยและไม่ต้องแก้ไขและมักพบในไตรมาสแรกและไตรมาสสองได้แก่ ไม่อยากทำอะไรมีนชา ง่วงตอนกลางวัน นอนมากเกินไป กล้ามเนื้อตึงเครียดหรือแข็งๆ กล้ามเนื้อสั่น ตาพร่า ปากแห้ง ท้องผูก น้ำลายมาก มีตหน้า ใจสั่น อาการเหล่านี้มักพบได้น้อยลงหรือไม่พบเลยเมื่อเข้าสู่การรักษาในไตรมาสสามและสี่

อาการที่เป็นมากและต้องแก้ไขได้แก่ ปากแห้ง ท้องผูก น้ำลายมาก อาการเหล่านี้มักเป็นในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง จากนั้นพบน้อยลง

ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT เกิดฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาดังนี้ (ตารางที่ 51, 52)

อาการที่เป็นเล็กน้อยและไม่ต้องแก้ไขและมักพบในไตรมาสแรกและไตรมาสสองได้แก่ รู้สึกไม่อยากทำอะไรมีนชา ง่วงตอนกลางวัน ปากแห้ง ท้องผูก น้ำลายมาก

อาการที่เป็นมากและต้องแก้ไขได้แก่ รู้สึกไม่อยากทำอะไรมีนชา ง่วงตอนกลางวัน ปากแห้ง ท้องผูก น้ำลายมาก อาการเหล่านี้มักเป็นในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง

ตารางที่ 51 แสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT																				
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT	เดือนที่อยู่ที่อยู่ในโครงการวิจัย	ชื่อของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยclozapine + haloperidol								รวมจำนวนคนที่เกิดอาการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT								รวมจำนวนคนที่เกิดอาการ	
		ศศม	อาร	กรว	ถรพ	สมพ	บุญธ	สุด	จพล		สร	บสว	นพ	พม	สพต	ศภฤ	ฉมค	รณฤ		
1.ไม่มีกำลังและไม่แข็งแรงเคลื่อนไหว	1.	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
2.รู้สึกไม่ยอมทำอะไร มีชา (Feeling unmotivated or numb)	1.	0	1	0	1	1	1	1	0	0(3),1(5),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	2	0(6),1(1)2(1)	
	2.	0	0	0	1	1	1	1	0	0(4),1(4),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	2	0(6),1(1)2(1)	
	3.	0	0	0	1	1	1	1	0	0(4),1(4),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	2	0(6),1(1)2(1)	
	4.	0	0	0	1	1	1	1	0	0(4),1(4),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	2	0(6),1(1)2(1)	
	5.	0	0	0	1	0	1	1	0	0(5),1(3),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	2	0(6),1(1)2(1)	
	6.	0	0	0	1	0	1	1	0	0(5),1(3),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	7.	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	8.	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
3.ง่วงในตอนกลางวัน (Daytime sedation or drowsiness)	1.	0	1	0	1	0	0	0	0	0(6),1(2),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	3.	0	0	1	1	1	0	0	0	0(5),1(3),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	4.	1	0	1	0	0	1	0	0	0(5),1(3),2(0)	0	0	1	0	0	0	0	0	0(7),1(0),2(0)	
	5.	0	1	1	0	0	0	0	0	0(6),1(2),2(0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(0).2(1)	
	6.	0	0	1	1	0	0	0	0	0(6),1(2),2(0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(0).2(1)	
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	1	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(0).2(1)	
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
4.นอนมากเกินไป (Sleeping too much)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	7.	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	

ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้มีความรู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ต้องแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาแก้ไข

ตารางที่ 51 แสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT (ค่อ)

รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT	เดือนที่ อยู่ในโครงการวิจัย	ชื่อของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยclozapine + haloperidol								รวมจำนวน คนที่เกิดอาการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT								รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและ ECT
		ศศม	อาร	กรว	กรพ	สมพ	บุญธ	สุต	จฬล		สร	บสว	นพ	พม	สพค	ศภฤ	ฉมค	รณฤ	
5.กล้ามเนื้อตึงเครียดหรือแข็งๆ (Muscle being too tense or stiff)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(3),1(5),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
6.ตาเหลือกขึ้นไปข้างบน (Oculogyric crisis)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0(7),1(0),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0(7),1(0),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
7.กล้ามเนื้อสั่น (Muscle trembling or shaking)	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0(6),1(2),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0(5),1(2),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)
	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0(6),1(2),2(0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0(6),1(2),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0(7),1(0),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
8.รู้สึกกระสับกระส่าย (Feeling restless or jittering)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)

ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ตึงแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาน้ำแก้ไข

ตารางที่ 51 แสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT (ค่อ)

รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	ชื่อของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยclozapine + haloperidol								รวมจำนวนคนที่เกิดอาการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT								รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT
		ศศม	อาร	กรว	กรพ	สมพ	บุญธ	สุต	จฬล		สร	บสว	นพ	พม	สพค	ศภฤ	ฉมค	รณฤ	
9.Tardive dyskinesia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
10.อยากเดินไปมา ไม่สามารถนั่งนิ่งได้ (Need to move around and pace, inability to sit still)	1	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	5	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	6	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	7	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	8	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	9	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	11	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	12	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
11.หลับได้ยากหรือนอนไม่หลับเลย (Troubling getting to sleep or staying asleep)	1	1	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	5	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	6	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	7	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	8	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	9	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	11	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	12	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
12.ตาพร่า (Blur vision)	1	0	0	0	0	0	0	1	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	2	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	3	0	0	0	1	1	0	0	0(6),1(2),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	5	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	6	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	7	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	8	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	9	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	11	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	
	12	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	

ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้ควารู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ต้องแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาแก้ไข

ตารางที่ 51 แสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT (ค่อ)																			
รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT	เดือนที่ อยู่ในโครงการวิจัย	ชื่อของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยclozapine + haloperidol								รวมจำนวน คนที่เกิดอาการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT								รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT
		ศศม	อาร	กรว	ถรพ	สมพ	บญธ	สุด	จฬล		สร	บสว	นพ	ทม	สพต	ศกฤ	ฉมค	รณฤ	
13.ปากแห้ง (Dry mouth)	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0(5),1(3),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0(6),1(2),2(0)	1	0	0	0	0	2	1	0	0(5),1(2),2(1)
	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0(4),1(4),2(0)	0	0	0	0	0	2	1	1	0(5),1(2),2(1)
	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0(4),1(4),2(0)	0	1	1	0	0	1	0	0	0(5),1(3),2(0)
	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0(4),1(4),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	1	0	2	0	0	0(6),1(1),2(1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0(7),1(1),2(0)
	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0(7),1(0),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	1	0	1	0	0(6),1(2),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
14.ท้องผูก (concentration)	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0(4),1(3),2(1)	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)
	2	0	0	0	2	0	1	2	1	0(4),1(2),2(2)	1	1	0	0	1	0	2	0	0(4),1(3),2(1)
	3	1	0	1	2	0	1	0	0	0(4),1(3),2(1)	2	0	1	1	0	0	1	0	0(4),1(3),2(1)
	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0(6),1(2),2(0)	2	1	1	0	1	0	0	0	0(4),1(3),2(1)
	5	1	0	1	0	0	2	0	1	0(4),1(3),2(1)	1	0	0	0	1	0	0	0	0(6),1(2),2(0)
	6	0	0	0	1	1	1	1	0	0(4),1(4),2(0)	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	7	0	0	0	0	2	0	0	0	7(0),1(0),2(1)	0	0	2	1	0	1	2	0	0(4),1(2),2(2)
	8	0	0	0	0	0	0	1	0	7(0),1(1),2(0)	0	0	0	0	2	0	0	0	0(7),1(0),2(1)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	2	0	1	0	0(6),1(1),2(1)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
15.ปัสสาวะลำบาก (Urination difficulty)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
16..น้ำลายมาก (Drooling)	1	1	2	0	1	0	1	1		0(2),1(5),2(1)	1	1	0	0	0	1	2	0	0(4),1(3),2(1)
	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0(4),1(0),2(4)	0	1	0	0	1	0	2	0	0(5),1(2),2(1)
	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0(2),1(6),2(0)	2	1	2	1	0	2	1	1	0(1),1(4),2(3)
	4	1	1	1	0	2	1	1	0	0(2),1(5),2(1)	2	1	1	0	1	1	0	0	0(3),1(4),2(1)
	5	1	0	1	0	1	0	0	1	0(4),1(4),2(0)	1	0	0	1	2	1	0	0	0(4),1(3),2(1)
	6	0	0	0	2	1	0	2	0	0(5),1(1),2(2)	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	2	0	2	1	0	0	2	0	0(4),1(1),2(3)
	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0(7),1(1),2(0)	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	1	0	1	0	0(6),1(2),2(0)
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0(6),1(2),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)

ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้ควมรู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ต้องแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาแก้ไข

ตารางที่ 51 แสดงฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT (ต่อ)

รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT	เดือนที่อยู่ในโครงการวิจัย	ชื่อของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยclozapine + haloperidol								รวมจำนวนคนที่เกิดอาการ	ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย clozapine + ECT								รายการฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยาและECT
		ศศม	อาร	กรว	ถรพ	สมพ	บุญร	สุด	จผล		สร	บสว	นพ	พม	สพต	ศภฤ	ฉมค	รณฤ	
17.น้ำหนักเพิ่ม (Weight gain)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2.	0	0	0	2	0	0	0	0	0(7),1(0),2(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	2	0	0	0	0(7),1(0),2(1)
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
18.ความจำและสมาธิ (Memory and concentration)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	1	0	0	0	0(7),1(1),2(0)
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
19.ความสามารถทางเพศเปลี่ยนแปลง (Changes in sexual functioning)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
20.ปัญหาประจำเดือนหรือเต้านม (Menstrual or breast problem)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)

ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้ควมรู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ต้องแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาแก้ไข

5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0(8),1(0),2(0)
ตัวเลขแสดงความรุนแรงของอาการ 1 หมายถึง อาการเล็กน้อย ไม่ต้องแก้ไข เพียงอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับอาการนั้น 2 หมายถึง อาการที่ต้องแก้ไข เช่น ลดขนาดยาหลักหรือให้ยาแก้ไข																		