ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การขึ้ดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม โดยการปรับกรด

ร่วมกับการเติมโซเคียมเบนโซเอต

ผู้เขียน

นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. สมชาย จอมควง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม โดยวิธีการปรับค่า ความเป็นกรค-ค่างให้เหมาะสมกับช่วงการออกฤทธิ์ของโซเคียมเบนโซเอต ใช้น้ำพริกหนุ่มจาก ร้านค้าในตลาคสคท้องถิ่นเป็นวัตถุคิบในการศึกษา ซึ่งมีจำนวนจุลินทรีย์เริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ $4.53\pm0.22 \log \text{CFU/g}$ จากการศึกษาพบว่าน้ำพริกหนุ่มที่เก็บในคู้เย็น ($4\pm1^{\circ}$ ซ) มีค่าความสว่าง (L) ใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้น ค่าสี a* ลคลง และ ค่าสี b* เพิ่มขึ้น ปริมาณกรคทั้งหมคคิคเทียบกรคซิตริก และค่าความเป็นกรค-ค่างเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมคเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ น้ำพริก หนุ่มสามารถเก็บรักษาไว้ได้ 64 ชั่วโมง โดยที่ยังคงมีจำนวนจุถินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 10 CFU/g ส่วนการเก็บในตู้บ่ม (30±1 $^{\circ}$ ซ) พบว่าค่าสี L a* b* และปริมาณกรคทั้งหมคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความเป็นกรค-ค่างลคลง ยังพบอีกว่าจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมคเพิ่มขึ้นมากกว่า 10⁶ CFU/g อย่าง รวดเร็วหลังเก็บไว้เพียง 8 ชั่วโมง จากการเติมกรดซิตริกเพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ค่าง พบว่าการ เติมกรคซิตริก ความเข้มข้น ร้อยละ 0.3 (w/v) ทำให้ค่าความเป็นกรค-ค่างลคลงเป็น 4.42±0.02 ซึ่ง เป็นช่วงที่โซเคียมเบนโซเอตออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการปรับกรคส่งผลให้การ ยอมรับโคยรวมลคลงเล็กน้อย แต่ลักษณะคุณภาพค้านสี กลิ่น รสชาติ และความเปรี้ยว ยังคง เหมือนเคิม นำน้ำพริกหนุ่มปรับกรคเติมโซเคียมเบนโซเอต 3 ระคับ คือ 0 500 และ 1,000 มก./กก. จากนั้นนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 ระดับ ตรวจจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดทุกๆ 8 ชั่วโมง พบว่าการเติม หรือไม่เติมโซเคียมเบนโซเอต เมื่อเก็บไว้ในตู้บ่ม (30±1°ซ) สามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง แต่เมื่อเก็บในตู้เย็น (4 $\pm 1^{\circ}$ ช) สามารถยืดอายุการเก็บได้เพิ่มขึ้นเป็น 64 80 และ 96 ชั่วโมง ตามลำดับของปริมาณการเติม โซเดียมเบน โซเอต

Independent Study Title Shelf Life Extension of Nam Prik Noom Using

Acidification Combined with Sodium Benzoate

Addition

Author Miss Pittayaporn Tantiyakorn

Degree Master of Science

(Food Science and Technology)

Independent Study Advisor Asst. Prof. Dr. Somchai Jomduang

ABSTRACT

The aim of this research was to study the shelf life extension of Nam Prik Noom. The acidification technique was used by adjusting pH in order to optimize sodium benzoate efficiency. Nam Prik Noom purchased from a local fresh market was used as the raw material. From the microbial study, the average initial total plate count of Nam Prik Noom was 4.53±0.22 CFU/g. The study was found that Nam Prik Noom which was stored at 4±1°C had quite constant L color value. During storage the a color value was decreased but the b color value was increased. The total acidity as citric acid and the pH level were slightly changed. The total plate count was slowly increased. The Nam Prik Noom shelf life was 64 hours to maintain less than 106 CFU/g. When it was stored in an incubator (at 30±1°C), it was found that the L, a* and b* color values were increased. The pH level was reduced but the total acidity was increased during storage. Its shelf life was less than 8 hours. The total plate count was rapidly increased to more than 106 CFU/g within 8 hours. It was found that acidification with 0.3 % (v/w) citric acid was able to reduce pH level of Nam Prik Noom to 4.42±0.02. After acidification, its total acceptance was decreased but its color, smell, taste and sour was similar to the fresh one. Various levels of sodium benzoate (0, 500 and 1,000 mg/kg) were added into the acidified Nam Prik Noom which were stored in two temperature conditions. After total plate count was performed every 8 hours, the results showed that all levels of sodium benzoate which were stored in the incubator (at 30±1°C), could only extend less than 16 hours. If they were stored in the refrigerator (at 4±1°C), the shelf life extended to 64, 80 and 96 hours, respectively, depended on the amount of sodium benzoate additions.