

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อเปอร์เซ็นต์การผลิใบ ขนาดของก้านช่อใบและเส้นผ่าศูนย์กลางยอด	19
2 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อความสูงของทรงพุ่ม ลำไยในระยะต่างๆ	20
3 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อความกว้างของทรงพุ่ม ลำไยในระยะต่างๆ	22
4 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ลำไยในระยะต่างๆ	23
5 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อเปอร์เซ็นต์การออกดอก ชนิดของช่อดอก และขนาดของช่อดอก	25
6 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่ให้สารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และใบชุดที่ 3 แก่ ต่อจำนวนดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และสัดส่วนเพศดอกของ ลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’	26
7 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่ให้สารพาโคลบิวทราโซล ให้สารในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อจำนวนผลต่อช่อ จำนวนผลร่วง และปริมาณผลผลิตของ ลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’	27
8 ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ ‘อีดอ’ ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อน้ำหนักผล เปลือก เนื้อ และเมล็ด	29

ตาราง

หน้า

9	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อความหนาเปลือก เนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้	30
10	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และชุดที่ 3 แก่ ต่อขนาดของผล ความกว้าง ยาว และสูงของผล	32
11	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่อขนาดของเมล็ด ความกว้าง ยาว และสูงของเมล็ด	33
12	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่อความยาวของเมล็ด	34
13	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่อค่าสีผิวเปลือกผล	35
14	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์	37
15	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่ออัตราการสังเคราะห์แสง	38
16	ความเข้มข้นและจำนวนครั้งของการฉีดพ่นต้นลำไยพันธุ์ 'อีดอ' ด้วยสารพาโคลบิวทราโซล ในระยะใบชุดที่ 2 และ 3 แก่ ต่ออัตราการคายน้ำ	40
17	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราดลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อเปอร์เซ็นต์การผลิใบอ่อนของลำไยพันธุ์ 'อีดอ'	42
18	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราดลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของข้อใบชุดที่ 2 และ 3 ของลำไยพันธุ์ 'อีดอ'	43

ตาราง

หน้า

19	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อความสูงของ ทรงพุ่มลำไยพันธุ์ 'อีคอ' ในระยะต่างๆ ถึงระยะเก็บเกี่ยว	45
20	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อความกว้างทรง พุ่มของลำไยพันธุ์ 'อีคอ' ในระยะใบชุดที่ 1 แก่ ถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต	46
21	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของลำไยพันธุ์ 'อีคอ' ตั้งแต่ใบชุดที่ 1 แก่ ถึงระยะเก็บ เกี่ยวผลผลิต	47
22	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อการเกิดช่อดอก ช่อดอกล้วน ช่อดอกปนใบ และขนาดของช่อดอกของลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	49
23	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อจำนวนเพศ ดอก และสัดส่วนเพศดอกของลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	51
24	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อจำนวนผลต่อ ช่อ ปริมาณผลผลิตและจำนวนผลต่อกิโลกรัมของลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	53
25	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อขนาดของผล และขนาดของเมล็ดของลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	55
26	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อค่าสีผิวเปลือก ของผลลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	56
27	ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อความหนาของ เปลือก เนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของลำไยพันธุ์ 'อีคอ'	58

ตาราง

หน้า

- | | | |
|----|---|----|
| 28 | ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด
ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อน้ำหนักผล
เปลือก เนื้อ และเมล็ดของลำไยพันธุ์ ‘อีคอ’ | 59 |
| 29 | ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด
ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อปริมาณ
คลอโรฟิลล์ ของลำไยพันธุ์ ‘อีคอ’ ในระยะต่างๆ | 60 |
| 30 | ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด
ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่ออัตราการ
สังเคราะห์แสงของลำไยพันธุ์ ‘อีคอ’ ในระยะต่างๆ | 62 |
| 31 | ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด
ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่ออัตราการคาย
น้ำของลำไยพันธุ์ ‘อีคอ’ ในระยะต่างๆ | 63 |
| 32 | ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซล ด้วยวิธีการฉีดพ่นให้ทางใบและการราด
ลงดินในระยะที่ยอดอ่อนชุดที่ 2 และ 3 ยาว 5-10 เซนติเมตร ต่อเปอร์เซ็นต์การ
ผลิใบหลังเก็บเกี่ยว สัปดาห์ที่ 5 หลังตัดแต่งกิ่งของลำไยพันธุ์ ‘อีคอ’ | 64 |