

นันทน์กัศ โศศรีบรรเจิด 2555: ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ควบคุม โรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดนนทบุรี: ศึกษากรณีตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด
และอัตราป่วยต่ำสุด จังหวัดนนทบุรี ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:
อาจารย์วิโรจน์ มโนพิโมกษ์, Ph.D. 112 หน้า

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดนนทบุรี: ศึกษากรณีตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด อัตราป่วย
ต่ำสุด จังหวัดนนทบุรี โดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 ตำบล อำเภอบางบัวทอง จำนวน 388 คน ตำบล
วัดชะลอ 330 คน ตำบลละหาร 58 คน ประชาชน จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือในการเก็บข้อมูลใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random Sampling) (โดยแจกบัตรคิว พร้อมแจกแบบสอบถามผู้ที่ใ้
บริการที่เป็นเลขที่ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดรับสื่อ
แรงสนับสนุนทางสังคม และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) และค่า Chi-square มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference)

ผลการศึกษาพบว่า (1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 2 ตำบลที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในตำบลที่พบโรค ตำบลที่พบ
โรคต่ำ ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมการได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง
ตำบลที่พบโรคสูง ($\bar{x} = 2.84$) ตำบลที่พบโรคต่ำ ($\bar{x} = 3.11$) แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปาน
กลาง และน้อยที่สุด ตำบลที่พบโรคสูง ($\bar{x} = 2.69$) ตำบลที่พบโรคต่ำ ($\bar{x} = 3.20$) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการป้องกัน อยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ตำบลที่พบโรคสูง ($\bar{x} = 2.24$) ตำบลที่พบโรคต่ำ
($\bar{x} = 2.26$) (2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน จังหวัดนนทบุรี ที่มีรายได้ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม แรงสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามตำบลที่อยู่อาศัย
ตำบลละหาร ($\bar{x} = 2.26$) และ ตำบลวัดชะลอ ($\bar{x} = 2.24$)