

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบปริมาณสารไตรอะโซฟอสในตัวอย่างดินที่ระดับความลึกต่างๆ ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกและหลังฤดูกาลเพาะปลูกในแปลงเกษตรกรกรม

แปลงที่	ปริมาณสารไตรอะโซฟอสในแปลงเกษตรกรกรม						ปริมาณสารไตรอะโซฟอสในแปลงเกษตรกรกรม					
	ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก (ฟิฟิเอ็ม)					เฉลี่ย	หลังฤดูกาลเพาะปลูก (ฟิฟิเอ็ม)					เฉลี่ย
	ระดับความลึก (เซนติเมตร)						ระดับความลึก (เซนติเมตร)					
	0-10	10-20	20-40	40-60	60-80		0-10	10-20	20-40	40-60	60-80	
1. แปลงไม่ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่มีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	0.042	0.022	0.022	0.021	0.020	0.025	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2. แปลงอนุรักษ์ดินและน้ำแบบแถบหญ้าแฝกแถวเดียว	0.030	0.030	0.030	0.026	0.013	0.026	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3. แปลงอนุรักษ์ดินและน้ำแบบแถบหญ้าธรรมชาติ	0.240	0.130	0.111	0.073	0.020	0.115	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4. แปลงอนุรักษ์ดินและน้ำแบบคูรับน้ำขอบเขา	0.272	0.150	0.041	0.027	0.022	0.102	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5. แปลงไม่ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	0.022	0.021	0.020	0.013	0.011	0.017	ND	ND	ND	ND	ND	ND

หมายเหตุ ND หมายถึง Not Detectable