

ฤทธิรงค์ พรมมาศ 2550: สารบัญยังจุลชีพจากฟองน้ำทะเลและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล ประธานกรรมการที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิพ วิเศษพงษ์พันธุ์, M.S. 128 หน้า

จากการคัดเลือกสารสกัดจากฟองน้ำ 28 ชนิด ที่สกัดด้วยสารละลายพสมรระหว่างเม็ดแอลกอฮอล์และโอลูอิน พบว่าฟองน้ำ 17 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.71 สามารถขับยังจุลชีพได้โดยสารสกัดจากฟองน้ำสีน้ำเงิน *Neopetrosia* sp. สามารถขับยังจุลชีพได้ที่สุด คือ ขับยังจุลชีพในวงกว้างถึง 11 ชนิด และเป็นสารสกัดเพียงชนิดเดียว ที่สามารถขับยังแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในกุ้งกุลาดำชนิด *Vibrio cholerae* และ *Vibrio fluvialis* และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในพืชชนิด *Rolstonia solanacearum* ได้

สารสกัดส่วนย่อยที่แยกด้วยโคลามาโตกราฟแบบคอลัมน์ จากสารสกัดฟองน้ำสีน้ำเงิน *Neopetrosia* sp. แสดงคุณสมบัติขับยังจุลชีพได้ถึงร้อยละ 76 โดยสารสกัดส่วนย่อย NEO_CC_21 และ NEO_CC_22 แสดงคุณสมบัติขับยังจุลชีพได้ที่สุด โดยขับยังจุลชีพได้ในวงกว้าง และขับยังจุลชีพเฉพาะกลุ่มได้เช่นเดียวกับสารสกัดหายา และยังมีสารสกัดส่วนย่อย NEO_CC_07 และ NEO_CC_08 ที่สามารถขับยังยีสต์และราหัง 4 ชนิด ได้ที่สุดด้วย ซึ่งมีอนามัยแก้ไขบริสุทธิ์ด้วยเครื่องแยกสาร โคลามาโตกราฟแรงคันสูง และศึกษาโครงสร้างทางเคมีด้วยไฮโดรตอน-เอ็นกอ้มาร์ คาดว่าสารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ขับยังจุลชีพ น่าจะเป็นสารกลุ่มไอโซควิโนลีนควิโนนซึ่งจำเป็นจะต้องทำการศึกษาโครงสร้างทางเคมีด้วยวิธีการทางสเปกโตรสโคปีอีก ฯ ต่อไป

แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำ *Neopetrosia* sp. พบว่ามี 8 isolate หรือคิดเป็นร้อยละ 53.33 ที่สามารถสร้างสารขับยังจุลชีพได้ โดยสามารถขับยังจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์ กุ้งกุลาดำ และพืชได้ แบคทีเรียที่ขับยังจุลชีพส่วนใหญ่ เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างแท่ง แกรนูลบ สร้างเยื่อโคลาปอร์และเยื่อไซน์ออกซิเดส และสามารถทนต่อความเค็มได้ในช่วงกว้าง

การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ฟองน้ำสีน้ำเงิน *Neopetrosia* sp. และแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นแหล่งที่สำคัญของสารขับยังจุลชีพ ที่สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดกับมนุษย์ และผลผลิตทางการเกษตรกรรมของประเทศไทยต่อไป

ฤทธิรงค์ พรมมาศ¹
ลายมือชื่อนักศึกษา

ท.ดร. อรุณรัตน์ ชัยมีชื่อประธานกรรมการ
ลายมือชื่อประธานกรรมการ

Ritthirong Prommas 2007: Antimicrobial Substances from Marine Sponges and Associated Bacteria. Master of Science (Marine Science), Major Field: Marine Science, Department of Marine Science. Thesis Advisor: Assistant Professor Puntip Wisespongpan, M.S. 128 pages.

Methanol-toluene extracts from 17 out of 28 species (60.71%) of marine sponges had antimicrobial activities. The extract of marine blue sponge *Neopetrosia* sp. showed potent antimicrobial activity as broad spectrum against 11 pathogens and unique activity against black tiger shrimp pathogens, *Vibrio cholerae* and *Vibrio fluvialis* and plant pathogen, *Rolstonia solanacearum*.

Seventy-six percent of fractions from the crude extracts of *Neopetrosia* sp. which were separated by column chromatography had antimicrobial activities. The fractions, NEO_CC_21 and NEO_CC_22 showed broad spectrum activity and the unique activity the same as the crude extracts. The other fractions, NEO_CC_07 and NEO_CC_08 had potent antifungal activity and were further purified by HPLC. The structure elucidation by ¹H-NMR suggested that the bioactive compound consisted of isoquinoline quinone. However, these compounds should be more purified and determined by other spectroscopic techniques.

Eight isolates (53.33%) of marine bacteria associated with *Neopetrosia* sp. also had antimicrobial activity against human, black tiger shrimp and plant pathogens. The antimicrobial bacteria mostly were rod, gram negative, endospore and enzyme oxidase produced and halophilic strains.

This study has indicated that *Neopetrosia* sp. and the associated marine bacteria are the promising sources of antimicrobial substances. The antimicrobial compounds could be developed for curing infectious diseases against human and agricultural pathogens in Thailand.

Ritthirong Prommas

Student's signature

P. Wisespongpan

Thesis Advisor's signature

29 / Jan 2007