


**ภาพผนวกที่ ก2** โครมาโทแกรมของกะทิสดที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid (internal standard)




**ภาพผนวกที่ ก3** โครมาโทแกรมของกะทิสดที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid (internal standard)




**ภาพผนวกที่ ก4** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก5** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก6** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก7** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**<u>ภาพผนวกที่ ก8</u>** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**<u>หมายเหตุ</u>** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก9** โครมาโทแกรมของกะทิที่ผ่านการให้ความร้อน 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก10** โครมาโทแกรมของข้าวเสาไห้หุงสุก ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก11** โครมาโทแกรมของข้าวเสาไห้หุงสุก ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก12** โครมาโทแกรมของข้าวขาวดอกมะลิ105 หุงสุก ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก13** โครมาโทแกรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุก ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก14** โครมาโทแกรมของข้าวมันเสาไห้ ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก15** โครมาโทแกรมของข้าวมันเสาไห้ ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก16** โครมาโทแกรมของข้าวมันขาวดอกมะลิ 105 ที่แยกด้วยคอลัมน์ FFAP

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid




**ภาพผนวกที่ ก17** โครมาโทแกรมของข้าวมันขาวดอกมะลิ 105 ที่แยกด้วยคอลัมน์ HP-5

**หมายเหตุ** $S_1$ คือ 2-methyl-3-heptanone, $S_2$ คือ 6-undecanone และ $S_3$ คือ 2-ethylbutanoic acid