

ทวี อินสุระ 2552: อนุกรรมวิธานและลักษณะนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการเวก ในประเทศไทย ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาป่าไม้ ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เอียดทอง, Dr.Arg. 118 หน้า

การศึกษาอนุกรรมวิธานของพรรณไม้สกุล *Artobotrys* R.Br. (ANNONACEAE) ในประเทศไทย โดยการสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ศึกษาและบันทึก ลักษณะสัณฐานและลักษณะนิเวศบางประการที่เป็นประโยชน์ในการจำแนกและจัดจำแนกในระดับชนิด โดยพิจารณาจากลักษณะสัณฐานของส่วนประกอบของดอกเป็นหลัก ประกอบกับคำบรรยาย ภาพถ่าย ภาพวาดลายเส้น และตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้กับเอกสารอ้างอิง รวมทั้งเทียบเคียงกับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในหอพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืชต่าง ๆ และตรวจความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

การศึกษารังนี้พบพรรณไม้สกุล *Artobotrys* R.Br. 15 ชนิด ได้แก่ *A. brevipes* Craib (การเวกหนัง) *A. burmanicus* A.DC. (นมจะนี) *A. grandifolius* King (การเวกใบใหญ่) *A. harmandii* Finet & Gagnep. (นมจั่ว) *A. hexapetalus* (L.f.) Bhandari (กระดังงาจีน) *A. multiflorus* C.E.C.Fisch. (การเวกช่อ) *A. oblanceolatus* Craib (ซอก) *A. siamensis* Miq. (การเวก) *A. spinosus* Craib (นาน้ำ) *A. suaveolens* Blume (ก้ำย) และ *A. vanprukii* Craib (สะบันงาเครื่อ) และเป็นการรายงานพบใหม่ในประเทศไทย 4 ชนิดคือ *A. aereus* Ast (การเวกกระ) *A. blumei* Hook. f. & Thomson (การเวกแดง) *A. havilandii* Ridl. (การเวกใบมันนาลา) และ *A. sumatrana* Miq. (การเวกสูมาตรา) จากจำนวนดังกล่าวพรรณไม้สกุล *Artobotrys* R.Br. มีนิเวศกระจายพันธุ์พบในป่าดิบชื้น 4 ชนิด ป่าเบญจพรวนและป่าดิบแล้ง 3 ชนิด ป่าดิบแล้ง 2 ชนิด สังคมพืชริมน้ำ 2 ชนิด ป่าดิบเข้า 2 ชนิด ป่าดิบชื้นและป่าพรุ 1 ชนิด และเป็นชนิดต่างประเทศนำเข้ามาปลูกพบทั่วทุกภาค 1 ชนิด สถานภาพพรรณไม้สกุลการเวกมีชนิดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง มี 4 ชนิด คือการเวกสูมาตรา การเวกหนัง การเวกกระและสะบันงาเครื่อ กลุ่มที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ มี 7 ชนิด คือ การเวกใบมันนาลา การเวกใบใหญ่ การเวกแดง นาน้ำ การเวกช่อ ซอกและนมจั่ว กลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์ มี 3 ชนิด คือ การเวก นมจะนี ก้ำย และกลุ่มที่ไม่อยู่ในภาวะสูญพันธุ์ มี 1 ชนิด คือ กระดังงาจีน

Thawee Insura 2009: Systematics and some Ecological Characteristics of *Artobotrys* R.Br. (ANNONACEAE) in Thailand. Master of Science (Forestry), Major Field: Forest Biology, Department of Forest Biology. Thesis Advisor: Assistant Professor Wichan Eiadthong, Dr.Arg. 118 pages.

The systematics of *Artobotrys* R.Br. (ANNONACEAE) in Thailand was conducted by surveying and specimen collection from natural habitats in different parts of Thailand. The morphological characteristics and some ecological data were undertaken and including description, photographies, illustration and proving by botanists. The voucher specimens were identified and compared with herbarium specimens deposited in several herbaria in Thailand.

Fifteen species were found in Thailand; *A. brevipes* Craib (Karawek Nang) *A. burmanicus* A.DC. (Nom Chanee) *A. grandifolius* King (Karawek Bai Yai) *A. harmandii* Finet & Gagnep. (Nom Ngua) *A. hexapetalus* (L.f.) Bhandari (Kradang Nga Cheen) *A. multiflorus* C.E.C.Fisch. (Karawek Chor) *A. oblanceolatus* Craib (Hok) *A. siamensis* Miq. (Karawek) *A. spinosus* Craib (Nao Nam) *A. suaveolens* Blume (Khaai) และ *A. vanprukii* Craib (Saban Nga Khruea) and whilst 4 species of *Artobotrys* are new records for Thailand; *A. aereus* Ast (Karawek Kra) *A. blumei* Hook. f. & Thomson (Karawek Daeng) *A. havilandii* Ridl. (Karawek Baiman Hala) and *A. sumatranus* Miq. (Karawek Sumatra). As for the ecological studies, 4 species are found in Moist evergreen forest, 3 species in both Mix deciduous forest and Dry evergreen forest, 2 species in Dry evergreen forest, 2 species in Riparian plant communities, 2 species in Lower mountain evergreen forest, 1 species in both Moist evergreen forest and Peat swamp forest, and 1 exotic species which is cultivated in all parts of Thailand. The conservation status of the genus *Artobotrys* R.Br. in Thailand classified into 4 groups; 4 critically endangered species (*A. aereus*, *A. brevipes*, *A. sumatranus* and *A. vanprukii*), 7 vulnerable species (*A. blumei*, *A. grandifolius*, *A. harmandii*, *A. havilandii*, *A. multiflorus*, *A. oblanceolatus* and *A. spinosus*), 3 near threatened species (*A. burmanicus*, *A. siamensis* and *A. suaveolens*) and 1 least concern species (*A. hexapetalus*).