




ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลง pH 1:1, ECe และ OM ของชุดดินอยุธยาที่ระดับความลึก 0-20 cm ภายหลังจากได้รับฝนจำลองที่เกิดจากอนุมูลซัลเฟตที่เวลาต่างๆ




ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลง NO_3^- , NH_4^+ , Total N, N_{K_d} และ $N_{T,pt}$ ของชุดดินอุรุธยาที่ระดับความลึก 0-20 cm ภายหลังจากได้รับฝนจำลองที่เกิดจากอนุโมลซัลเฟตที่เวลาต่างๆ




ภาพที่ 7 (ต่อ)



ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลง P_2O_5 , Total P, pK_d และ $P_{\Gamma,pt}$ ของชุดดินอุรุธยาที่ระดับความลึก 0-20 cm ภายหลังได้รับฝนจำลองที่เกิดจากอนุโมลซัลเฟตที่เวลาต่างๆ



ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลง K_2O , Total K, K_d และ $K_{T,pt}$ ของชุดดินอยุธยาที่ระดับความลึก 0-20 cm ภายหลังจากได้รับฝนจำลองที่เกิดจากอนุโมลซัลเฟตที่เวลาต่างๆ



ภาพที่ 10 องค์ประกอบพลังงานศักย์น้ำในใบกระเจี๊ยบเขียว ศักย์น้ำรวม (total water potential) ศักย์สารละลาย (solute potential) และศักย์ความดัน (pressure potential) ในรอบวัน (6:00–22:00 น.) เมื่อได้รับฝนจำลองที่เกิดจากอนุโมลซัลเฟตในตำรับทดลองควบคุม (a) ฝน pH 5.0 (b) ฝน pH 4.0 (c) และ ฝน pH 3.0 (d) ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา