

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความสูง (เซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	22
2	น้ำหนักลำต้นสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	23
3	น้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	24
4	เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	25
5	น้ำหนักใบสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	26
6	น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	27
7	พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	28
8	ดัชนีพื้นที่ใบ ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	29
9	น้ำหนักรากสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	30
10	น้ำหนักรากแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	31
11	น้ำหนักช่อดอกสดสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	33
12	น้ำหนักช่อดอกแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	34
13	น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	35
14	อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	36

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
15 ค่าความหวาน (องศาบริกซ์) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	37
16 ผลผลิตน้ำหนักลำต้นสด (กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิตน้ำคั้น (ลิตรต่อไร่) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	39
17 ค่าซีเอส และค่าเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ (เปอร์เซ็นต์) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	40
18 ค่าความบริสุทธิ์ (Purity) (%) และค่าน้ำตาลซูโครส (Pole) (%) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ ช่วงเก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วันหลังปลูกเมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นสารที่แตกต่างกัน	41
19 น้ำหนักเมล็ดต่อช่อดอก (กรัม) จำนวนเมล็ดต่อช่อดอก (เมล็ด) และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	43
20 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน	45
21 ความสูง (เซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	48
22 น้ำหนักลำต้นสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	49
23 น้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	50
24 เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	51
25 น้ำหนักใบสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	52
26 น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	53
27 พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	54

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
28 คัชนีพื้นที่ใบ ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	55
29 น้ำหนักรากสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	56
30 น้ำหนักรากแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	57
31 น้ำหนักช่อดอกสดสด (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	58
32 น้ำหนักช่อดอกแห้ง (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	59
33 น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อต้น) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	60
34 อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	61
35 ค่าความหวาน (องศาบริกซ์) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	63
36 ผลผลิตน้ำหนักลำต้นสด (กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิตน้ำคั้น (ลิตรต่อไร่) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	64
37 ค่าซีซีเอส และค่าเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ (เปอร์เซ็นต์) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	65
38 ค่าความบริสุทธิ์ (Purity) (%) และค่าน้ำตาลซูโครส (Pole) (%) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ ช่วงเก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วันหลังปลูกเมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	67
39 น้ำหนักเมล็ดต่อช่อดอก (กรัม) จำนวนเมล็ดต่อช่อดอก (เมล็ด) และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม) ของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	69
40 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ เมื่อได้รับการฉีดพ่น สาร Fusilade super ที่ช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน	71

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ (A), ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (B), ความเข้มของแสงแดด (C) และการระเหยของน้ำ (D) ในช่วงที่ทำการทดลองที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	14
2	ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนในช่วงที่ทำการทดลองที่ 1 ช่วงระหว่างการทดลองเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	16
3	อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ (A), ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (B), ความเข้มของแสงแดด (C) และการระเหยของน้ำ (D) ในช่วงที่ทำการทดลองที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557	18
4	ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนในช่วงที่ทำการทดลองที่ 2 ช่วงระหว่างการทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557	20