

สารบัญภาพภาคผนวก

ภาพผนวกที่		หน้า
1	การเจริญเติบโตทางลำต้นของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Rio ที่อายุ 90 วันหลังปลูก ในการทดลองที่ 1 (ก) เมื่อได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในอัตรา 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข) ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Rio ที่ได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในอัตรา 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค) ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Rio ที่ได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในอัตรา 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และ (ง) ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Rio ที่ได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในอัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร	83
2.	การปฏิบัติงานในแปลงปลูกข้าวฟ่างหวาน (การทดลองที่ 1) ก่อนการฉีดพ่นสาร Fusilade Super และ ในเวลาทำการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ที่อายุ 95 วันหลังปลูก (ก) การคลุมช่อดอกข้าวฟ่างหวาน (ข) การฉีดพ่นสาร Fusilade Super ให้แก่ข้าวฟ่างหวาน ในอัตรา 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค) แปลงปลูกของข้าวฟ่างหวาน ก่อนที่ได้รับการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในอัตราที่แตกต่างกัน และ (ง) การฉีดพ่นสาร Fusilade Super ให้แก่ข้าวฟ่างหวาน ในอัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร	85
3.	การปฏิบัติงานในแปลงปลูกข้าวฟ่างหวาน (การทดลองที่ 2) ก่อนการฉีดพ่นสาร Fusilade Super ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน (ก) การเจริญเติบโตทางลำต้นของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Rio และ KKU 40 ในแปลงปลูกและ (ข) แปลงปลูกข้าวฟ่างหวานพันธุ์ KKU 40 ที่ถูกคลุมช่อดอก (ค) ลักษณะของช่อดอกข้าวฟ่างหวานพันธุ์ KKU 40 และ (ง) การคลุมช่อดอกข้าวฟ่างหวาน	87