

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546 จำนวน 203 คน นักศึกษากรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการนับความถี่หาค่าจำนวนร้อยละ แล้วทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักศึกษาดื่มแอลกอฮอล์ 76.4%, ส่วนใหญ่ของนักศึกษาดื่มน้อย คิดเป็น 96.5%, ดื่มครั้งแรกที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 41.8% และที่ระดับปริญญาตรี 38.7% ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหนึ่ง เดือนที่ผ่านมา 41.3%, ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 68.2% เหตุผลสำคัญของการดื่มแอลกอฮอล์ คือ เพื่อการเข้าสังคม, เกิดความสนุกสนาน, ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง, ชอบรสชาติ และลดความเครียด, ประสพการณ์หลังการดื่มที่สำคัญ คือ คลื่นไส้อาเจียน, และเมาค้าง

นักศึกษาระดับปี 5 ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาระดับปี 4 ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาหญิง ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ดังนั้นการเฝ้าระวังการดื่มแอลกอฮอล์ ควรเริ่มที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปีหนึ่งด้วย

The purpose of this research was to study the pattern and character of alcohol use among pharmacy students. The study sample was 203 pharmacy students of the academic year 2003. The Structured questionnaires were self-administered. The data obtained was analysed using frequency and percentage. The hypothesis was tested by chi-square test.

The results of the study revealed that 76.4% of the students use alcohol currently. The majority of them drank in small amount. They reported their first use when studying in high school 41.9% and university level 38.7%. During the past 30 days, they drank alcohol 41.3%. Within the last year they drank alcohol 68.2%. The important reasons for using alcohol were part of the crowd, enjoy the feeling, other will approve, enjoy taste, and relief of stress.. The important experience after using alcohol were nausea and hangover.

The fifth year students drank alcohol more than the fourth year statistically significant level of .05. The frequency of alcohol drinking among male higher than female statistically significant level of .05

The data indicated that majority started drinking since high school and university level. So surveillance alcohol use may focus among high school level including the first year students.