

K 39550002 : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

คำสำคัญ : เกณฑ์ / การประเมินการใช้ยา / ยาด้านการติดเชื้อ

ลดาวัลย์ ชัยสุขสันต์ : การสำรวจเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินการใช้ยาด้านการติดเชื้อ กลุ่มบัญชียิง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (A COMPARATIVE SURVEY OF CRITERIA USED BY REGIONAL AND GENERAL HOSPITALS FOR DRUG USE EVALUATION OF ANTI-INFECTIVE AGENTS IN THE RESTRICTED DRUG GROUPS OF THE NATIONAL LIST OF ESSENTIAL DRUGS 1999) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา, รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข และ อ. ดร.ปรีชา มณฑานติกุล. 211 หน้า. ISBN 974-653-045-3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินการใช้ยาด้านการติดเชื้อกลุ่มบัญชียิง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และสอบถามความคิดเห็นของเภสัชกรเกี่ยวกับเกณฑ์ของโรงพยาบาลและเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ด้วยการใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ช่วง ส่งทางไปรษณีย์ ประชากรในช่วงที่ 1 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม จากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 92 แห่ง ช่วงที่ 2 เป็นเภสัชกรผู้รับผิดชอบในการประเมินการใช้ยาด้านการติดเชื้อ กลุ่มบัญชียิง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า

มีผู้ตอบแบบสอบถามช่วงแรกมาจากโรงพยาบาล จำนวน 88 แห่ง จากทั้งหมด 92 แห่ง (ร้อยละ 95.7) มีการประเมินการใช้ยาด้านการติดเชื้อกลุ่มบัญชียิง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในโรงพยาบาล 72 แห่ง (ร้อยละ 81.8) และรายการยาที่มีการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาลเกินร้อยละ 50 คือยา 4 รายการ คือ Ceftazidime inj., Ciprofloxacin inj., Ciprofloxacin tab. และ Imipenem+Cilastatin inj. มีผู้ตอบแบบสอบถามช่วงที่ 2 จำนวน 115 คน จากทั้งหมด 185 คน (ร้อยละ 62.1) ซึ่งมาจากโรงพยาบาล 75 แห่ง จาก 82 แห่ง (ร้อยละ 91.5) พบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการใช้ยาด้านการติดเชื้อกลุ่มบัญชียิง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของยาทั้ง 4 รายการ เป็นเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขประมาณร้อยละ 55-76 และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เหมาะสมทั้งส่วนประกอบที่มีอยู่ในเกณฑ์ และเหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินการใช้ยา และประมาณร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการมีเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่รวบรวมจากโรงพยาบาลต่างๆของยาทั้ง 4 รายการ มากกว่าร้อยละ 80 มีความเห็นว่าการเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขของยาทั้ง 4 รายการ ควรเพิ่มส่วนประกอบคือ ข้อปฏิบัติระหว่างการใช้ยา และอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และปัญหาที่พบจากการใช้เกณฑ์พบปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สั่งใช้ยาเป็นส่วนใหญ่

โดยสรุปเกณฑ์การประเมินการใช้ยา ที่ใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหากจากการใช้เกณฑ์จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์