การศึกษาลักษณะและการเพิ่มจำนวนโครโมโซมเอื้องใบไผ่ (Arundina graminifolia D.Don. Hochr.) ด้วยสารละลายโคลชิซิน แบ่งออกเป็นการทคลองย่อยที่ประกอบด้วย การศึกษา สัณฐานวิทยา และกายวิภาควิทยาส่วนประกอบของต้น การเกิดตะเกียงในสภาพธรรมชาติจนถึง ออกคอก มีรายละเอียคดังนี้

การศึกษาเทคนิคการตรวจนับจำนวนโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากของเอื้องใบไผ่ การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างปลายราก พบว่า การเก็บตัวอย่างปลายรากเอื้องใบไผ่ ในช่วงเวลา 8.00 – 10.00 น. แช่ในน้ำยารักษาสภาพเซลล์ PDB นาน 3 ชั่วโมงและย้อมด้วยสี carbol fuchsin นาน 30 นาที เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ผลการตรวจนับจำนวนโครโมโซมพบว่าเอื้องใบไผ่ มีจำนวนโครโมโซม 2n = 2x = 40

การศึกษาการชักนำให้เกิดการเพิ่มจำนวนชุดของโคร โมโซม ด้วยระดับความเข้มข้นของ สารละลายโคลชิซิน 0 0.01 0.025 0.05 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ กับชิ้นส่วนโปร โตคอร์ม พบว่า ความ เข้มข้นของสารละลายโคลชิซิน 0.01 เปอร์เซ็นต์ สามารถชักนำให้เกิดการเพิ่มจำนวนชุดของ โคร โมโซมเป็น 2 เท่า ในต้นที่ได้รับสารละลายโคลชิซินที่ความเข้มข้นสูง มีผลทำให้ต้นและ ลำลูกกล้วยแคระแกร็น ใบหนา จำนวนใบน้อยลง คอกมีขนาดใหญ่ขึ้น กลีบเลี้ยงและกลีบคอกหนา ขึ้น คอกมีสีเข้มขึ้น ก้านช่อดอกสั้น ออกดอกเร็วขึ้น ผลการตรวจนับจำนวนโคร โมโซม พบว่า 2n = 4x = 80

Abstract 203647

Characterization and chromosome doubling, using colchicines, in bamboo orchid, *Arundina graminifolia* D.Don Hochr., were conducted. Morphological studies on bamboo orchid plant, bulbil formation as well as inflorescence formation were done. In addition, anatomy of each part was studied and described in detail.

Chromosome count using root tip was investigated. Proper harvesting time for root tip, fixation period and staining duration for chromosome study were conducted. It was found that harvesting root tip at 8.00-10.00 am., pre-treating root tip in paradichlorobenzene for 3 hours and staining in carbol fuchsin for 30 minutes gave the best results for chromosome counting. Chromosome number of bamboo orchid was 2n = 2x = 40.

Colchicine, 0, 0.01, 0.025, 0.05 and 0.1 %, was utilized to induce chromosome doubling of bamboo orchid protocorms. It was found that colchicines at 0.01% was suitable to induce chromosome doubling in bamboo orchid. Plant derived from colchicine treatment showed dwarf stem and pseudobulb, thick-leaf, less number of leaves, large flower, thick-sepals and petals, dark color of flower, short inflorescence and early-flowering. Chromosome number of treated plant was 2n=4x=80.