

พิมพ์ต้นฉบับบทความวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

ไลฟอง โมนา อัคริษณู : การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา 10% โพรพิลไทโอยูเรซิล โลชั่น กับโลชั่น เบส ในผู้ป่วยซอริเอซิส วัลการิส ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (A DOUBLE-BLINDED CONTROL TRIAL OF EFFECTIVENESS OF 10% PROPYLTHIOURACIL LOTION COMPARED WITH LOTION BASE IN PATIENTS WITH PSORIASIS VULGARIS AT UNIVERSITY HOSPITAL) อ. ที่ปรึกษา : รศ. พญ. พรทิพย์ หุยประเสริฐ. 57 หน้า
ISBN 974-637-577-6

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา 10% propylthiouracil lotion (PTU lotion) เทียบกับ lotion base โดย double-blind controlled trial ในผู้ป่วย psoriasis vulgaris 31 คน โดยทา 10% PTU lotion หรือ lotion base ที่ขาขวาและซ้าย ซึ่งบรรจุในขวดเหมือนกัน โดยนัดผู้ป่วยมาเพื่อติดตามผลการรักษาทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ประเมินผลทางคลินิก โดยคำนวณหาค่าคะแนน Modified PASI ซึ่งประกอบด้วย ความแดง ความหนาและปริมาณสะเก็ดของผื่น ผลจากการศึกษาพบว่า การใช้ 10% PTU lotion ทำให้ผื่นของ psoriasis vulgaris ดีขึ้นมากกว่า การใช้ lotion base โดยที่เมื่อติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 4, 6, 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนน Modified PASI ของผื่นที่รักษาด้วย 10% PTU lotion มีค่าน้อยกว่าผื่นที่รักษาด้วย lotion base อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยการตรวจนับเม็ดเลือดและวัดระดับ thyroid stimulating hormone พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบผู้ป่วย คือ มีอาการแดง คัน ของขาด้านที่ทา 10% PTU lotion 3 ราย (11 %)

ภาควิชา
สาขาวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม