

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกยาเสพติดของวัยรุ่น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ถึง เดือนมีนาคม 2546 จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน ซึ่งดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนของเพื่อนของชอว์กิง ชุครูท (2541) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยด้านสิ่งของและบริการ และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้เพื่อนของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดแอมเฟตามีน และเพื่อนของวัยรุ่นนี้จะสามารถสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารแก่วัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีนต่อไป

Social support from peers is considered as one factor influencing the change of behaviour in breaking off drug dependence of adolescents. The purpose of this study was to examine social support from peers perceived by adolescents with amphetamine dependence. The study sample consisted of 99 adolescents with amphetamine dependence participating in a treatment program at the substance misuse and mental health clinic at Dokkhamtai Hospital, Phayao province, during February to March 2003. The instrument of this study was a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts, demographic data, and social support from peers perceived by adolescents with amphetamine dependence modified from the Peer Support Interview Form of Chorking Chukrut (1998). Data were analyzed by descriptive statistics.

The major findings demonstrated that overall, the mean score of social support from peers perceived by adolescents with amphetamine dependence was at a moderate level. Considering of each dimension, the mean score of emotional support was at a high level, whereas those of tangible and information support were at a moderate level.

The results of this study could be used as basic information for friends of adolescents with amphetamine dependence to gain information on the treatment amphetamine dependence, and their friends could be support information to adolescents with amphetamine dependence afterward.