

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงระยะยาวแบบวัดซ้ำ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทฤษฎีการปรับตนเองของ Leventhal และ Johnson (1983)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 คน ในช่วงเดือนมกราคม 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2538

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความวิตกกังวลแบบสเตทของ Spielberger และคณะ (1976) และแบบประเมินภาพลักษณ์ของ อูบล จ้างพานิช (2536) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธีวัดซ้ำ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความวิตกกังวลในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F=1.27, P>0.05$)

2. การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F=1.31, P>0.05$)

ABSTRACT

TE 153552

This study was a longitudinal design with repeated measures. The purposes of this study were to compare the anxiety and body image disturbance in mastectomy patients receiving chemotherapy. The conceptual framework for this study was constructed based on Leventhal and Johnson's theory of self-regulation (1983).

The sample comprised 40 mastectomy patients receiving chemotherapy at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University during the period between January 1994 to September 1995.

The instruments used in this study were: The State Anxiety: Form X-I (Spielberger, et al., 1976), and Body Image Questionnaire of Ubol Jaungpanich (1993). The frequency, percentage, means, standard deviation and repeated measures analysis of variance were applied for the analysis of data. The results of this study showed that:

1. There were no significant differences in anxiety in mastectomy patients receiving chemotherapy from the first course to the sixth course. ($F=1.27$, $P>0.05$).

2. There were no significant differences in body image disturbance in mastectomy patients receiving chemotherapy from the first course to the sixth course. ($F=1.13$, $P>0.05$).