

พฤติกรรมทางเพศของสตรีวัยรุ่นในสังคมไทยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยลง และมีโอกาสที่จะมีคู่นอนหลายคน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2547 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อาศัยอยู่กับบิดามารดา จำนวน 237 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศ สร้างโดยฮัทชินสัน (Hutchinson, 1995) แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสร้างโดยบัวทิพย์ ใจตรงดี (2545) จากการทบทวนวรรณกรรม ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นในส่วนของการสื่อสารเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศระหว่างบิดากับสตรีวัยรุ่นเท่ากับ .91 ระหว่างมารดากับสตรีวัยรุ่นเท่ากับ .88 และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. บิดาและมารดามีการสื่อสารเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศกับสตรีวัยรุ่นระดับน้อย
2. สตรีวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับปานกลาง
3. การสื่อสารระหว่างบิดาและมารดากับสตรีวัยรุ่นเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับต่ำ ($r = -.28$, และ $-.34$, $p < .01$)

จากผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรส่งเสริมให้บิดามารดามีการสื่อสารกับสตรีวัยรุ่นเรื่องภาวะเสี่ยงทางเพศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น

Sexual risk behaviors of female adolescents are important issue in Thai society as most teenagers are likely to initiate sexual intercourse at the young age and have multiple sexual partner. These behaviors cause an increase in sexual transmitted diseases and unplanned pregnancies. The purpose of this descriptive study was to examine the relationship between parent-teen communication and sexual risk behaviors among female adolescents. Two hundred and thirty seven samples were selected by simple random sampling among female adolescents who live with their parents and attended grades 10-12, in Uthaitani Province, Thailand.

Research instruments included a Demographic Recording Form, the Parent-teen Sexual Risk Communication, developed by Hutchinson (1995) and translated into Thai by the researcher, and the Sexual Risk Behaviors, developed by Buathip Jaitrongdee (2002) based on literature review. The latter two instruments were tested for reliability using a Cronbach's alpha coefficient. In Parent-teen Sexual Risk Communication, the father-teen communication and the mother-teen communication reliability were .91 and .88 respectively. The Sexual Risk Behaviors reliability was .94. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results of the study indicated that:

1. Father-teen sexual risk communication and mother-teen sexual risk communication were at a low level;
2. Female adolescents showed sexual risk behaviors at a moderate level ; and
3. The father-teen sexual risk communication and the mother-teen sexual risk communication had a statistically significant negative correlation with the sexual risk behaviors. ($r = -.28$ and $-.34$, $p < .01$) but the correlation was low.

The results indicate that professional nurses should promote parents to increasingly communicate with their adolescents in term of sexual risk. This is anticipate to reduce sexual risk behaviors among adolescents.