

พัฒนาฉบับนี้, บทบรรณาธิการ, บทนำ, และรายการในบทบรรณาธิการนี้เผยแพร่โดย Elsevier

คำขอ: บทบรรณาธิการ: ปัจจัยทางจิตสังคมที่ควบคู่กันกับอาการแพ้สรีระของสตรีที่เข้ารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน
Prasert, Sittichai. ปัจจัยทางจิตสังคมที่ควบคู่กันกับอาการแพ้สรีระของสตรีที่เข้ารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน
Women Attending Menopausal Clinic At Chulalongkorn Hospital
เล่มที่ 10 ฉบับที่ 1 (2539) 119 หน้า. ISBN 974-634-607-5

บทนำซึ่งตีพิมพ์ในฉบับนี้ วาดูประกอบกัน เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ควบคู่กันกับอาการแพ้สรีระของสตรีที่เข้ารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้มาใช้บริการวัยหมดประจำเดือน อายุ 40-59 ปี จำนวน 113 ราย ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2539 โดยใช้แบบวัดอาการแพ้สรีระ (CES-D (Center For Epidemiologic Studies Depression Symptomatology Scale) แบบฉบับเต็มฉบับที่ได้ใช้จากปี 1990) ร่วมกับแบบวัดสรีระ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ควบคู่กันกับอาการแพ้สรีระของสตรีที่มีผลสำคัญทางสถิติได้แก่

1.1 ปัจจัยด้านความรุนแรงของอาการในวัยหมดประจำเดือน (ที่ระดับ.01)

1.2 ปัจจัยด้านเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะบุคลิกภาพ ที่สนับสนุนการหมดประจำเดือน (ที่ระดับ.001)

2. ความทุกข์ของอาการแพ้สรีระของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เท่ากับร้อยละ 31

ภาควิชา.....จิตเวชศาสตร์
สาขาวิชา.....สุขภาพจิต
ปีการศึกษา.....2539

ลายมือชื่อนิติ.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....