

พิมพ์ต้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

มงคล ปิยสิริวัฒน์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริม
ไอโอดีนในน้ำ เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อ.บ้านตาก จ.ตาก
(Factors Affecting Adoption of Iodized Water For
Iodine Deficiency Prevention in Bantak District Tak
Province). อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนวดี บุญลือ, 131 หน้า.
ISBN 974-635-466-3.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยอมรับ
น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ได้แก่ การเปิดรับ
ข่าวสารของประชาชน คุณลักษณะทางนวัตรม รูปแบบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีน โดยกลุ่มตัวอย่างสุ่มจากประชากรใน 7 ตำบล ของ
อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 420 คน ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่า Pearson's Product Moment Correlation
Efficient และ Chi-square อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ

ผลการวิจัย พบว่า

1. กลุ่มตัวอย่าง มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำหยดเสริมไอโอดีนลงใน
น้ำดื่มจากสื่อบุคคลมากที่สุด อันได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
2. คุณลักษณะทางนวัตรมของน้ำหยดเสริมไอโอดีน ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจมากที่สุด คือ เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันโรคคอพอกได้ และส่วนใหญ่
มีการตัดสินใจใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีน ด้วยตนเองเพียงคนเดียว
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ คือ การเปิดรับข่าวสาร และรูปแบบการตัดสินใจ

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
ปีการศึกษา 2539

ลายมือชื่อนิติ *Alina*
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา *Am*
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม