

การเปรียบเทียบชนิดของตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ
ไนเตรทของผักสลัด (*Lactuca sativa* L.) ที่ปลูกในระบบ
Nutrient Film Technique (NFT)

THE COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF SHADING MATERIALS
ON GROWTH AND NITRATE CONCENTRATION OF LETTUCE
(*Lactuca sativa* L.) IN NUTRIENT FILM TECHNIQUE (NFT)

ชนะวัฒน์ เทียมบุญประเสริฐ

CHANAWAT TIAMBOONPRASERT

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปฐพีวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2550

KMITL-2007-AG-M-071-023

**THE COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF SHADING MATERIALS
ON GROWTH AND NITRATE CONCENTRATION OF LETTUCE
(*Lactuca sativa* L.) IN NUTRIENT FILM TECHNIQUE (NFT)**

CHANAWAT TIAMBOONPRASERT

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF AGRICULTURE IN SOIL SIEANCE
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2007

KMITL-2007-AG-M-071-023

COPYRIGHT 2007

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG