

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของความต้องการการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวตามการรายงานของผู้พยายามฆ่าตัวตายวัยผู้ใหญ่ในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2549 จำนวน 76 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 ถึง เดือนธันวาคม 2550 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสร้างขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดของวัตสัน เครเกิล และคณะ ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.95 ความเที่ยงใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.91

ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว โดยรวมและราย 5 ด้านอยู่ในระดับ "มาก" ($\bar{X}=3.14$, S.D.= .30) ความต้องการการดูแลด้านสัมพันธภาพ $\bar{X}=3.26$, S.D.= .36 ความต้องการทางด้านจิตใจ $\bar{X}=3.17$, S.D.=.32 ความต้องการทางด้านสังคม $\bar{X}=3.14$, S.D.= .42 ความต้องการทางด้านการแก้ไขปัญหา $\bar{X}=3.06$, S.D.=.36 และความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ $\bar{X}=3.08$, S.D.= .36 ตามลำดับ

2. พิจารณาตามรายละเอียดของแต่ละด้านของความ ต้องการ พบว่าอยู่ในระดับ "มาก" ยกเว้นความต้องการด้านสัมพันธภาพ พบระดับ "มากที่สุด" ในเรื่องต้องการให้ครอบครัวมีการรับฟังเหตุผล มีการประคับประคองอารมณ์และไม่แสดงอารมณ์ที่รุนแรงต่อกัน ($\bar{X}=3.54$, S.D.= .53) ความต้องการด้านจิตใจ พบระดับ "มากที่สุด" ในเรื่องต้องการการให้กำลังใจกันและกัน ในครอบครัวเมื่อเผชิญปัญหา ($\bar{X}=3.57$, S.D.= .52) ความต้องการด้านจิตวิญญาณ พบระดับ "มากที่สุด" ในเรื่องต้องการให้ครอบครัวเข้าใจ ให้ภัยและไม่ซ้ำเติม ($\bar{X}=3.54$, S.D.= .59) ส่วนในระดับ "น้อย" ได้แก่ความต้องการด้านจิตใจ ในเรื่องต้องการให้ครอบครัวยอมรับความคิดเห็นของท่านในทุกเรื่อง ($\bar{X}=2.12$, S.D.= .73) และความต้องการด้านการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนตัดสินใจในการแก้ปัญหาทุกอย่าง ($\bar{X}=2.46$, S.D.= .72)

3. พิจารณาความสัมพันธ์ของความ ต้องการในแต่ละด้านพบว่า ความต้องการด้านสังคม กับความต้องการด้านจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ระดับ "สูง" นอกนั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ทิศทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

The purposes of this research were to study and to determine the correlation of families caring needs as reported by suicidal attempted adult at Sukhothai Province. The sample were 76 suicidal attempted who were treated in the Public Hospital in 2006. Data were collected between October – November in 2007. The instruments was a questionnaires which were developed by researcher based on Watson and Kregel and team concepts. The questionnaires had content validity equal to 0.95 and by Conbrac's coefficient the reliability was equal to 0.91

The results of the study revealed that;

1. The samples had the caring needs from families in total and in each aspect at " high" level ($\bar{X}_{total} = 3.54$, S.D.= .53); in aspect of relationship ($\bar{X} = 3.26$, S.D.= .36); psychological aspect ($\bar{X} = 3.17$, S.D.=.32); social aspect ($\bar{X} = 3.14$, S.D.= .42); solving problem aspect ($\bar{X} = 3.06$, S.D.=.36) and spiritual aspect ($\bar{X} = 3.08$, S.D.= .36)

2. By considering in each aspect, the caring needs from family at " high" levels except at " highest" level in relationship aspect at the title of "emotional support among family member" ($\bar{X} = 3.54$, S.D.= .53); psychological aspect in the title of "family encouragement while facing the problem" ($\bar{X} = 3.57$, S.D.= .52); spiritual aspect in the title of "understand and forgive and not put them into trouble" ($\bar{X} = 3.54$, S.D.= .59); while at "least" level, the psychological needs were identified as "their opinions were accepted by the family" ($\bar{X} = 2.12$, S.D.= .73); and the problem solving aspect in the title " family member participated in the problem solving process" ($\bar{X} = 2.46$, S.D.= .72)

3. There was significant correlation ($P < .01$) between the caring needs from family in every aspects at " moderate" level, except the caring needs from family in aspect of social and spiritual was at " high" level.