

ตรวจสอบการปนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ระดับ 8, 16 และ 24 % ด้วยเทคนิค NIRS โดยใช้ปริมาณอะไมโลสเป็นดัชนี สร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยเทคนิค partial least squares regression (PLSR) พบว่า เทคนิค NIRS สามารถแยกข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ำและอะไมโลสสูงจากกันได้อย่างชัดเจน แต่ไม่อาจจะระบุระดับเปอร์เซ็นต์การปนได้ ระดับการปนและการเพิ่มของปริมาณอะไมโลสมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงมีค่า  $R^2$  เท่ากับ 0.99

นอกจากนี้ได้วัดคุณสมบัติทางด้านความหนืดด้วย Rapid visco analyser (RVA) พบว่า ค่าความหนืดสูงสุด, ค่าการคืนตัวและค่าความหนืดสุดท้ายมีความสัมพันธ์กับระดับการปน กล่าวได้ว่า คุณสมบัติด้านความหนืดสามารถบอกได้ว่าการปนข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่สามารถบอกระดับการปนได้เช่นเดียวกัน

## Abstract

235715

Detection of adulterated milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) with cv. Chainat 1 (CN 1) at 8, 16 and 24 % was conducted using NIRS technique. Amylose content was used as index of detection. Partial least squares regression (PLSR) was employed to develop calibration equations. It was found that NIRS could be separated low and high amylose content milled rice, but it could not differentiate the degree of adulteration. The degree of adulteration was found to be linearly correlated with the amylose content ( $R^2 = 0.99$ ).

In addition, the Rapid visco analyser (RVA) was used to test the viscosity properties of the samples. Results showed that peak viscosity, breakdown, setback and final viscosity were linearly correlated with degree of adulteration. Viscosity properties thus could be used to distinguish the adulterating milled rice cv. KDML 105 with CN 1, but the degree of adulteration was undetectable.