บทคัดย่อ

170325

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อผู้เขียน

นางสาวบัวษร เวชพันธ์

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

สุขศึกษา

ปีการศึกษา

2548

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ คร. สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร

ประชานกรรมการ

- 2. รองศาสตราจารย์ คร. บุญมี พันธุ์ไทย
- 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ และระยะเวลาที่ป่วย ปัจจัยด้านความรู้ในการดูแลตนเอง และการสนับสนุน จากเจ้าหน้าที่สุขภาพกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการ รักษาด้วยเคมีบำบัด โดยทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเริ่ม ในการศึกษาได้การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 380 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเองและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สุขภาพที่ดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใค-สแควร์ และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

170325

ผลการวิจัย พบว่า

- 1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัคมีจำนวนร้อยละ 73.6 ที่มีความรู้ ในการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง
- 2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัคมีจำนวนร้อยละ 77.6 ที่มีความ สามารถในการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง
- 3. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ สามารถในการคูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัคอย่างมีนัย-สำคัญทางสถิติ (P < .05) แต่ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและระยะเวลาที่ป่วยไม่ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคูแลตนเอง (P > .05)
- 4. ปัจจัยด้านความรู้ในการคูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ ในการคูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัคอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (P < .05)
- 5. ปัจจัยค้านการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการคูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษาค้วยเคมีบำบัคอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)

ABSTRACT

170325

Thesis Title

Factors Associated with Self-care Agency Among

Cancer Patients Receiving Chemotherapy in

Ramathibodi Hospital

Student's Name

Miss Bausorn Watchaphun

Degree Sought

Master of Education

Major

Health Education

Academic Year

2005

Advisory Committee

1. Dr. Sureepun Vorapongsathorn

Chairperson

2. Assoc. Prof. Dr. Boonmee Punthai

3. Asst. Prof. Nathpong Issarangura Na Ayuttaya

The purpose of this research is to study the relationships between personal factors, such as gender, income, the period of illness, the knowledge of self-care and the support from health-care providers with a self-care agency to get cancer patients receiving chemotherapy to take care of themselves. The study used Orem's Theory of Self-care. The sample group included 380 cancer patients receiving chemotherapy in Ramathibodi Hospital. The instrument was self-administered questionnaires and its contents consisted of four parts: personal factors, a knowledge of self-care, the self-care agencies, and the support of health care providers regarding cancer patients receiving chemotherapy respectively.

The data were analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation, a Chi-square test and Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient.

The results of the study were as follows.

- 1. The study indicated that cancer patients receiving chemotherapy had a high level of knowledge of self-care agency at 73.7 percent.
- 2. The study indicated that 77.6 percent of cancer patients receiving chemotherapy treatment had a high capacity to self-care agency.
- 3. Personal factors: income had a significant positive relationship to self-care agency among cancer patients receiving chemotherapy (p < .05). But gender and the period of illness did not correlate with self-care agency among cancer patients receiving chemotherapy (p > .05).
- 4. A knowledge of self-care positively correlated significantly with self-care agency among cancer patients receiving chemotherapy (p < .05).
- 5. The support from health care providers of cancer patients significantly related to self-care agency among cancer patients receiving chemotherapy (p < .05).