

ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส

ผู้วิจัย เกสรา ศรีพิชญาการ ยุพิน เพ็ชรมงคล นงนุช ไชยยศ และ แสงเดือน กฤษณรักษ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจความชุก ปัจจัย และผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 197 ราย (คู่สมรส 98 คู่ และหญิงม่าย 1 คน) การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของการกระทำความรุนแรงทางกาย ทางจิตใจ และทั้งทางกายและจิตใจในระยะ 1 ปีก่อนเก็บข้อมูลเท่ากับ ร้อยละ 10.7 (ภรรยา = 13.1% สามี = 8.2%) 38.8 (ภรรยา = 38.4% สามี = 39.2%) และ 6.6 ตามลำดับ ส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำรายงานว่าการทำนาน ๆ ครั้ง และ ระดับความรุนแรงที่กระทำเป็น เล็กน้อย จากการวิเคราะห์ด้วยโค-สแควร์หรือฟิชเชอร์พบว่าปัจจัยของการกระทำความรุนแรงทางกายและทางจิตใจ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูไม่ดี การเคยถูกกระทำความรุนแรงทางกายหรือทางวาจาในวัยเด็ก การเจ็บป่วยทางกาย ลักษณะครอบครัวแบบขยาย ผู้อื่นเป็นเจ้าของบ้านที่พักอาศัย และการสื่อสารเมื่อมีปัญหาในคู่สมรสเป็นแบบเรียกร้อง ปัจจัยของการกระทำความรุนแรงทางกายได้แก่ อายุน้อย ความพึงพอใจในงานน้อย การเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดาไม่เหมาะสม ขาดความรักจากมารดา เคยถูกละเมิดทางเพศในวัยเด็ก เคยทำร้ายตนเอง บุคลิกภาพแบบพึ่งพาผู้อื่น ดื้อเงียบ ก้าวร้าว หรืออารมณ์แปรปรวน การยอมรับการใช้ความรุนแรงทางกาย ทำกิจกรรมทางศาสนานาน ๆ ครั้ง ระยะเวลาสมรสน้อย มีบุตรไม่เกิน 1 คน และอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าคู่สมรส ปัจจัยของความรุนแรงทางจิตใจได้แก่ การพนัน ลงโทษบุตรด้วยการตี ทำร้ายสัตว์ มีปัญหากับเพื่อนในวัยเรียนบ่อย การหย่าของบิดามารดา ผู้เลี้ยงดูไม่ใช่บิดาหรือมารดา บิดามารดามีอำนาจไม่เท่าเทียมกัน บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูตีมสุราหรือใช้ยาเสพติด หรือใช้ความรุนแรงทางวาจา มีความเครียดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การทำงาน บุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำ การพูดสื่อสารกับคู่สมรสเป็นแบบพูดในขณะที่กำลังโกรธ และครอบครัวเป็นแบบสามีเป็นใหญ่ กลุ่มที่ถูกกระทำความรุนแรงทางกายหรือทางจิตใจมีการเจ็บป่วยทางกายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ถูกกระทำ กลุ่มที่ถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจมีการเล่นการพนันมากกว่ากลุ่มที่ไม่ถูกกระทำ ผู้ถูกกระทำความรุนแรงมีความรู้สึกต่อการถูกกระทำหลายลักษณะ รวมทั้งมีปัญหาทางกาย และพฤติกรรม ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะครอบครัว และพื้นฐานของครอบครัวในวัยเด็กดังกล่าวมาข้างต้นควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง ส่วนผู้ที่ถูกกระทำควรได้รับการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

คำสำคัญ ความชุก ปัจจัย ผลกระทบ ความรุนแรงในคู่สมรส

Prevalence, Factors, and Impacts of Spousal Violence

Researchers: Kasara Sripichyakan, Yupin Phianmongkhol, Nongnuch Chaiyos, and Sangduan Krisnuluck

Abstract

This survey research was conducted to explore prevalence, factors, and impacts of spousal violence. Through the accidental sampling technique, 197 persons (98 couples and 1 widow) were participated in this study. Data were collected through questionnaires. Prevalences of physical, mental, and both physical and mental violence committed within the previous year were 10.7% (wife = 13.1% husband = 8.2%), 38.8% (wife = 38.4% husband = 39.2%), and 6.6% respectively. The frequency and severity of violence were reported by the majority of the abusers as "seldom" and "slight degree." Through Chi-square or Fisher's exact, factors contributing to physical and mental violence were as followed: poor relationship among parents/guardians, experiencing physical or mental abuse as a child, experiencing physical illness, extended family, living in others' homes, and demanding communication patterns. The contributing factors of physical violence included age, job dissatisfaction, improper nourishment, lack of mothers' love, experiencing sexual abuse as a child, the history of suicidal attempts, the personality types of dependence, passive aggression, borderline, or affective one, acceptance of physical violence, rare religious practices, less than 10 years marriage, 1 child or less, and higher decision-making power. The factors of mental violence were the followings: gambling, child physical punishment, animal assaults, problems with friends as a child, parents' divorce, not being raised by parents, unequal power between parents, alcohol, drug, or verbal abuse among parents, job-unrelated stress, obsessive-compulsive personality, anger communication types, and the husband-leading family. The respondents who experienced physical or mental violence inflicted by their spouses had more physical illness than those who did not. The mentally abused persons were more likely to play gambling. Several negative feelings, physical symptoms, and unhealthy behaviors were also reported. It is suggested that anyone having personal or family characteristics as well as family background mentioned above be received more attention to prevent them from committing violence. In addition, the ones who are experiencing the violence should be provided with physical and mental care services.

Key words: Prevalence, factors, impacts, spousal violence