

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาลดความอ้วนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สำหรับวิธีการเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการออกแบบสอบถามวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน อาการข้างเคียงจากการใช้ยาลดความอ้วน ความพึงพอใจในการใช้ยา และแนวโน้มการใช้ยาลดความอ้วน ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงกลุ่มอายุ 20-30 ปี จะมีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงคลื่นไส้อาเจียนมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการหยุดยามากกว่าเพศชาย โดยที่ผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการใช้ยาลดความอ้วนมากกว่าเพศชาย และผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงจะมีแนวโน้มการใช้ยาลดความอ้วนต่อมากกว่าเพศชาย

T 156141

2. ผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงกลุ่มอายุ 31-40 ปี จะมีอาการข้างเคียงวิงเวียนศีรษะใจเต้นมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงจะเลือกวิธีการเปลี่ยนยามากกว่าเพศชาย โดยผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการใช้ยาลดความอ้วน และแนวโน้มการใช้ยาลดความอ้วนไม่แตกต่างกับเพศชาย

3. ผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จะมีอาการหงุดหงิดกระวน กระวายน้อยกว่าเพศชาย และผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิง จะเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีลดขนาดของยามากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการใช้ยาลดความอ้วนน้อยกว่าเพศชาย และผู้บริโภคยาลดความอ้วนเพศหญิงจะมีแนวโน้มการใช้ยาลดความอ้วนต่อน้อยกว่าเพศชาย

4. กลุ่มประชากรตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ยาลดความอ้วนไม่แตกต่าง โดยที่เพศ และอายุ ไม่มีอิทธิพลในการใช้ยา กลุ่มช่วงอายุที่มีความพึงพอใจใกล้เคียงมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี

5. กลุ่มประชากรตัวอย่างมีแนวโน้มการใช้ยาต่อแตกต่างกัน โดยที่เพศไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการใช้ยา แต่กลุ่มช่วงอายุที่มีการตัดสินใจใช้ยาต่อมากที่สุด คือ กลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปี

The objective of the research is to study and analyze the behavior of Ramkhamhaeng University's Students in using antiobesity drugs : Case Study of Huamark Campus. This research are both descriptive analysis and quantitative analysis. By using questionnaire collected between September to November 2003, had analyzed the behavior, satisfactory and tendency in using antiobesity drugs. The results obtained are

1. The behavior in using antiobesity drugs of women between 20-30 years will risk to feel nauseated and vomit and solve the problem by stop using antiobesity drugs more than men. Women are satisfied in using antiobesity drugs and have tendency in continual using antiobesity drugs more than men.
2. The behavior in using antiobesity drugs of women between 30-40 years will risk dizzy and will solve the problem by changing the kind of antiobesity drugs more than men. Women are satisfied and have tendency to continual using antiobesity drugs similar to men.
3. The behavior in using antiobesity drugs of women less than 20 years will risk irritability less than men and will solve the problem by reduce using antiobesity drugs more than men. Women are satisfied in using antiobesity drugs and will continual using antiobesity drugs less than men.
4. Sex and age have no influence on satisfaction level in the behavior in using antiobesity drugs of women and men aged between 31-40 years
5. The behavior in using antiobesity drug of women and men aged between 20-30 years have similar trend in continual using antiobesity drugs.