

การผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน เป็นการผ่าตัดที่พบบ่อยในโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า การศึกษาเชิงพรรณานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการ การพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ช่องท้องแบบฉุกเฉิน ได้แก่ การผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 ถึง เดือนเมษายน 2549 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และ แบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยใน ระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ซึ่งสร้างโดยผู้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ได้รับการ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และได้ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการ การพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ($\bar{X} = 3.53$, S.D. = 0.71) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการ การพยาบาลด้านร่างกายอยู่ในระดับสูงมาก ($\bar{X} = 3.65$, S.D. = 0.61) ส่วนความต้องการ การพยาบาลด้านจิตสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 3.46, 3.47$; S.D. = 0.78, 0.74, ตามลำดับ)

2. การตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบ ฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 3.29$, S.D. = 0.74) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การ ตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิต สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ($\bar{X} = 3.34, 3.28$ และ 3.26 ; S.D. = 0.71, 0.72 และ 0.78 ตามลำดับ)

ผลการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรพยาบาลควรตระหนักถึงความต้องการการพยาบาลที่อยู่ใน ระดับสูงหรือสูงมากด้วย เพื่อจะได้ให้การพยาบาลตามระดับความต้องการ และสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนและให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย ในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ตามระดับความต้องการการพยาบาล

Emergency abdominal surgery is one of the most common operations in Maetang Hospital, Chiang Mai Province. During an emergency situation, patients have no time to prepare for surgery. This descriptive study aimed to investigate the nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients. Sample consisted of 30 postoperative emergency appendectomy patients who were admitted at Maetang Hospital, Chiang Mai Province during October 2005 to April 2006. Research instrument was an Interview Form, which was composed of two parts: general data form and nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients form, developed by the researcher based on a review of literature. The instrument was validated by a panel of experts and the content validity index was 0.92. The reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient of nursing care needs questionnaires and responses of postoperative emergency abdominal patients questionnaires were 0.90 and 0.92, respectively. The data was analyzed using descriptive statistics.

The study results were:

1. The overall nursing care needs were at the highest level ($\bar{X} = 3.53$, S.D. = 0.71); When analyzed separately for each aspect, subjects had physiological needs at the highest level ($\bar{X} = 3.65$, S.D. = 0.61) and socio-psychological needs and environmental needs were at a high level ($\bar{X} = 3.46, 3.47$; S.D. = 0.78, 0.74, respectively).
2. The overall responses was at a high level ($\bar{X} = 3.29$, S.D. = 0.74); When analyzed separately for each aspect, subjects had physiological needs, socio-psychological needs and environmental needs were are at a high level ($\bar{X} = 3.34, 3.28, 3.26$; S.D. = 0.71, 0.72, 0.78, respectively).

The findings of the study would raise awareness of nursing care needs and response of postoperative emergency abdominal patients to plan and enhance nursing care.