บทคัดย่อ

T157852

การศึกษาความค้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระคับปฐมภูมิเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นบทบาทหลักที่สำคัญของพยาบาลในการจัดการคูแลอย่างมีคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความค้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระคับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพ ชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตรับผิดชอบ ของศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตล์ จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบ สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้รับบริการ ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษา พยาบาลและด้านการฟื้นฟูสภาพ และแบบสัมภาษณ์ความด้องการบริการสุขภาพอื่นๆและข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าความตรงตาม เนื้อหาเท่ากับ 0.86 และทดสอบกวามเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟากรอนบากเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า

1. ความค้องการโดยรวมของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานพบว่า มีคะแนน เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\overline{x}=2.55$; SD = 0.62) โดยความค้องการด้านการรักษาพยาบาลมี กะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาคือ ความต้องการด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสภาพ และด้านการส่งเสริมสุขภาพ ($\overline{x}=2.64, 2.59, 2.54, 2.41$; SD = 0.55, 0.65, 0.60, 0.67 ตามลำดับ)

- 2. ในค้านการส่งเสริมสุขภาพพบว่า บริการที่ผู้รับบริการต้องการมากที่สุคคือ บริการ นวคประกบ/อบสมุนไพร/นวคแพทย์แผนไทย รองลงมาคือกวามต้องการมีบริการแพทย์ทางเลือก ผสมผสานกับการรักษาค้วยยาแผนปัจจุบัน และความต้องการได้รับความรู้ ถำแนะนำ เกี่ยวกับการคูแล สุขภาพช่องปากและฟัน ($\overline{x}=2.59, 2.53, 2.52;$ SD = 0.61, 0.61, 0.63 ตามถำคับ)
- 3. ในค้านการป้องกันโรคพบว่า บริการที่ผู้รับบริการต้องการมากที่สุดคือบริการตรวง สุขภาพประจำปี รองลงมาคือ ความค้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น ($\overline{x}=2.78, 2.75;$ SD = 0.49, 0.50 ตามลำคับ)
- 4. ในค้านการรักษาพยาบาลพบว่า บริการที่ผู้รับบริการต้องการมากที่สุดคือ การได้รับ การคูแลรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วเมื่อเจ็บป่วยเฉียบพลัน/รุนแรง รองลงมาคือความค้องการให้มี แพทย์อยู่ประจำที่สูนย์สุขภาพชุมชนและความค้องการได้รับยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในยาม จำเป็น (x = 2.88, 2.83, 2.82; SD = 0.34, 0.40, 0.49 ตามลำคับ)
- 5. ในค้านการฟื้นฟูสภาพพบว่า บริการที่ผู้รับบริการต้องการมากที่สุดคือ ต้องการให้มี ทีมสุขภาพตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รองลงมาคือ ความต้องการให้มีบริการตรวจวัดความคันโลหิตใน ผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูง เมื่อทีมสุขภาพไปเยี่ยมที่บ้าน และความต้องการให้มีการประเมินและ วางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ดูแล (x = 2.71, 2.67, 2.66; SD = 0.51, 0.53, 0.52 ตามลำคับ)

ผลการศึกษากวามต้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระคับปฐมภูมิในครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมกำหนคนโยบาย ในการจัคบริการสุขภาพระคับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรคิตถ์ได้อย่างเหมาะสม ต่อไป Study of clients needs for primary care services is important because they play a major role for nurses in providing quality of care. The purpose of this study was to determine clients needs for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province. The sample was 378 adult clients, who lived in the area under the responsibility of Thoung Yunk primary care unit. The study instrument used for data collection was an interview form which composed of the clients' demographic data form, the clients needs for primary care services interview form, for health promotion, health prevention, curative care and rehabilitation, and other clients needs for primary care services and suggestions interview form. The interview form was assessed by experts with a content validity of .86 and reliability was also tested at .89 as calculated by Cronbach's alpha coefficient. Data was analyzed by descriptive statistics. The results showed that:

- 1. Total need of clients for primary care services was at a high level (x = 2.55; SD = 0.62). Curative care need was the highest followed by health prevention, rehabilitation and health promotion needs, respectively (x = 2.64, 2.59, 2.54, 2.41; SD = 0.55, 0.65, 0.60, 0.67).
- 2. For health promotion, the traditional Thai medicine need was the highest followed by need for alternative medicine complementary to conventional medicine, and dental care education need, respectively (x = 2.59, 2.53, 2.52; SD = 0.61, 0.61, 0.63).
- 3. For health prevention, the need for an annual health examination was the highest followed by the need for information about epidemics, respectively (x = 2.78, 2.75; SD = 0.49, 0.50).
- 4. For curative care, the need to receive treatment immediately when they had acute or severe illnesses was the highest followed by the need to have a doctor stand by in primary care unit, and the need to have essential drugs to be use at home, respectively ($\bar{x} = 2.88, 2.83, 2.82;$ SD = 0.34, 0.40, 0.49).
- 5. For rehabilitation, the need for home visits during chronic illness was the highest followed by the need for blood pressure checks in hypertensive patients during home visits, and the need for planning and sharing of information with home health care teams for helping the chronic illness patients and care givers, respectively (x = 2.71, 2.67, 2.66; SD = 0.51, 0.53, 0.52).

This study can be used as a data base for collaboration with multidisciplinary teams to plan appropriate policy for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province.