



ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.....
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ปริญญา

.....
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

.....
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง ไดอะตอมที่เป็นอีพิไฟต์บนใบหญ้าทะเลบริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

Epiphytic Diatoms on Seagrass Blade at Ban Pa Khlok, Phuket Province

นามผู้วิจัย นางสาวจิตติมา นิยมศิลป์ชัย

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์จิตติมา อายุตตะกะ, D.Sc.)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รองศาสตราจารย์ชัชวี แก้วสุริยจิต, วท.ม.)

หัวหน้าภาค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัทรจินดา, วท.ม.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

.....
(รองศาสตราจารย์กัญจนา วีระกุล, D. Arg.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

สิงสิงห์จิ มตาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

ไดอะตอมที่เป็นอีพิไฟต์บนใบหญ้าทะเลบริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต

Epiphytic Diatoms on Seagrass Blade at Ban Pa Khlok, Phuket Province

โดย

นางสาวจิตติมา นิยมศิลป์ชัย

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

พ.ศ. 2553

ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย 2553: ไดอะตอมที่เป็นอีฟิไฟต์บนใบหญ้าทะเลบริเวณบ้านป่าคลอก
จังหวัดภูเก็ต ปรินญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:
รองศาสตราจารย์จิตติมา อายุตตะกะ, D.Sc. 327 หน้า

ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 ได้ดำเนินการศึกษาความหลากหลายชนิดของ
อีฟิไฟต์ไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*,
Cymodocea rotundata และ *Halophila ovalis* บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
ตรวจสอบชนิดตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสง
ส่องกราด พบอีฟิไฟต์ไดอะตอมทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล มีความหลากหลายชนิดสูงสุดบน
ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* (75 ชนิด 39 สกุล) รองลงมาบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea*
rotundata (63 ชนิด 34 สกุล) ใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* (58 ชนิด 32 สกุล) และ
ใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* (44 ชนิด 22 สกุล) โดยอีฟิไฟต์ไดอะตอมชนิดที่พบบน
ใบหญ้าทะเลทุกชนิดมีทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุล สกุลที่มีความหลากหลายชนิดสูงสุด คือ *Mastogloia*
(9 ชนิด) รองลงมาคือ *Diploneis* (6 ชนิด) *Amphora* และ *Nitzschia* (5 ชนิด) ส่วนความหนาแน่น
เฉลี่ยของอีฟิไฟต์ไดอะตอม พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*
(4,953±573.24 ถึง 6,089±591.69 เซลล์/ตร.ซม.) รองลงมาบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*
(2,339±264.38 ถึง 3,007±157.33 เซลล์/ตร.ซม.) ใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii*
(2,072±215.64 ถึง 2,409±352.63 เซลล์/ตร.ซม.) และใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis*
(1,702±321.37 ถึง 2,338±211.13 เซลล์/ตร.ซม.) สกุลเด่นของอีฟิไฟต์ไดอะตอมที่พบบน
ใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด คือสกุล *Navicula*, *Amphora* และสกุล *Nitzschia*

Thitima Niyomsilpchai 2010: Epiphytic Diatoms on Seagrass Blade at Ban Pa Khlok, Phuket Province. Master of Science (Marine Science), Major Field: Marine Science, Department of Marine Science. Thesis Advisor: Associate Professor Chittima Aryuthaka, D.Sc. 327 pages.

Diversity of epiphytic diatoms on blades of different seagrass species, i.e., *Halophila ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* and *Enhalus acoroides*, was studied. Samples were collected in Ban Pa Khlok seagrass bed, Phuket Province, in October 2006 and March 2007. Identification on diatom specimens was done under a light microscope and with their photographs taken by a scanning electron microscope. Totally 75 species belonging to 39 genera were found out. There were differences in species richness on different seagrass species. All species were found on blades of *Enhalus acoroides*, while the lowest with 44 species of 22 genera was on blades of *Halophila ovalis*. On blades of middle-sized seagrass species namely, *Cymodocea rotundata* and *Thalassia hemprichii*, 63 species of 34 genera and 58 species of 32 genera, respectively were found. Forty-four species belonging to 22 genera occurred on blades of all seagrass species. Genus *Mastogloia* was the most diverse genus with 9 species while other genera such as *Diploneis*, *Amphora* and *Nitzschia* had less number of species with 6, 5 and 5 species. Mean densities of epiphytic diatoms were $1,702 \pm 321.37$ - $2,338 \pm 211.13$ cell.cm⁻², $2,072 \pm 215.64$ - $2,409 \pm 352.63$ cell.cm⁻², $2,339 \pm 264.38$ - $3,007 \pm 157.33$ cell.cm⁻² and $4,953 \pm 573.24$ - $6,089 \pm 591.69$ cell.cm⁻² on blades of *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* and *Enhalus acoroides*, respectively. Based on their abundances, the significant genera of epiphytic diatoms were *Navicula*, *Amphora* and *Nitzschia*.

Student's signature

Thesis Advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา อายุตะทะกะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ให้ความรู้ ความเมตตา อบรมสั่งสอน ตลอดจนช่วยเหลือในการวางแผนงานวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และให้ความกรุณา ในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิจิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้คำปรึกษาให้ข้อชี้แนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งยังสละเวลาช่วยตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัทรจินดา อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านแพลงก์ตอน และให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์อัลด้า วงศ์รัตน์ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ในเรื่องของแพลงก์ตอน รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการยืมตำราที่หายากและเป็นประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ Professor Dr. Hiroshi mukai ที่กรุณาให้คำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างอีฟไฟด์ ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์ และอาจารย์วรพร ธารางกูร ที่สอนให้รู้จักและรักในงานด้านแพลงก์ตอน

ขอขอบคุณ ดร.จิตตรา ตีระเมธิ อ.ธีรพงศ์ ค้างคิง อ.ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์ อ.อรรชนี ชำนาญศิลป์ อ.อภิญา ปานโชติ อ.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คุณณัฐวดี ภูคำ คุณณัฐวัฒน์ พูลพิพัทธ์ คุณชนกพร จันทระขันตี คุณณัฐวุฒิ ทองสินธุ์ พี่หมวย พี่เกศ พี่ก๊าก พี่ท็อป น้องเกด และพี่ ๆ น้องทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่มีส่วนคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คุณตา คุณยาย คุณน้า ที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูให้มีความรักความอบอุ่นเรื่อยมา และคอยเป็นกำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ T351167

จิตติมา นิยมศิลป์ชัย

พฤษภาคม 2553

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(5)
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	(9)
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการ	23
อุปกรณ์	23
วิธีการ	24
ผลการศึกษา	27
วิจารณ์	223
สรุป	232
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	235
ภาคผนวก	248
ประวัติการศึกษา และการทำงาน	327

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ลักษณะสำคัญของหญ้าทะเลที่พบบริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	4
2 ไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และปะการังเทียม	14
3 จำนวนชนิดเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	205
4 เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 ด้วยวิธีการ Duncan's test	205
5 เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550 ด้วยวิธีการ Duncan's test	205
6 ความหนาแน่นเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	210
7 เปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 ด้วยวิธีการ Duncan's test	210
8 เปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550 ด้วยวิธีการ Duncan's test	210
9 ร้อยละความหนาแน่นเฉลี่ยของของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบเด่นบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549	217
10 ร้อยละความหนาแน่นเฉลี่ยของของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบเด่นบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550	218
11 เปรียบเทียบชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาในครั้งนี้ กับการศึกษาที่ผ่านมา	224

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางผนวกที่	หน้า
ก1 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i> ในเดือนตุลาคม 2549	249
ก2 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i> ในเดือนตุลาคม 2549	254
ก3 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i> ในเดือนตุลาคม 2549	258
ก4 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i> ในเดือนตุลาคม 2549	262
ก5 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i> ในเดือนมีนาคม 2550	265
ก6 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i> ในเดือนมีนาคม 2550	270
ก7 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i> ในเดือนมีนาคม 2550	274
ก8 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i> ในเดือนมีนาคม 2550	278
ข1 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i> ในเดือนตุลาคม 2549	281
ข2 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i> ในเดือนตุลาคม 2549	288
ข3 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i> ในเดือนตุลาคม 2549	293
ข4 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i> ในเดือนตุลาคม 2549	299

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
ข5	ความหนาแน่นของอีพิไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i> ในเดือนมีนาคม 2550	304
ข6	ความหนาแน่นของอีพิไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i> ในเดือนมีนาคม 2550	311
ข7	ความหนาแน่นของอีพิไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i> ในเดือนมีนาคม 2550	316
ข8	ความหนาแน่นของอีพิไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i> ในเดือนมีนาคม 2550	322

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	แผนภาพจุดเก็บตัวอย่างหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	24
2	<i>Thalassiosira</i> sp.	70
3	<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	72
4	<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	74
5	<i>Coscinodiscus radiatus</i> Ehrenberg	76
6	<i>Actinocyclus</i> sp.1	78
7	<i>Actinocyclus</i> sp.2	80
8	<i>Actinocyclus</i> sp.3	82
9	<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	
	<i>Actinopterychus</i> sp.	84
10	<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	86
11	<i>Triceratium favus</i> Ehrenberg	88
12	<i>Lampriscus</i> sp.	
	<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	90
13	<i>Isthmia enervis</i> Ehrenberg	92
14	<i>Cymatosira lorenziana</i> Grunow	
	<i>Podocystis spathulata</i> (Schadbolt) Grunow	94
15	<i>Licmophora</i> sp.	96
16	<i>Ardissonea</i> sp.	
	<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	98
17	<i>Rhabdonema</i> sp.	
	<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	100
18	<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	102
19	<i>Lyrella</i> sp.	104

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
20	<i>Petroneis granulata</i> (Bailey) Mann. Comb. Nov.	106
21	<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	108
22	<i>M. punctifera</i> Brun	110
23	<i>M. quinquecostata</i> Grunow	112
24	<i>M. recta</i> Hustedt	114
25	<i>M. rhombica</i> Cleve	116
26	<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	118
27	<i>Mastogloia</i> sp.1	120
28	<i>Mastogloia</i> sp.2	122
29	<i>Mastogloia</i> sp.3	
	<i>Gomphonema</i> sp.	124
30	<i>Achnanthes</i> sp.	
	<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	126
31	<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	128
32	<i>Pinnularia</i> sp.	130
33	<i>Caloneis alpestris</i> (Grunow) Cleve	132
34	<i>C. liber</i> (W. Smith) Cleve	134
35	<i>C. samoensis</i> (Grunow) Cleve	136
36	<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	138
37	<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	140
38	<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	142
39	<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	144
40	<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	146
41	<i>Diploneis weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	148
42	<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	150

สารบัญภาพ (ต่อ)


ภาพที่		หน้า
43	<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	152
44	<i>Navicula</i> sp.1	154
45	<i>Navicula</i> sp.2	
	<i>Navicula</i> sp.3	156
46	<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	158
47	<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	160
48	<i>Pleurosigma</i> sp.1	162
49	<i>Pleurosigma</i> sp.2	164
50	<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	166
51	<i>Amphora obtusa</i> Gregory	168
52	<i>A. ovalis</i> Kützing	170
53	<i>A. ventricosa</i> Gregory	172
54	<i>Amphora</i> sp.1	174
55	<i>Amphora</i> sp.2	176
56	<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey	178
57	<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	180
58	<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	182
59	<i>Nitzschia</i> sp.1	184
60	<i>Nitzschia</i> sp.2	186
61	<i>Nitzschia</i> sp.3	188
62	<i>Nitzschia</i> sp.4	190
63	<i>Plagiodiscus</i> sp.	192
64	<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützing	194
65	<i>Surirella</i> sp.	196
66	<i>Campylodiscus innominatus</i> Ross & Abdin	198

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
67 <i>Campylodiscus</i> sp.	200
68 pennate diatom 1	202
69 จำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด (A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550	206
70 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด (A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550	211
71 ภาพออดินชั้น 2 มิติ จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี non-metric multidimensional scaling (MDS) ของอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือน ตุลาคม 2549 บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	212
72 เคนโครแกรมความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนตุลาคม 2549 บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	213
73 ภาพออดินชั้น 2 มิติ จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี non-metric multidimensional scaling (MDS) ของอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือน มีนาคม 2550 บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	213
74 เคนโครแกรมความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนมีนาคม 2550 บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	214
75 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล <i>Navicula</i> บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด (A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550	219
76 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล <i>Amphora</i> บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด (A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550	220
77 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล <i>Nitzschia</i> บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด (A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550	221
78 พื้นที่ต่อใบของหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต	222

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

LM	=	กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (Light Microscope)
SEM	=	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด (Scanning Electron Microscope)
μm	=	ไมโครเมตร (Micrometre)



ไดอะตอมที่เป็นอีพีไฟต์บนใบหญ้าทะเลบริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

Epiphytic Diatoms on Seagrass Blade at Ban Pa Khlok, Phuket Province

คำนำ

ระบบนิเวศหญ้าทะเล จัดเป็นระบบนิเวศชายฝั่งแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตเบื้องต้นสูง ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลนั้น จะให้ทั้งอาหารและออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิต อีกทั้งลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อนของหญ้าทะเล ยังเหมาะที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบซ่อน อนุบาล วางไข่ และแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด (Kuo and McComb, 1989; Hemminga and Carlos, 2000) จึงเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูง

นอกเหนือจากหญ้าทะเลที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังคงมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไปไม่น้อยกว่านั้นคือ อีพีไฟต์ (epiphyte) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนใบหญ้าทะเล มีทั้งพืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ผลิตขั้นต้น หรือเป็นเพียงผู้บริโภคอันดับต้น ๆ ในแหล่งหญ้าทะเลเท่านั้น สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้สามารถสร้างประชาคมได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจากแบคทีเรีย สาหร่ายขนาดเล็ก สาหร่ายขนาดใหญ่ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามมาเป็นลำดับ (จิตติมา, 2544; Borwizka and Lethbridge, 1989; Klumpp and McComb, 1989) สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งในแง่ของการเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดอะตอม ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบเด่น และมีปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาอีพีไฟต์กลุ่มอื่น ๆ (จักรี, 2537; Mukai and Kasim, 2006) จึงถือได้ว่าเป็นผู้เพิ่มผลิตขั้นต้นที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง นอกเหนือจากหญ้าทะเล นอกจากนี้ไดอะตอมยังมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นแหล่งอาหารที่ดีให้กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ (จิตรรัตน์ และคณะ, 2547; Brown *et.al*, 1997) จึงมีส่วนช่วยเกื้อหนุนให้ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลมีสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เข้ามาอาศัยอยู่อย่างมากมาย ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ อย่างอิสระในท้องทะเล ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยในแนวหญ้าทะเล เช่น ปลา กุ้ง ปู เต่าทะเล และที่สำคัญยังเป็นแหล่งจำjunแหล่งสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก นั่นคือพะยูน

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลการศึกษาอีพีไฟติกไคอะตอมยังคงมีน้อยมาก และยังไม่ปรากฏมีรายงานการศึกษาอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเลในประเทศไทยอย่างละเอียด เนื่องจากมีขนาดเซลล์ที่เล็ก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจำแนกชนิด จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด ดังนั้นการศึกษาอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเลจึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

แหล่งหญ้าทะเลบ้านปากคลอง อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่สำคัญ พบเครื่องมือประมง เช่น โป๊ะ ลอบ และอวนรุน เป็นจำนวนมาก พบความหลากหลายของหญ้าทะเลมากถึง 9 ชนิด ได้แก่ *Halodule pinifolia*, *H. uninervis*, *Halophila beccarii*, *H. minor*, *H. ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *C. serrulata*, *Thalassia hemprichii* และ *Enhalus acroides* (สมบัติ และคณะ, 2549) แพร่กระจายเป็นพื้นที่ประมาณ 2.26 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นจึงเลือกทำการศึกษาอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเลต่างชนิด บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และเป็นแนวทางให้สามารถจัดทำแผนอนุรักษ์ และป้องกันแนวหญ้าทะเลต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

- 1 ศึกษาองค์ประกอบชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเลต่างชนิด
- 2 ศึกษาความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมในระดับสกุล บนใบหญ้าทะเลต่างชนิด

การตรวจเอกสาร

หญ้าทะเล

หญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูงหรือพืชดอกที่อยู่ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะทั่วไปคล้ายกับหญ้าบก มีลำต้นใต้ดิน (rhizome) ซึ่งจะสร้างส่วนของของลำต้น (stem) และใบ (leaf) เจริญขึ้นเหนือพื้นดิน มีดอกที่สามารถผลิตเมล็ดและผลได้ หญ้าทะเลจัดอยู่ในกลุ่มพืชใต้น้ำที่มีการปรับตัวและมีวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์ มีระบบท่อลำเลียงอย่างแท้จริง ส่วนของลำต้นใต้ดินทอดขนานในแนวราบอยู่ตามพื้น มีข้อต่อ (Node) แบ่งส่วนของลำต้นใต้ดินออกเป็นช่วง ๆ

หญ้าทะเลจัดอยู่ใน Division Magnoliophyta Class Liliopsida Order Hydrocharitales อยู่ในวงศ์ 5 วงศ์ ดังนี้ Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae และ Potamogetonaceae (Kuo and den Hartog, 2001) พบแพร่กระจายตามเขตต่าง ๆ ทั่วโลก มากกว่า 60 ชนิด 13 สกุล (Short *et al.*, 2001) สำหรับประเทศไทย พบหญ้าทะเลแพร่กระจายอยู่ทั้งสองชายฝั่ง คือ ชายฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน โดยพบในหลายพื้นที่ เช่น แหล่งน้ำกร่อย หรือปากแม่น้ำที่ติดป่าชายเลน ชายฝั่งน้ำตื้นที่มีพื้นทรายหรือทรายปนโคลน และที่ลึกลับติดกับแนวปะการัง รวมแล้วพบหญ้าทะเลในเนื้อที่ประมาณ 10,600 เฮกเตอร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549) จากการสำรวจพบหญ้าทะเล ทั้งสิ้น 12 ชนิด 7 สกุล ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล (*Halodule uninervis*) หญ้ากุยช่ายเข็ม (*Halodule pinifolia*) หญ้าคาทะเล (*Enhalus acoroides*) หญ้าชะเงาเต่า (*Thalassia hemprichii*) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (*Cymodocea serrulata*) หญ้าชะเงาใบมน (*Cymodocea rotundata*) หญ้าต้นหอมทะเล (*Syringodium isoetifolium*) หญ้าตะกานน้ำเค็ม (*Ruppia maritima*) หญ้าใบมะกรูด (*Halophila ovalis*) หญ้าเงาใส (*Halophila decipiens*) หญ้าเงาเล็ก (*Halophila miner*) และหญ้าเงาแคะระ (*Halophila beccarii*) (สมบัติ และคณะ, 2549)

ลักษณะโครงสร้าง และขนาดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าทะเล มีผลทำให้แหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิดมีความหนาแน่น และความซับซ้อนต่างกัน ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ค่ามวลชีวภาพ และองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละแห่งจึงแตกต่างกันไปด้วย (Hemminga and Carlos, 2000; Moncreiff and Sullivan, 2001) den Hartog (1967) แบ่งกลุ่มของหญ้าทะเลออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปร่างลักษณะและรูปแบบการเจริญเติบโต ดังนี้

1. Syringodids เป็นกลุ่มหญ้าทะเลที่มีลักษณะแผ่นใบรูปทรงกระบอกทรงกลม เรียวยาว คล้ายใบสน พบในสกุล *Syringodium*
2. Parvozosterids เป็นกลุ่มหญ้าทะเลที่มีลักษณะแผ่นใบเล็กและแคบ พบในสกุล *Zostera* (สกุลย่อย *Zosterella*), *Halophila* และ *Halodule*
3. Magnozosterids เป็นกลุ่มหญ้าทะเลที่มีลักษณะแผ่นใบยาว แต่ไม่กว้างมากนัก พบในสกุล *Zostera* (สกุลย่อย *Zostera*), *Thalassia* และ *Cymodocea*
4. Enhalids เป็นกลุ่มหญ้าทะเลที่มีลักษณะแผ่นใบแบนยาวขนาดใหญ่ และมีส่วนเหง้าที่แข็งแรง และประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยที่แข็งแรงอีกด้วย พบในสกุล *Enhalus* และ *Posidonia*

บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 9 ชนิด ได้แก่ *Halodule pinifolia*, *H. uninervis*, *Halophila beccarii*, *H. minor*, *H. ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *C. serrulata*, *Thalassia hemprichii* และ *Enhalus acoroides* แพร่กระจายเป็นพื้นประมาณ 2.26 ตารางกิโลเมตร (สมบัติ และคณะ, 2548, 2549; Chansang and Sombat, 1994) โดยหญ้าทะเลแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังแสดงในตารางที่ 1 (Kua and den Hartog, 2001; ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้, 2543)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญของหญ้าทะเลที่พบบริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มหญ้าทะเล	ชนิดหญ้าทะเล	รูปร่างลักษณะ
Parvozosterids	<i>Halodule pinifolia</i>	ต้นตั้งตรง เกิดจากเหง้าพอมยาว แต่ละต้นมี 1-4 ใบ ใบพอมยาว กาบใบยาว 1.0-5.2 ซม. ตัวใบยาว 3.6-19.5 ซม. กว้าง 0.2-1.7 มม. ปลายใบมนแบบ obtuse และมีรอยหยักเป็นฟันเลื่อย ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบเห็นชัดเจน
	<i>H. uninervis</i>	ต้นเกิดจากเหง้าพอมยาว แต่ละต้นมี 2-4 ใบ กาบใบยาว 1.0-5.0 ซม. ตัวใบยาว 1.7-13.0 ซม. สีเขียวเข้ม กว้าง 1.0-3.4 มม. ส่วนปลายใบที่บริเวณขอบทั้งสองข้าง มีลักษณะเป็นหนามแหลม เส้นกลางใบเห็นชัดเจน

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่มหญาทะเล	ชนิดหญาทะเล	รูปร่างลักษณะ
Parvozosterids	<i>Halophila beccarii</i>	ต้นเกิดจากเหง้าพอมบาง แต่ละข้อมีช่วงห่าง 0.8-3.2 ซม. ต้นสูง 3.8-8.0 ซม. บริเวณยอดมีใบเกิดเป็นกระจุกจำนวน 4-8 ใบ ก้านใบพอมยาว ใบรียาวกว้าง 2.3-4.7 มม. ยาว 1.1-2.5 ซม. ไม่มีเส้นขวางใบ เหมือน <i>Halophila</i> ชนิดอื่น ๆ ขอบใบเรียบ และมีเกล็ดใบ 1 คู่รองรับที่ฐานใบ
	<i>Halophila minor</i>	ต้นเกิดจากเหง้าพอมบางและเปราะ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มม. แต่ละข้อมีช่วงห่าง 0.9-1.8 ซม. มีราก 1 เส้น ใบเป็นคู่ ก้านใบยาว 0.3-1.6 ซม. ตัวใบยาว 0.6-0.9 ซม. กว้าง 3.2-4.6 มม. ขอบใบเรียบ ปลายใบมน เส้นขวางใบห่าง มีเพียง 6-8 คู่ และมีเกล็ดใบ 1 คู่รองรับที่ฐานใบ
	<i>H. ovalis</i>	ต้นเกิดจากเหง้าที่อวบโอบอบบาง ต้นสูง 1.8-6.0 ซม. ก้านใบยาว 0.8-3.1 ซม. มีใบเกิดเป็นคู่ตรงข้อ รากมีจำนวน 1 เส้น ตัวใบรีรูปไข่ ยาว 0.8 ซม. กว้าง 3.0-8.1 มม. ปลายใบมนกลม ขอบใบเรียบ มีเส้นกลางใบ 1 เส้น และเส้นขวางใบ 12-19 คู่ และมีเกล็ดใบ 1 คู่รองรับที่ฐานใบ
Magnozosterids	<i>Cymodocea rotundata</i>	เป็นหญาทะเลขนาดกลาง ความสูงของต้น 10.3-24.6 ซม. แต่ละต้นมีใบ 2-5 ใบ ก้านใบยาว 2.2-5.7 ซม. ตัวใบยาว 7.1-15.8 ซม. กว้าง 1.4-3.9 มม. ใบค่อนข้างตรง หรือโค้งงอเล็กน้อย ปลายใบกลมมน ขอบใบเรียบ มีเส้นใบ 8-12 เส้น เส้นกลางใบไม่ชัดเจน

ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่มหญ้าทะเล	ชนิดหญ้าทะเล	รูปร่างลักษณะ
Magnozosterids	<i>Cymododea serrulata</i>	ต้นตั้งสูง 9.2-30.1 ซม. แต่ละต้นมีใบ 2-5 ใบ ตัวใบโค้งงอยาว 6.8-23.6 ซม. กว้าง 6.2-9.1 มม. กาบใบส่วนโคนแคบความยาวของกาบใบ 2.2-3.9 ซม. ปลายใบมนมีรอยหยักเป็นฟันเลื่อยเล็ก ๆ ขอบใบตอนล่างเรียบ เส้นใบมีจำนวน 13-17 เส้น
	<i>Thalassia hemprichii</i>	ต้นตั้งตรงจากเหง้าที่แข็งแรง แต่ละต้นมีใบ 2-6 ใบ ต้นสูง 3.4-24.2 ซม. ใบโค้งงอ ใบยาว 3.0-19.5 ซม. กว้าง 3.3-7.9 มม. กาบใบบางใส ยาว 1.9-9.5 ซม. พบเส้นใบ 7-13 เส้น เส้นกลางใบเห็นชัดเจน มีเส้นขวางใบเป็นระยะ ปลายใบมนอาจมีรอยหยักเล็ก ๆ
Enhalids	<i>Enhalus acoroides</i>	เป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ต้นตั้งตรงขึ้นมาจากเหง้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งฝังใต้ดินลึก 30-50 ซม. แต่ละต้นมีใบ 2-5 ใบ ความยาวของใบ 30-150 ซม. กว้าง 1.25-1.75 ซม. ปลายใบมน ขอบใบทั้ง 2 ข้างหนา

แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่รวมเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของหญ้าทะเลมีองค์ประกอบที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่งหาอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่งหญ้าทะเล บางชนิดอาศัยอยู่อย่างถาวร บางชนิดอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใช้แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งหาอาหาร หรืออาศัยอยู่เพียงบางฤดูกาล เพื่อใช้แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ และเป็นแหล่งอนุบาลของตัวอ่อนภายหลังจากที่ไข่ได้ฟักออกมาเป็นตัว (สุวลักษณ์, 2534; Borwizka and Lethbridge, 1989; Klumpp *et al.*, 1989; Ogden, 1980; Zlemanm and Robert, 1980)

องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนธาตุอาหาร และการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ผลิตขั้นต้น (primary producers)

ผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งหญ้าทะเล ประกอบไปด้วย หญ้าทะเล สาหร่ายขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บนตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเล หรือสาหร่ายขนาดเล็กที่เกาะตามใบ และลำต้นของหญ้าทะเล รวมไปถึงแพลงก์ตอนพืชที่อาศัยอยู่ในมวลน้ำ ซึ่งอัตราการผลิตส่วนใหญ่ได้มาจากหญ้าทะเล โดยที่อัตราการผลิตของหญ้าทะเลนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าทะเลและสภาพแวดล้อม (ซักรี, 2549) ได้มีการประมาณค่าเฉลี่ยโดยรวมของอัตราการผลิตของหญ้าทะเลอยู่ที่ 1,012 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตร (Duarte and Chiscano, 1999) นอกจากนี้สาหร่ายทะเล และแพลงก์ตอนพืชก็เป็นผู้เพิ่มผลผลิตขั้นต้นให้กับแหล่งหญ้าทะเลอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะถูกริโภกโดยสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

2. ผู้บริโภค (consumers)

2.1 ผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ (primary consumer) เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ มายโอเบนทอส และมาโครเบนทอส กุ้ง ปู ปลาบางชนิด เม่นทะเลบางชนิด เต่าทะเลบางชนิด และพญาน เป็นขั้นโดยแพลงก์ตอนสัตว์ มีการดำรงชีพลอยล่องในมวลน้ำ กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร ส่วนมายโอเบนทอสเป็นสัตว์พื้นทะเลที่มีขนาดปานกลาง มีลักษณะการกินอาหารหลายแบบ ทั้งที่กินแพลงก์ตอนพืชแบบเกาะติด แบคทีเรีย และอินทรีย์สาร เช่น ไส้เดือนตัวกลม ฮาแพดดิคอยด์ โคพีพอด ส่วนมาโครเบนทอส เป็นสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ที่มีความซุกซมสูง เช่น ไส้เดือนทะเล หอยสองฝา หอยฝาเดียว ปูบางชนิด และแอมฟิพอด โดยสัตว์กลุ่มนี้กินอินทรีย์สาร แพลงก์ตอน และสาหร่ายเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ เต่าทะเลตะนุ เต่ากระ และพญาน ที่กินหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลเป็นอาหารโดยตรง ซึ่งจะมีผลต่อการแพร่กระจายและการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลด้วย (จิตติมา, 2544; ซักรี, 2549)

2.1 ผู้บริโภคขั้นทุติยภูมิ (secondary consumer) เป็นสัตว์กลุ่มที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลา ซึ่งพบว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งที่มีความซุกซม และมีความหลากหลายชนิดของปลามาก พบได้ในช่วงที่เป็นตัวอ่อน วัยรุ่น หรือตัวเต็มวัย เนื่องจากแหล่ง

หญ้าทะเลเป็นได้ทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยสมหมาย (2538) ทำการศึกษานิคมของปลาในแนวหญ้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง พบความหลากหลายชนิดของปลามากถึง 78 ชนิด โดยปลาที่ศึกษาส่วนใหญ่ เป็นพวกที่กินเนื้อเป็นอาหาร เช่น ปลาสาก ปลากระรัง ปลาข้างเหลือง เป็นต้น

3. ผู้ย่อยสลาย (decomposers)

เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่มีขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งมีความสำคัญ และมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล คือ แบคทีเรีย และรา โดยสิ่งมีชีวิตดังกล่าว จะทำการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืช และสัตว์ที่ตายแล้ว เพื่อหมุนเวียนสารอาหารต่าง ๆ กลับคืนสู่ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล นอกจากนี้แบคทีเรีย และราก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ สัตว์ที่มีขนาดเล็กในแหล่งหญ้าทะเลอีกด้วย (สุวลักษณ์, 2534)

สัตว์ในแหล่งหญ้าทะเล จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. อาศัยอยู่ระหว่างต้นหญ้าทะเล

เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่อยู่มวลน้ำได้ดี เช่น ปลา กุ้ง หมีก เต่า และปูนา เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะใช้แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหาอาหาร และแหล่งหลบภัย (ชัชรี, 2549)

2. อาศัยอยู่บนพื้นดิน

สัตว์เหล่านี้จะอาศัยและหากินอยู่บนพื้นดินระหว่างต้นหญ้าทะเล เช่น ปู หอยบางชนิด ดาวทะเล เม่นทะเล เป็นต้น สัตว์กลุ่มนี้มีความสำคัญต่อการช่วยในกระบวนการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะกินซากสลาย ทำให้ชิ้นของซากสลายมีขนาดเล็กลง จึงทำให้แบคทีเรียสามารถย่อยสลายซากต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (ชัชรี, 2549)

3. อาศัยอยู่ในพื้นดิน

พบทั้งแบบที่อาศัยอยู่ในช่องว่างระหว่างตะกอนดิน และฝังตัวในพื้นดิน ซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในช่องว่างของตะกอนดินจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ในกลุ่มมายโอเบนทอส เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไส้เดือนตัวกลมทะเล ฮาแพดิกอยด์โคพิพอด เป็นต้น ส่วนสัตว์ที่ฝังตัวอยู่ในพื้นดิน เช่น หอย ไส้เดือนทะเลกลุ่มโพลีชีด ปูบางชนิด เป็นต้น ซึ่งสัตว์กลุ่มนี้บางชนิดจะมีการขุดพื้นและสร้างท่อในดิน จึงทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในดิน มีผลให้ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำสามารถแพร่ผ่านลงไป ในดินได้ดี (ซัซรี, 2549; Phillips and Moñez, 1988)

4. อาศัยอยู่บนใบหญ้าทะเล

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนใบหญ้าทะเลทั้งหมดนั้น เรียกกันว่า อีพิไฟต์ (epiphyte) (Borwizka and Lethbridge, 1989) ได้แก่ แบคทีเรีย ฟังไจ ไคอะตอม สาหร่ายขนาดเล็กใหญ่ สาหร่ายที่มีโครงสร้างแข็ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และยักรวมไปถึงเศษซากต่าง ๆ ของตะกอนที่เกาะ (Klumpp *et al*, 1989; Borwizka and Lethbridge, 1989) โดยสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะเกิดเป็นชั้นที่สลับซับซ้อนอยู่บนผิวใบของหญ้าทะเล สิ่งมีชีวิตจำพวกอีพิไฟต์ทั้งพืชและสัตว์ จะเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่ Bell *et al*. (1978) พบว่าปลาบางชนิดกินสิ่งมีชีวิตจำพวกอีพิไฟต์ ถึง 55-65 เปอร์เซ็นต์ของอาหารทั้งหมด เช่น ปลาในกลุ่ม omnivorous leatherjacket จะกินใบหญ้าทะเลชนิด *Posidonia australis* ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตจำพวกอีพิไฟต์ปนอยู่ด้วย นอกจากนี้ Nichols *et al*. (1985) พบว่ามีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่ได้รับสารอาหารจากอีพิไฟต์ทางอ้อมโดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไคอะตอมซึ่งถือได้ว่าเป็นอีพิไฟต์กลุ่มที่เด่น และพบในปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับอีพิไฟต์กลุ่มอื่น ๆ (ซัซรี, 2537; Sand-Jensen, 1977) จัดเป็นผู้เพิ่มผลผลิตขั้นต้นอีกแหล่งหนึ่งให้กับแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งจะถูกบริโภคโดยสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

ไดอะตอม

ไดอะตอมมีการแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางในหลายสภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งบริเวณพื้นดิน (soil habitats) และในแหล่งน้ำ (aquatic habitats) ไดอะตอมที่พบอยู่บริเวณพื้นดินส่วนมากเป็นไดอะตอมกลุ่มที่มีราฟี (raphe) ส่วนไดอะตอมที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ พบทั้งในแหล่งน้ำจืดและในทะเล ซึ่งจะมีความหลากหลายชนิดมากกว่าไดอะตอมที่พบบริเวณพื้นดิน เนื่องจากในน้ำมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตมากกว่า (ลัดดา, 2544; Lewin, 1962; Patrick and Reimer, 1966; Patrick, 1977; Werner, 1977; Barber and Harworth, 1981; Round *et al.*, 1990)

การดำรงชีพของไดอะตอม มี 2 แบบ ได้แก่ ไดอะตอมที่ดำรงชีพแบบล่องลอย (planktonic diatom) และแบบยึดเกาะ (benthic diatom) ไดอะตอมที่ดำรงชีพแบบล่องลอยนั้น พบได้ทั่วไปทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล แต่ส่วนใหญ่ที่พบมากในทะเลจะเป็นไดอะตอมกลุ่มเซนทริก (centric diatom) การเคลื่อนที่ของไดอะตอมกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ โดยการขับสารเมือกออกมาตามรูเปิดต่าง ๆ ที่อยู่บนฝาเซลล์ ส่วนไดอะตอมกลุ่มเพนเนต (pennate diatom) การดำรงชีพโดยส่วนมากจะพบเกาะอาศัยอยู่กับวัสดุต่าง ๆ ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นไดอะตอมกลุ่มที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าไดอะตอมกลุ่มอื่น การเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของไซโทพลาสซึมที่อยู่ในร่องของราฟี (raphe) โดยผ่าน central pore และ terminal pore ทั้งนี้รูปร่างของราฟีจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ส่วนเพนเนตไดอะตอมกลุ่มที่มีราฟีเทียม (pseudoraphe) มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนที่ ปกติค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่อยู่ที่ 0.2-25 ไมโครเมตรต่อวินาที (Harper, 1977) แม้ว่าการดำรงชีพที่แท้จริงของเบนติกไดอะตอม จะยึดเกาะอยู่กับวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำ แต่บางครั้งก็พบไดอะตอมกลุ่มนี้หลุดออกจากวัสดุที่เกาะติดกลายเป็นแพลงก์ตอน โดยอิทธิพลจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ และในทางตรงกันข้ามแพลงก์ตอนไดอะตอมก็อาจตกลงมาบนท้องทะเล วัสดุที่อยู่ใต้น้ำ และบริเวณที่ขึ้นและขณะน้ำลดได้เช่นเดียวกัน เบนติกไดอะตอมจึงมีชื่อเรียกหลายแบบตามประเภทของสิ่งที่ยึดเกาะต่าง ๆ ดังนี้ อาศัยอยู่บนพืชน้ำ เรียก epiphytic diatom เจริญอยู่ในเซลล์ของพืช เรียก endophytic diatom อาศัยอยู่บนวัตถุแข็ง ๆ เรียก epilithic diatom อาศัยอยู่บนขนไม้ เรียก xylophytic diatom อาศัยอยู่บนหินหรือตามซอกหิน เรียก lithophytic diatom อาศัยอยู่ในตะกอน เรียก epipellic diatom อาศัยอยู่บนทรายเรียก epipsammic diatom อาศัยอยู่ในตัวของสัตว์เรียก endozoic diatom อาศัยอยู่บนเซลล์ของแพลงก์ตอนสัตว์เรียก epizoaic diatom (McIntire and Moore, 1977; Barber and Harworth, 1981; Chin *et al.*, 1985; Round *et al.*, 1990)

อีพิไฟติกไดอะตอม (epiphytic diatom) นั้นดำรงชีพยึดเกาะอาศัยอยู่กับพืชน้ำ ในส่วนที่เป็นราก กิ่งก้าน หรือบนใบของพืชน้ำ โดยการจับสารที่เป็นเมือก (mucilage) เคลือบที่ฝาเซลล์เพื่อใช้ในการยึดเกาะกับพืชที่อาศัยอยู่ เช่น ไดอะตอมสกุล *Achanthes*, *Cocconeis* และ *Isthmia* นอกจากนี้บางชนิดยังสามารถยึดเกาะได้โดยใช้ก้านที่มีลักษณะคล้ายวุ้นที่อยู่บนฝาเซลล์ เช่น ไดอะตอมสกุล *Cymbella* และ *Comphonema* หรือใช้ฝาเซลล์ในการยึดเกาะโดยตรง (จิตติมา, 2544; Patrick and Reimer, 1966; Barber and Harworth, 1981) อีพิไฟติกไดอะตอมเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีอยู่ทั้งบริเวณน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล Paszkowycz and Ryszard (2002) พบว่ามีไดอะตอมอยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์กลุ่มกุมมาเซียน (cumaceans) ได้แก่ *Eudorella splendid*, *Vaunthompsonia inermis*, *Campylaspis maculata*, *Diastylis mawsoni*, *Nototanais antarcticus*, *Nototanais dimorphus* และ *Peraeospinosus pushkini* ถึง 110 ชนิด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นไดอะตอมกลุ่มอีพิไฟต์ 19 ชนิด โดยสกุล *Cocconeis* เป็นสกุลที่พบว่ามีจำนวนชนิดมากที่สุดถึง 10 ชนิด ได้แก่ *Cocconeis litigiosa*, *C. costata*, *C. costata* var. *hexagona*, *C. costata* v. *kerguelensis*, *C. gautieri*, *C. illustris*, *C. infirmata*, *C. melchiori*, *C. orbicularis* และ *C. schuetti* จากการที่ไดอะตอมมีคุณค่าทางอาหาร จึงได้มีการทดลองนำไดอะตอมสกุล *Nitzschia* cf. *ovalis* มาเพาะเลี้ยง เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนในระดับความเค็ม ความเป็นกรด-เบส และระยะเวลาการให้แสงสว่างที่แตกต่างกัน จนกระทั่งสามารถเพิ่มศักยภาพผลผลิต คุณค่าทางอาหาร อันได้แก่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และยังเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้ (จิตรรัตน์ และคณะ, 2547) นอกจากนี้ยังสามารถใช้อีพิไฟติกไดอะตอมเป็นเครื่องมือในการประเมิน และการจัดการระบบนิเวศทางน้ำ บริเวณ Florida Everglades โดยชนิดของไดอะตอมที่สามารถนำมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงแหล่งน้ำที่มีฟอสฟอรัสต่ำ ได้แก่ *Amphora lineolata*, *Anomoneis serians*, *A. vitrea*, *Cymbella lunata*, *C. turgid* และ *Synedra synegrotesca* ส่วนชนิดของไดอะตอมที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงแหล่งน้ำที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ *Amphora veneta*, *Epithemia adnata*, *Gomphonema parvulum*, *Navicula confervacea*, *N. minima*, *Nitzschia amphibian*, *N. fonticola*, *N. palea* และ *Rhopalodia gibba* (McCormick and Stevenson, 1988) และยังใช้ไดอะตอมที่เกาะอาศัยอยู่บนสาหร่ายเป็นตัวติดตามการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน บริเวณ Hanko Peninsula ทางตอนใต้ของชายฝั่งประเทศฟินแลนด์อีกด้วย (Leskinen and Hallfor, 1988)

สำหรับในแหล่งหญ้าทะเล อีฟิไฟติกไดอะตอมจัดเป็นผู้เพิ่มผลผลิตขั้นต้นอีกแหล่งหนึ่ง นอกเหนือจากหญ้าทะเล ซึ่งจะถูกริโภคโดยสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลต่อไป นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการขนถ่ายคาร์บอนให้กับหญ้าทะเลภายใต้สภาวะที่มีความเข้มข้นของไบคาร์บอเนต (bicarbonate) ที่ต่ำและมีความเข้มข้นของแสงต่ำ (Harlin, 1980) ในทางกลับกัน อีฟิไฟติกไดอะตอมก็ได้ผลประโยชน์จากหญ้าทะเลที่อาศัยอยู่ เนื่องจากสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำ ได้แก่ ฟอสเฟต ไนเตรต จะถูกนำมาใช้โดยหญ้าทะเลโดยผ่านระบบราก หลังจากนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายและถูกปลดปล่อยออกจากใบของหญ้าทะเล ซึ่งอีฟิไฟติกไดอะตอมสามารถนำสารดังกล่าวที่ถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่น้อยนั้นมาใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้ (Borowitzka and Lethbridge, 1989; Hillman *et al.*, 1989; Hemminga and Carlos, 2000) แต่ขณะที่ที่ปกคลุมใบหญ้าทะเลในปริมาณที่มาก ก็จะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงเนื่องจากบดบังแสงแดด มีส่วนทำให้การสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลลดลง จึงเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล (Harlin, 1975; Sand-Jensen, 1977; Shepherd *et al.*, 1989) ถึงแม้ว่าการแพร่กระจายของอีฟิไฟติกไดอะตอมที่อยู่บนใบหญ้าทะเลจะถูกจำกัดด้วยปัจจัยบางอย่าง แต่ก็ยังพบว่า มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณผลผลิตรวมของแหล่งหญ้าทะเล (จิตติมา, 2544)

ในต่างประเทศมีผู้ทำการศึกษาอีฟิไฟติกไดอะตอมบนสาหร่ายขนาดใหญ่และหญ้าทะเลหลายชนิด ดังนี้ Sullivan (1979) ศึกษาอีฟิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ *Halodule beaudettei*, *Cymodocea filiformis* และ *Thalassia testudinum* ที่บริเวณ Mississippi Sound ประเทศสหรัฐอเมริกา พบไดอะตอมทั้งสิ้น 45 ชนิด เป็นชนิดเด่น 4 ชนิด ได้แก่ *Fragilaria hyaline*, *Mastogloia pusilla* cf. *debilis*, *Licmophora* c.f. *debilis* และ *Opephora pacifica* เป็นชนิดที่สามารถจำแนกชนิดได้โดยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาทั้งสิ้น 37 ชนิด ส่วนอีก 8 ชนิด ได้แก่ *Amphora robusta*, *Diploneis oblique*, *Navicula amphipleuroides*, *N. flautica*, *N. subforcipata*, *Synedra investiens* และ *Trachyneis aspera* นั้นสามารถจำแนกชนิดได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด รายชื่อไดอะตอมที่พบ แสดงดังตารางที่ 2

Jacobs and Noten (1980) เก็บตัวอย่างหญ้าทะเล *Zostera marina* L. เพื่อทำการศึกษาอีฟิไฟติกไดอะตอม ที่บริเวณ Roscoff ประเทศฝรั่งเศส ในรอบปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 1976 – มีนาคม 1977 พบไดอะตอมทั้งสิ้น 199 ชนิด 48 สกุล ดังตารางที่ 2 โดยไดอะตอมชนิด *Cocconeis scutellum* และ *Synedra investiens* เป็นชนิดเด่นที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยจำนวนชนิดที่พบทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ ปรากฏให้เห็นว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มเข้าเดือนมีนาคม และมาก

ถึง 74 ชนิดในเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นจะลดลงเหลือ 53 ชนิดเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคมและจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมถึง 71 ชนิด โดยพบว่าการลดลงของจำนวนชนิดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการลดลงของแสง

Sullivan (1982) ศึกษาอีฟิไฟติกไคอะตอมบริเวณอ่าวฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม ปี 1881 และเดือนมีนาคม ปี 1982 โดยเก็บตัวอย่างจากสาหร่ายทะเลชนิด *Cladophora* sp. และ *Microcoleus lyngbyaceus* และหญาทะเลชนิด *Syringodium filiforme* และ *Thalassia testudinum* พบไคอะตอมที่เป็นอีฟิไฟต์ทั้งหมด 81 ชนิด 22 สกุล ดังตารางที่ 2 ไคอะตอมชนิดเด่นที่พบบนสาหร่ายทะเล ได้แก่ *Synedra barbatula*, *Licmophora dalmatica* และ *Achanathes brevipes* var. *intermedia* ส่วนไคอะตอมชนิดเด่นที่พบบนใบหญาทะเล ได้แก่ *Cocconeis scutellum* var. *parva*, *Amphora tenuissima* และ *Mastogloia crucicula*

Mazzella et al. (1994) ศึกษาความหลากหลายชนิดของอีฟิไฟติกไคอะตอมบนใบหญาทะเล *Posidonia oceanica* บริเวณเกาะ Ischia ในอ่าว Naples-Italy พบอีฟิไฟติกไคอะตอมทั้งสิ้น 56 ชนิด โดยสกุล *Cocconeis* มีความหลากหลายชนิดสูงสุด พบทั้งสิ้น 9 ชนิด

Corleet and Jones (2006) เก็บตัวอย่างหญาทะเล *Thalassia testudinum* บริเวณ Grand Cayman ประเทศอังกฤษ พบไคอะตอมทั้งสิ้น 61 ชนิด สกุลที่พบเด่น ได้แก่ *Mastogloia* และ *Cocconeis* โดยสกุล *Cocconeis* พบอาศัยอยู่บนผิวใบของหญาทะเลโดยตรง ส่วนสกุล *Mastogloia* พบอาศัยอยู่บนชั้นของสาหร่ายที่มีโครงร่างแข็ง ที่ปกคลุมใบของหญาทะเลอีกที และมีไคอะตอมสกุล *Mastogloia* เพียง 1 ชนิดเท่านั้น คือ *Mastogloia frimbriata* ที่พบเฉพาะในจุดเก็บตัวอย่างที่มีความลึกในช่วง 1.8-2.5 เมตร

สำหรับในประเทศไทย ยังไม่ปรากฏรายงานการศึกษาอีฟิไฟติกไคอะตอมบนใบหญาทะเลอย่างละเอียด มีเพียงการศึกษาอีฟิไฟต์ในภาพรวม ดังการศึกษาของ ชัชวี (2537) ที่ทำการศึกษาประชาคมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบนใบหญาทะเล *Enhalus acoroides* บริเวณแหลมหยงหล้า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าไคอะตอมเป็นอีฟิไฟต์กลุ่มที่พบเด่น และมีปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับอีฟิไฟต์กลุ่มอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีผู้ทำการศึกษาไคอะตอมบริเวณพื้นผิวหน้าดิน และพื้นผิวปะการังเทียม คือ นิรุชา (2547) ศึกษาความหลากหลายชนิด และมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก บริเวณป่าชายเลน บ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จากการศึกษาพบไคอะตอมมีความหลากหลายชนิดสูงสุด เมื่อเทียบกับสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กกลุ่มอื่น ๆ พบทั้งหมด 56 ชนิด แยกเป็นเซนธิคไคอะตอม 25 ชนิด และเพนเนตไคอะตอม 31 ชนิด โดยสกุลที่มีความหลากหลายชนิดมากที่สุดคือ *Coscinodiscus* และ *Gyrosigma* พบทั้งสิ้น 5 ชนิด รองลงมาคือ *Navicula* และ *Triceratium* พบทั้งสิ้น 4 ชนิด นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กที่พบทั้งหมดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับสารอาหาร และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ได้แก่ ซิลิเกต และอุณหภูมิ โดยพบว่าเมื่อปริมาณซิลิเกต และอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณคลอโรฟิลล์เอของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กจะเพิ่มขึ้นตาม และอรรชนี (2545) ทำการศึกษาไคอะตอมที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวปะการังเทียม ซึ่งพบไคอะตอมทั้งสิ้น 54 สกุล 117 ชนิด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และปะการังเทียม

ชนิดไคอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiformis</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	

Division Chromophyta

Class Bacillariaceae

Order Biddulphiales

<i>Actinoptychus senarius</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. grundleri</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Asterolampra marylandica</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. cleveanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Auliscus sculptus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Azpeitia nodulifer</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Biddulphia pulchella</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>B. reticulum</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Biddulphia tuomeyi</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Cyclotella caspia</i>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>C. stylorum</i>	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
<i>Lampriscus shadboltianum</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Odontella aurita</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>O. rhombus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Paralia sulcata</i>	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
<i>Triceratium dubium</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>T. favus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>T. latum</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Trigonium formosum</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Actinopterychus splendens</i>	-	-	-	✓	-	-	-	-
Order Bacillariales								
(pennate diatom)								
<i>Achnanthes biasolettiana</i>	-	-	-	✓	-	-	-	-
<i>A. brevipes</i>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<i>A. delicatula</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>A. hauckiana</i>	-	-	✓	-	-	-	-	-
<i>Amphora acuta</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. arenaria</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>A. cingulata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. coffeiformis</i>	-	-	✓	-	-	-	✓	-
<i>A. costata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Amphora cymbelloides</i>	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>A. cymbiformis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>A. exigua</i>	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
<i>A. obtusiuscula</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>A. obtusa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. ostrearia</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. ovalis</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>A. proteus</i>	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>A. pusilla</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A. robusta</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. tenerrima</i>	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
<i>A. tenuissima</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>A. ventricosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Ardissonaea formosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Auricula complexa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. machutchonicae</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Berkeleya rutilans</i>	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>Caloneis</i> cf. <i>abnormis</i>	-	-	-	✓	-	-	-	-
<i>C. samoensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>C. westii</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Campylodiscus fastuosus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>C. innominatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Climaconeis lorenzii</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Cocconeis costata</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Cocconeis deperdita</i>	✓	-	✓	-	-	-	-	-
<i>C. molesta</i>	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
<i>C. pellucida</i>	-	-	-	-	-	✓	-	-
<i>C. cf. peltoides</i>	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
<i>C. placentula</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>C. scutellum</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
<i>C. stauroneiformis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. woodii</i>	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
<i>Cyclophora</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Cymatosira elliptica</i>	-	-	-	-	✓	-	✓	-
<i>C. lorenziana</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<i>Dimeregramma minor</i>	-	-	✓	-	-	-	-	✓
<i>Diploneis crabro</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. dalmatica</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. notabilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. oblongella</i>	-	-	-	✓	-	-	-	-
<i>D. smithii</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. splendida</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. suborbicularis</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>D. vesparella</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Donkinia lata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Fagilaria virescens</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>Fallacia nummularia</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Grammatophora marina</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Grammatophora oceanica</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
<i>Licmophora abbreviata</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>L. constricta</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>L. dalmatica</i>	-	-	-	-	-	✓	✓	-
<i>L. cf. debilis</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>Lyrella abruptoides</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>L. lyra</i>	-	-	-	-	-	-	✓	✓
<i>L. hennedyi</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Mastogloia angulata</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<i>M. apiculata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. aspercula</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. binotata</i>	-	-	-	-	✓	-	✓	-
<i>M. constricta</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. corsicana</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>M. citrus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. cribosa</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>M. crucicula</i>	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
<i>M. decipiens</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>M. decussata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. exigua</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>M. fimbriata</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<i>M. horvathiana</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. lineata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. macdonaldii</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Mastogloia ovalis</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>M. ovam paschal</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>M. pseudoparadoxa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. punctifera</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<i>M. pusilla</i> Grun.	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>M. quinquecostata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. recta</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. rhombica</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Navicula abunda</i>	✓	-	-	-	-	-	-	-
<i>N. aequorea</i>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>N. agnita</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>N. arenicola</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. avenacea</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>N. cancellata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>N. diserta</i>	-	-	-	✓	-	-	✓	-
<i>N. flantica</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. gregaria</i>	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>N. rhapsoneis</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>N. hanseni</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>N. longirostris</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. normalis</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. palpetralis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>N. pavillardi</i>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>N. pseudony</i>	✓	✓	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiform</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Navicula. rotaeana</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. salinarum</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. subinflatooides</i>	-	-	-	-	-	-	✓	-
<i>N. tripunctata</i>	-	-	-	✓	-	-	-	-
<i>N. viridula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Neosynedra</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Nitzschia angularis</i>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<i>N. bacillariaeformis</i>	-	-	-	✓	-	-	✓	-
<i>N. cf. commutata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>N. constricta</i>	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>N. dissipata</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>N. marginulata</i>	-	-	-	-	✓	-	✓	-
<i>N. minutula</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<i>N. paleacea</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>N. plana</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>N. pulcherrima</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>N. vidovichii</i>	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Opephora pacifica</i>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<i>Parlibellus panduriformis</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Perissonea cruciata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Petrodictyon gemma</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Petroneis arabica</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>P. granulata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Pinnularia</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	✓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดไดอะตอม	หญ้าทะเล					สาหร่าย		ปะการังเทียม ⁽³⁾
	<i>Halodule beaudettei</i> ⁽¹⁾	<i>Cymodocea filiformis</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽¹⁾	<i>Thalassia testudinum</i> ⁽²⁾	<i>Syringodium filiforme</i> ⁽²⁾	<i>Cladophora</i> sp. ⁽²⁾	<i>Microcoleus lyngbyaceus</i> ⁽²⁾	
<i>Plagiodiscus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Plagiogramma brockmannii</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>P. pulchellum</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Plagiotropis pusilla</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Pleurosigma strigosum</i>	-	-	-	-	✓	✓	-	-
<i>Podocystis spathulata</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Psammodictyon panduriforme</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Psammodiscus nitidus</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>R. obesa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Rhopalodia gibberula</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>Striatella unipunctata</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>Surirella armoricana</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>S. fastuosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Synedra affinis</i>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<i>S. barbatula</i>	-	-	-	-	-	✓	✓	-
<i>S. fasciculata</i>	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
<i>S. laevigata</i>	-	-	-	-	✓	-	✓	-
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Trachysphenia acuminata</i>	✓	-	-	-	✓	-	-	-
<i>Trachyneis aspera</i>	-	-	-	-	-	-	-	✓

หมายเหตุ 1 = (Sullivan, 1979) 2 = (Sullivan, 1982) 3 = (อรรชนีษ์, 2545)

✓ = ตรวจพบ

- = ตรวจไม่พบ

ลักษณะพื้นที่ศึกษา

ชายฝั่งทะเลบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ มีตำแหน่งที่ตั้งประมาณ Lat 8° 01' N Long 98° 25' E เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดทั้งปี มีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน ฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน และฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ตั้งแต่ชายหาดออกไปในทะเลจะพบแนวหญ้าทะเลกว้างประมาณ 800 เมตร ขาวเกือบตลอดแนวอ่าว แต่บางบริเวณพบหญ้าทะเลเป็นหย่อม ๆ ลักษณะพื้นตะกอนดินเป็นทรายละเอียดมาก ถึงทรายละเอียดปานกลาง และในช่วง 200–400 เมตรจากขอบฝั่ง บางบริเวณจะเป็นดินโคลน มีหญ้าทะเลแพร่กระจายเป็นพื้นที่ประมาณ 2.26 ตารางกิโลเมตร (สมบัติ และคณะ, 2548) พบหญ้าทะเล 9 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (*Halodule pinifolia*), หญ้ากุยช่ายทะเล (*H. uninervis*), หญ้าเงาแคระ (*Halophila beccarii*), หญ้าเงาเล็ก (*H. minor*), หญ้าใบมะกรูด (*H. ovalis*), หญ้าชะเงาใบมน (*Cymodocea rotundata*), หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (*C. serrulata*), หญ้าชะเงาเต่า (*Thalassia hemprichii*) และ หญ้าคาทะเล (*Enhalus acoroides*) (สมบัติ และคณะ, 2548, 2549; Poovachiranon and Chansang, 1994) บริเวณนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งทำการประมงพื้นบ้านที่สำคัญ พบเครื่องมือประมง เช่น โป๊ะ ลอบ และอวนรุน จำนวนมาก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ ชุมชนชาวป่าคลอกได้เล็งเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลให้คงอยู่ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

1. ภาชนะ

1. ท่อพีวีซีปลายเปิด 2 ด้าน พร้อมจุก
2. ขวดพลาสติกสำหรับเก็บตัวอย่าง
3. น้ำยาฟอรั่มาลินเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์
4. ปากคีบ (forceps)

2. ห้องปฏิบัติการ

1. แปรงชนอ่อน
2. หลอด microcentrifuge
3. สไลด์ (slide) และกระจกปิดสไลด์ (cover glass)
4. สไลด์นับแบล็กกัตตอน (sedgwick-Rafter counting slide)
5. ไมโครปิเปต (micropipette)
6. กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงชนิดสองตา (Compound microscope) Olympus model BX 60 พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพอัตโนมัติ
7. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)
8. ชุดกรอง millipore filter
9. กระดาษกรอง ขนาด 0.22 ไมครอน
10. กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
11. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO_4)

2. เก็บตัวอย่างใบหญ้าทะเล

การเก็บตัวอย่างใบหญ้าทะเล แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างใบหญ้าทะเล 3 ชนิด คือ *Enhalus acoroides*, *Thalassia himprichii* และ *Cymodocea rotundata* เลือกเก็บใบที่ 3 (นับจากใบที่อยู่ด้านในซึ่งมีอายุน้อยสุดเป็นใบที่ 1) ตามวิธีของ Burdick and Gray (2000) โดยสอดใบหญ้าทะเลเข้าในท่อพีวีซีปลายเปิดตัดโคนใบ และปิดปลายทั้งสองด้าน เก็บตัวอย่างใบหญ้าทะเลแต่ละชนิด 3 ซ้ำ

2.2 สุ่มเก็บตัวอย่างใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* แบบไม่เลือกใบ ตามวิธีของ Kendrick (2001) โดยใช้ปากคีบดึงก้านใบให้หลุดจากลำต้น เก็บตัวอย่าง 3 ซ้ำ

2.3 รักษาสภาพตัวอย่างด้วยน้ำยาฟอร์มาลินเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์

3. คัดแยกสิ่งเกาะติดใบหญ้าทะเล

3.1 นำตัวอย่างใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด จากข้อ 2.1 และ 2.2 มาปิดด้วยแปรงขนอ่อนเพื่อให้สิ่งเกาะติดหลุดออกจากใบหญ้าทะเล วัดปริมาตรน้ำตัวอย่าง

3.2 คำนวณหาพื้นที่ใบหญ้าทะเลแต่ละชนิด (ผิวใบด้านบนและด้านล่าง) มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร

4. จำแนกชนิดและนับจำนวนอีฟิฟติกไดอะตอม

4.1 สุ่มน้ำตัวอย่างจากข้อ 3.1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และนับจำนวนอีฟิฟติกไดอะตอมระดับสกุณ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง

4.2 ทำความสะอาดเซลล์อีฟิฟติกไดอะตอม ด้วยวิธีการของ Simonsen (1947) อ้างโดย อรรถนีย์ (2545) และตรวจดูลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด (SEM) และบันทึกภาพ จำแนกชนิดโดยใช้คู่มือหลักของ ลัดดา (2544),

Hendey (1964), Barber and Haworth (1981), Jensen (1985), Round *et al.* (1990), Cox (1996) และ Hasle and Syvertsen (1996)

5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

6.1 เปรียบเทียบความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด โดยการทดสอบทางสถิติ ด้วยวิธี one-way Analysis of Variance (ANOVA) และวิธี Duncan's New Multiple-Range test (Duncan's test)

6.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของประชาคมอีพีไฟติกไคอะตอมด้วยเทคนิคการใช้หลายตัวแปร (multivariate analysis) ด้วยวิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างตามลำดับชั้น (cluster analysis) และวิธี MDS (multidimensional scaling) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PRIMER (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research)

6. สถานที่ทำการศึกษา

แหล่งหญ้าทะเล บ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. ระยะเวลาการศึกษา

เริ่มต้นการศึกษาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2549 สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2550

ผลการศึกษา

องค์ประกอบชนิดของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล

องค์ประกอบชนิดของอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้า *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 พบทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล โดยอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล *Mastogloia* มีความหลากหลายชนิดสูงที่สุดพบ 9 ชนิด รองลงมาคือ *Diploneis* พบ 6 ชนิด และสกุล *Amphora* กับ *Nitzschia* พบ 5 ชนิด ทำการจำแนกหมวดหมู่ตามระบบของ Round *et al.* (1990) ตามรายละเอียดดังนี้

Division Bacillariophyta

Class Coscinodiscophyceae (centric diatom)

Subclass Thalassiosirophyceidae

Order Thalassiosirales

Family Thalassiosiraceae

Thalassiosira sp.

Family Stephanodiscaceae

Cyclotella stilorum Brightwell

Subclass Coscinodiscophycidae

Order Paraliales

Family Paraliaceae

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve

Order Coscinodiscales

Family Coscinodiscaceae

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg

Family Hemidiscaceae

Actinocyclus sp.1

Actinocyclus sp.2

Actinocyclus sp.3

Family Heliopeltaceae

Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg*Actinoptychus* sp.

Order Asterolamprales

Family Asterolampraceae

Asterolampra marylandica Ehrenberg

Subclass Biddulphiophycidae

Order Triceratiales

Family Triceratiaceae

Triceratium favus Ehrenberg*Lampriscus* sp.

Order Biddulphiales

Family Biddulphiaceae

Biddulphia biddulphiana (J. E. Smith)*Isthmia enervis* Ehrenberg

Subclass Cymatosiropycidae

Order Cymatosirales

Family Cymatosiraceae

Cymatosira lorenziana Grunow

Class Fragilariophyceae (araphid pennate diatom)

Subclass Fragilariophycidae

Order Fragilariales

Family Fragilariaceae

Podocystis spathulata (Schadbolt) Grunow

Order Licmophorales

Family Licmophoraceae

Licmophora sp.

Order Ardissonaeales

Family Ardissonaceae

Ardissona sp.

Order Thalassionematales

Family Thalassionemataceae

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Husted

Order Rhabdonematales

Family Rhabdonemataceae

Rhabdonema sp.

Order Striatellales

Family Striatellaceae

Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow

Class Bacillariophyceae (raphid pennate diatom)

Subclass Bacillariophycidae

Order Lyrellales

Family Lyrellaceae

Lyrella lyra (Ehrenberg) Karajeva*Lyrella* sp.*Petroneis granulata* (Bailey) Mann, Comb. Nov.

Order Mastogloiales

Family Mastogloiaceae

Mastogloia fimbriata (Brightwell) Cleve*M. punctifera* Brun*M. quinquecostata* Grunow*M. recta* Hustedt*M. rhombica* Cleve*M. cf. crucicula* (Grunow) Cleve*Mastogloia* sp.1*Mastogloia* sp.2*Mastogloia* sp.3

Order Cymbellales

Family Gomphonemataceae

Gomphonema sp.

Order Achnanthales

Family Achnanthaceae

Achnanthes sp.

Family Cocconeidaceae

Cocconeis pellucida (Hantzsch) Grunow

C. scutellum Ehrenberg

Order Naviculales

Suborder Sellaphorineae

Family Pinnulariaceae

Pinnularia sp.

Caloneis alpestris (Grunow) Cleve

C. liber (W. Smith) Cleve

C. samoensis (Grunow) Cleve

Suborder Diploneidinae

Family Diploneidaceae

Diploneis crabro (Ehrenberg) Ehrenberg

D. fusca var. *pervasta* (Gregory) Cleve

D. oblongella (Naeg. ex Kütz.) Ross

D. splendida (Gregory) Cleve

D. suborbicularis (Gregory) Cleve

D. weissflogi (A. Schmidt) Cleve

Suborder Naviculineae

Family Naviculaceae

Frustulia rhomboides (Ehrenberg)

Navicula avenacea (Brébisson & Godey) Brébisson

Navicula sp.1

Navicula sp.2

Navicula sp.3

Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve

Family Pleurosigmataceae

Pleurosigma angulatum (Quekett) W. Smith*Pleurosigma* sp.1*Pleurosigma* sp.2

Family Plagiotropidaceae

Plagiotropis pusilla (Gregory) Kuntze

Order Thalassiophysales

Family Catenulaceae

Amphora obtusa Gregory*A. ovalis* Kützing*A. ventricosa* Gregory*Amphora* sp.1*Amphora* sp.2

Order Bacillariales

Family Bacillariaceae

Bacillaria paxillifer (O. F. Müller) Hendey*Psammodictyon panduriforme* (Gregory) Mann.*Nitzschia amphibia* Grunow*Nitzschia* sp.1*Nitzschia* sp.2*Nitzschia* sp.3*Nitzschia* sp.4

Order Surirellales

Family Surirellaceae

Plagiodiscus sp.*Surirella fastuosa* (Ehrenberg) Kützing*Surirella* sp.*Campylodiscus innominatus* Ross & Abdin*Campylodiscus* sp.

การศึกษาครั้งนี้บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอีฟิไฟติกไดอะตอม ตามลักษณะที่มองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลำแสงส่องกราด หรือกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ดังนี้

Division Bacillariophyta

Class Coscinodiscophyceae (centric diatom)

Subclass Thalassiosirophyceae

Order Thalassiosirales

Family Thalassiosiraceae

***Thalassiosira* sp.**

(ภาพที่ 2)

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝามีรูแบบ loculate โดยทั่วไปรูมีขนาดใหญ่ ยกเว้นบริเวณขอบฝา และที่ปากภูมิเยื่อแบบรูพรุน (cribra) บริเวณกลางฝามี strutted process 1 อัน รอบฐานมีรู 4 รู บริเวณรอยต่อระหว่างขอบฝาและ mantle มี strutted process 30 อัน และมี labiate process แบบ rimportula 2 อัน ทำมุม 180 องศา เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 27 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Family Stephanodiscaceae

***Cyclotella stlorum* Brightwell**

(ภาพที่ 3)

Longinova, 1988, p. 40; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 34, pl. 1

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝามีลักษณะเป็นคลื่นเห็นได้ชัดเจน รูรูปกลมเรียงเป็นกลุ่มแบบ fascicle ในแนวรัศมีออกจากศูนย์กลาง หน้าฝาด้านนอกแบ่งเป็นส่วนเว้าส่วนนูนอย่างละครึ่ง พื้นผิวบริเวณกลางฝามีลักษณะขรุขระ มี granule กระจายอยู่ทั่วบริเวณ central area และพบ fultopotula 5 อัน ที่บริเวณ central area มี marginal chamber อยู่โดยรอบฝาด้านใน เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ระหว่าง 8.7-13.6 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ไบหญาทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Subclass Coscinodiscophycidae

Order Paraliales

Family Paraliaceae

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve

(ภาพที่ 4)

ลัดดา, 2544, p. 205, pl. 34, fig. 7; Aleen and Cupp, 1935, p. 112, fig. 1; Hendey, 1964, p. 73, pl. 23, fig. 5; Loseva, 1994, p. 88-91, figs. 1-29; Hasle and Syversent, 1996, p. 141, pl. 14, figs. a-c; Bérard-Therriault, 1999, p. 29, pl. 12, fig. g

Synonym: *Melosira sulcata* (Ehrenberg) Kützinger

Cupp, 1943, p. 40, fig. 2; Hendey, 1964, p. 73, pl. 23, fig. 5

เซลล์ด้านข้างรูปกลม ขอบฝามีรอยหยัก เซลล์ต่อกันเป็นสายโซ่ตรง โดยแต่ละเซลล์เชื่อมต่อกันสนิทมาก บริเวณขอบฝามีไม่มีหนาม terminal valve มีลักษณะนูนคล้ายมงกุฎ valve face บริเวณฝาด้านในเป็นพื้นที่ว่าง บริเวณขอบฝามีช่องเปิดขนาดใหญ่ (chamber) การเรียงแถวของรูบนฝาด้านในเป็นรัศมีที่ปลายฝาด้านใน พบ 24-40 แถวใน 10 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ระหว่าง 7-50 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ไบหญาทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Coscinodiscales

Family Coscinodiscaceae

***Coscinodiscus radiatus* Ehrenberg**

(ภาพที่ 5)

ลัดดา, 2544, p. 210, pl. 37, fig. 4; Aleen and Cupp, 1935, p. 116, fig.8; Cupp, 1943, p. 56, pl. 1, fig. 4; Hendey, 1964, p. 76, pl. 22, fig. 7; Hasle and Sims, 1986, p. 310, figs. 15-32; Ricard, 1987, p. 145, figs. 1-3; Gedde, 1996, tavle 16, figs. a-i; Bérard-Therriault *et al.*, 1999, p. 30. pl. 14, figs. a-f

Synonym: *Coscinodiscus borealis* Ehrenberg

Hendey, 1964, p. 76, pl. 22, fig. 7

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กว้างมาก ผิวฝาแบน บริเวณกึ่งกลางฝามีส่วนที่เป็น hyaline area ลวดลายบนฝาเซลล์เกิดจากรูรูปหกเหลี่ยมโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่ และที่ปากภูมิเยื่อแบบรูพรุน (cribra) เรียงตัวในแนวรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง โดยมีแถวยาวเรียงสลับกับแถวสั้น พบ 3-4 รู ใน 10 ไมโครเมตร ยกเว้นบริเวณขอบฝาซึ่งมีขนาดเล็กกว่า พบ 6-8 รู ใน 10 ไมโครเมตร เซลล์มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีสารสีรูปร่างกลมกระจายอยู่ทั่วเซลล์ ไม่มีอินเตอร์คาลารีแบนด์ บริเวณขอบฝาด้านในมี labiate process 2 อัน อยู่ทำมุมกัน 135 องศา เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ระหว่าง 70–140 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบบนน้ำทะเล *Enhalus acoroides* และ *Thalassia hemprichii*

Family Hemidiscaceae***Actinocyclus* sp.1**

(ภาพที่ 6)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านวาล์วรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากรูเรียงเป็นกลุ่มแบบ fascicle ในแนวรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง พบ 7-8 รู ใน 10 ไมโครเมตร มี labiate process แบบ complex-stalked rimoportula 12 อัน เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอรอบขอบฝารูด้านในฝาเกิดเป็นแถวหนาแน่นที่บริเวณ mantle พบ 14 แถวใน 10 ไมโครเมตร ไม่พบ pseudonodulus เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 67.5 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Actinocyclus* sp.2**

(ภาพที่ 7)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว ขนาดเซลล์เล็ก เซลล์ด้านข้างรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากรูเรียงตัวเป็นกลุ่มแบบ fascicle ในแนวรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง พบ 8 รู ใน 10 ไมโครเมตร ฝาด้านในมี labiate process แบบ complex-stalked มี rimoportula 6 อัน เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอรอบขอบฝา เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 38 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Actinocyclus* sp.3**

(ภาพที่ 8)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว ฝาเซลล์โค้งนูน ด้านข้างรูปกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากรูแบบ loculate เรียงตัวในแนวรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง พบ 8-9 รู ใน 10 ไมโครเมตร โดยขนาดของรูจะเล็กลงเมื่อใกล้ขอบฝา และเกิดอย่างหนาแน่น (mantle marginal striae) พบ 17-19 แถว ใน 10 ไมโครเมตร มี labiate process แบบ simple rimoportula เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอที่บริเวณขอบฝาด้านใน เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 48 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Family Heliopeltaceae

Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg

(ภาพที่ 9)

ลัดดา, 2544, p. 210, pl. 37, fig. 4; อรรถชัญญ์, 2545, p. 45, pl. 22, figs. a-i; Allen and Cupp, 1935, p. 121-122, fig. 20; Cupp, 1943, p. 64, pl. 5, fig. 1; Hendey, 1964, p. 95, pl. 23, figs. 1-2; Ricard, 1987, p. 152, figs. 64-70; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 141, pl. 22; Nigorikawa and Hasegawa, 1999, p. 95, fig. 13

Synonym: *Actinoptychus undulatus* Kützing

Allen and Cupp, 1935, p. 121-122, fig. 20; Cupp, 1943, p. 67, pl. 5, fig. 1; Hendey, 1964, p. 95, pl. 23, figs. 1-2;

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปกลม ผิวฝาเซลล์มีลักษณะคล้ายคลื่น แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ฐานสลับกับวาล์ว ลวดลายบนฝาเกิดจากรูรูปหกเหลี่ยม และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) เรียงตัวในแนวรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง พบ 6-7 รู ใน 10 ไมโครเมตร มีเม็ด granule กระจายทั่วผิวฝาเซลล์ มี labiate process แบบ rimoportula ที่บริเวณขอบฝาเซลล์ด้านใน โดย rimoportula มีทิศทางตั้งฉากกับขอบฝา และหันไปในทิศทางเดียวกัน เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 62.5 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Actinoptychus sp.

(ภาพที่ 9)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว ขอบเซลล์หนา ผิวฝาไม่เรียบมีลักษณะคล้ายคลื่น แบ่งออกเป็น 12-14 ส่วน ลวดลายบนฝาเกิดจากรูแบบ loculate และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) โดยการเรียงกันของรูเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ เริ่มจากส่วนริมขอบบริเวณพื้นที่ว่างกลางฝา แต่ไม่ถึงขอบฝา มีเม็ด granule กระจายอยู่ทั่วผิวฝาเซลล์ บริเวณฝาด้านนอกส่วนฐานมีช่องเปิดของ rimoportula ขนาดเล็กอยู่ใกล้กับขอบฝา เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ประมาณ 48 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Asterolamprales

Family Asterolampraceae

Asterolampra marylandica Ehrenberg

(ภาพที่ 10)

ลัดดา, 2544, p. 215, pl. 39, fig. 4; Allen and Cupp, 1935, p. 122, fig. 21; Cupp, 1943, p. 68, fig. 31; Hustedt, 1959, p. 485-487, figs. 270-271; Hendey, 1964, p. 91; Gedde, 1996, tavle. 6, fig. a-f

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วเซลล์รูปร่างกลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มี mantle ฝาด้านนอกมี hyaline ray 7 อัน บริเวณปลาย ray มีช่องเปิดขนาดใหญ่ และที่ขอบด้านล่างมีช่องเปิดขนาดเล็ก ฝาด้านในมองเห็น chamber ขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งด้วยก้าน 7 ก้าน โดยแต่ละก้านจะบรรจบกันตรงจุดศูนย์กลางฝาด้าน และมี rimoportula อยู่ที่บริเวณปลายของ chamber ทุกอัน บนผิวฝาด้านระหว่าง ray มีลวดลายเกิดจากการเรียงของรูแบบ loculate พบ 15 รูใน 10 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ระหว่าง 85-94 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Subclass Biddulphiophycidae

Order Triceratiales

Family Triceratiaceae

Triceratium favus Ehrenberg

(ภาพที่ 11)

ลัดดา, 2544, p. 258, pl. 57, fig. 8; อรรถชัญญ์, 2545, p. 51, pl. 32, figs. a-h; เกสร, 2549, p. 74, pl. 41, figs. 4-7; Hendey, 1964, p. 108, pl. 25, fig. 4; Foged, 1975, p. 68, pl. 2, fig. 1; Ricard, 1987, p. 198, figs. 424-430; Sims, 1996, p. 596, pl. 290, fig. 1; Round, 1990, p. 218, fig. j

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปสามเหลี่ยม เกอเคิลแคบ ผิวฝามีลวดลายเกิดจากการเรียงกันของรูรูปหกเหลี่ยม และที่ปากภูมิเยื่อแบบรูพรุน (cribra) มุมฝาด้านนอกยกสูงขึ้น มี ocellus อยู่บริเวณมุมเซลล์ทั้งสามมุม และมีรูปกกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบรัศมีสู่ปลายฝาที่บริเวณ ocellus มี spine ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปบนฝาเซลล์ และมี rimoportula แบบ sessile ที่มุมฝาเซลล์ด้านใน

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Lampriscus sp.

(ภาพที่ 12)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์รูปทรงกระบอก ด้านเกอเคิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายฝายกสูงเล็กน้อย ด้านวาล์วรูปกลม ผิวฝามีลวดลายเกิดจากการเรียงกันเป็นแถวของรูรูปรี (elliptical areola) ที่ปากภูมิแผ่นเยื่อแบบ rota เรียงแบบรัศมีสู่ปลายฝา มี pseudocellus ยกสูงขึ้น 4 อัน pseudocellus มีลักษณะปลายตัดเรียบรูปรางกลม บน pseudocellus มีรูแบบ poroid areola ขนาดเล็กจำนวนมาก copulae มีจำนวนมาก valvocopula แบบมี septum ลวดลายด้านเกอเคิลเกิดจากรูที่มีลักษณะเหมือนด้านวาล์ว

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Order Biddulphiales

Family Biddulphiaceae

Biddulphia biddulphiana (J.E. Smith)

(ภาพที่ 12)

ลัดดา, 2544, p. 234, pl. 47, fig. 1; อรรถนีย์, 2545, p. 53, Pl. 37, figs. a-j; Hendey, 1964, p. 182, pl. 56; Ricard, 1987, p. 176, figs. 254-264

Synonym: *Biddulphia pulchella* Gray

Hendey, 1964, p. 182, pl. 56

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มุมเซลล์ยื่นออก เซลล์ด้านวาล์วรูปไข่ ยกสูงขึ้น มี pseudocellus ที่บริเวณปลายทั้งสองด้าน ที่มีลักษณะเป็นเขารูปรางกลม ลวดลายบนฝาเกิดจากรูรูปกลมขนาดใหญ่ และที่ปากภูมิเยื่อแบบรูพรุน (cribra) เรียงเป็นแถวแบบ uniseriate และบริเวณ

กึ่งกลางฝา มีก้านลาบิเอท (labiate process) 2-3 ก้าน ทำให้เมื่อมองจากด้านगेดเดิลเหมือนเป็นท่อนยาวคล้ายหนาม ผิวฝาเป็นร่องมองเห็นชัดเจน ทำให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) เห็นเซลล์แบ่งเป็น 2-6 ส่วน

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

***Isthmia enervis* Erenberg**

(ภาพที่ 13)

ลัดดา, 2544, p. 235, pl. 47, fig. 3; เกสร, 2549, p. 60, pl. 33, figs. 1-2; Hendey, 1964, p. 110, pl. 25, fig. 2

พบทั้งเป็นเซลล์เดี่ยว และเป็นโคโลนีที่เชื่อมต่อกันบริเวณหน้าฝา ด้านगेดเดิลรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลวดลายบนผิวฝาเป็นรูรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) ซึ่งรูมีขนาดไม่เท่ากันตลอดทั้งฝา ส่วนรูบน mantle เป็นรูขนาดเล็ก และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) เช่นเดียวกัน ภายนอกเซลล์ไม่เห็นช่องเปิดของ rimoportula เนื่องจาก rimoportula มีขนาดเล็ก และจับกันอยู่เป็นกลุ่มก้านภายในฝาเซลล์ด้านใน

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Subclass CymatosiropHYCidae

Order Cymatosirales

Family Cymatosiraceae

***Cymatosira lorenziana* Grunow**

(ภาพที่ 14)

อรราชนีย์, 2545, p. 53, pl. 37, figs. a-j; Jensen, 1985, p. 120; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 181, pl. 36

เซลล์ต่อกันเป็นสายโดยใช้หนามที่อยู่บริเวณขอบฝา ที่เรียกว่า marginal spine เซลล์ด้านข้างรูป rhombic ด้านगेดเดิลรูป lanceolate ปลายตัดตรง ลวดลายบนฝาเกิดจากรูที่มีเยื่อบาง ๆ ที่เป็นรูพรุนปิดปากกรู เรียกว่า cribra พบ 8-10 รู ใน 10 ไมโครเมตร เรียงแบบ quincunx บริเวณ

กึ่งกลางฝา (middle line) ใส ไม่มี central nodule มี rimoportula แบบ sessile 1 อัน ที่บริเวณฝาเซลล์ ด้านใน marginal spine แยกเป็นสองแฉก เรียก interlocking spine

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

Class Fragilariophyceae (araphid pennate diatom)

Subclass Fragilariophycidae

Order Fragilariales

Family Fragilariaceae

***Podocystis spathulata* (Schadbolt) Grunow**

(ภาพที่ 14)

Jensen, 1985, p. 125, fig. 653

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านข้างรูป spatulate ด้านเกอเดิลรูป cuneate ขั้วเซลล์ทั้งสองด้าน ไม่เหมือนกัน ปลายด้านหนึ่งกว้างขอบโค้งมน ปลายอีกด้านหนึ่งแคบกว่าปลายตัดตรง ผิวฝาแบนราบ รูปบนฝาเซลล์รูปกลมขนาดเล็ก และที่ปากภูมิเชื่อมกันแบบ vota พื้นที่ว่างตรงกลางเป็นเส้นตรง (sternum) แบ่งหน้าฝาดออกเป็นสองส่วนเห็นเป็นสันชัดเจนยาวจรดปลายฝา บริเวณขั้วของฝาด้านในมี labiate process แบบ rimoportula ด้านละ 1 อัน โดยช่องเปิดของ rimoportula ปรากฏให้เห็นไม่เด่นชัดที่บริเวณผิวฝาด้านนอก ฝาด้านในเห็น sternum เป็นสันนูนชัดเจนกว่าฝาด้านนอก เซลล์ยาว 37-100 ไมโครเมตร กว้าง 25-53 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Order Licmophorales

Family licmophoraceae

***Licmophora* sp.**

(ภาพที่ 15)

เซลล์อยู่เดี่ยว หรือเกาะกันเป็นสาย เซลล์ด้านข้างรูป clavate ด้านนอกเซลล์รูป cuneate ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็กเป็นแถวแบบ parallel striae พาดตามขวางเซลล์ พบ 21-22 แถว ใน 10 ไมครอน สเตอริอัม หรือราฟีเทียม (pseudoraphe) บนเซลล์ด้านข้างลักษณะ แคมมองเห็นชัดเจน มีคลอโรพลาสต์เม็ดเล็กรูปกลมกระจายอยู่ทั่วเซลล์ มี rimortula 1 อัน ที่บริเวณ ปลายฝาเซลล์

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Order Ardissonales**Family Ardissonaceae*****Ardissona* sp.**

(ภาพที่ 16)

เซลล์มีขนาดใหญ่และยาว พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านข้างรูป narrowly linear ปลายมน ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝาเรียบ mantle ลึก โครงสร้างของฝามีลักษณะซับซ้อน มีเยื่อเป็นช่อง (chamber) ลายบนฝาเกิดจากรูปรี่ (areolae) เรียงเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate ไม่มี rimoportula

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Order Thalassionematales**Family Thalassionemataceae*****Thalassionema nitzschioides* (Grunow) Husted**

(ภาพที่ 16)

อรรถนีย์, 2545, p. 62, pl. 53, figs. a-g; Hendey, 1964, p. 165; Jensen, 1985, p. 223, fig. 725; Moreno-Ruiz and Licea, 1994, p. 411, figs. 44-46; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 261, pl. 56, fig. 2

เซลล์ต่อกันเป็นรูปดาวหรือรูปซิกแซก พบเห็นได้ทั้งที่เป็นเซลล์เดี่ยวและเป็นโคโลนี เซลล์ด้านगेอดิรูปลี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวลว้เป็นรูปยาวรี มุมฝามีหนามขนาดเล็กหรือไม่มี มี hyaline area อยู่กึ่งกลางฝาเซลล์ เซลล์ที่อยู่ติดกันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเจดลาดินที่มีลักษณะเป็น ก้านเล็ก ๆ มีแถวของรูรูปตัว Y ที่มีลักษณะเป็นร่อง อยู่ทีบริเวณขอบฝาเซลล์ จึงทำให้เมื่อมองทางด้าน เกอดิเห็นขอบเซลล์ มีลักษณะเป็นร่องคลื่น มีเม็ดสิรูปร่างกลม (cocciform) กระจายอยู่ทั่วเซลล์ เซลล์กว้าง 4 ไมโครเมตร ยาว 4 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Rhabdonematales

Family Rhabdonemataceae

Rhabdonema sp.

(ภาพที่ 17)

เซลล์อยู่ต่อกัน เซลล์ด้านยาวลว้รูป linear หรือ lanceolate เกอดิรูปลี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน mantle ลึก มีอินเตอร์คาลาร์แบนด์จำนวนมาก และมีแผ่นกั้น (septa) ผิวฝามีรูรูปรีที่มีเยื่อถัน ที่เรียกว่า rota เรียงเป็นแถวแบบ uniseriate คลอโรพลาสต์จำนวนมาก ปลายฝามี ocelli มี rimopora ขนาดใหญ่ที่ฝาเซลล์ด้านใน อยู่ใกล้กับ sternum

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

Order Striatellales

Family Striatellaceae

Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow

(ภาพที่ 17)

ลัดดา, 2544, p. 280, pl. 62, fig. 6; อรรถชนิษฐ์, 2545, p. 64, pl. 55, figs. a-I; Hendey, 1964, p. 170; Jensen, 1985, p. 41, fig. 569

เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวรูปรี (linear-lanceolate) เมื่อมองทางด้านเกอเดิลเห็น septum ชัดเจน septum มีลักษณะหักเป็นรูปคลื่นที่บริเวณใกล้ขอบฝาแต่ไม่ถึงกึ่งกลางฝา ผิวฝาแบน มี pseudoraphe หรือ sternum แต่ไม่ชัดเจน บริเวณผิวฝามีแถวของรูขนาดเล็ก พบ 30-33 แถวใน 10 ไมโครเมตร การเรียงแถวของรูขนาดเล็กแบบ coarse puncta และมีกลุ่มของรูขนาดเล็กอยู่บริเวณปลายฝาทั้งสองด้าน มี rimoportula ที่บริเวณปลายฝาด้านใน แต่ละฝามีอินเตอร์คาลารีแบนด์ 1 วง โดยแต่ละวงถูกกั้นด้วยแผ่นกั้น (septa) 2 แผ่น คลอโรพลาสต์มีลักษณะเป็นแผ่น 4 แผ่น เซลล์กว้าง 53-109 ไมโครเมตร ยาว 7-8 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Class Bacillariophyceae (raphid pennate diatom)

Subclass Bacillariophycidae

Order Lyrellales

Family Lyrellaceae

***Lyrella lyra* (Ehrenberg) Karajeva**

(ภาพที่ 18)

อรรถนีย์, 2545, p. 67, pl. 60, figs. a-h; Hendey, 1964, p. 209, pl. 33, fig. 2; Riznyk, 1973, p. 127, pl. 12, fig. 1; Foged, 1975, p. 110, pl. 23, fig. 2; Ricard, 1977, p. 297, pl. 3, fig. 8; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 197, pl. 31, fig. 8; Ricard, 1987, p. 238, fig. 735

Synonym: *Navicula lyra* (Ehrenberg) Karajeva

Hendey, 1964, p. 209, pl. 33, fig. 2; Riznyk, 1973, p. 127, pl. 12, fig. 1; Foged, 1975, p. 110, pl. 23, fig. 2; Ricard, 1977, p. 297, Pl. 3, fig. 8; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 197, pl. 31, fig. 8; Ricard, 1987, p. 238, fig. 735

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านยาวรูป elliptic หรือ elliptic-lanceolate ลวดลายบนผิวฝากเกิดจากการเรียงกันของรูรูปกลมขนาดเล็กเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 12 แถว ใน 10 ไมโครเมตร แถวของรูถูกกั้นด้วยพื้นที่ว่างคู่ขนาน (lateral area) ที่ยาวจรดปลายฝาสีเซลล์มองเห็นเป็นรูปตัว H หรือ lyra-shape, central area แผ่ขยายกว้าง terminal raphe fissure เป็นแบบเปิด โค้ง

ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองด้าน ฝาเซลล์ด้านในมองเห็นแถวของรูที่มีลักษณะเป็นร่อง central raphe ending เป็นร่องรูป lanceolate เซลล์กว้าง 27-40 ไมโครเมตร ยาว 70-120 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Lyrella* sp.**

(ภาพที่ 19)

เซลล์ด้านข้างรูป broad lanceolate ปลายเซลล์ยื่นยาวออกมา ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝามีลวดลายเกิดจากรูรูปกลมเรียงเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 17 แถว ใน 10 ไมโครเมตร พื้นที่ว่างคู่ขนานเห็นเป็นแนวใส (hyaline lateral area) กว้างมากและยุบตัวลงรูป lyre-shaped หรือรูปตัว H แบบขอบตรงปลายค่อนข้างแหลมมีความยาวจรดปลายฝาเซลล์ แถวของรูที่อยู่ระหว่างพื้นที่ว่างคู่ขนานมีความยาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากตรงกลางไปยังปลายเซลล์ ฝาด้านในมองเห็นแถวของรูที่มีลักษณะเป็นร่องชัดเจน central raphe ending รูป lanceolate มี central area ขยายแผ่กว้าง terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ เซลล์กว้าง 28 ไมโครเมตร ยาว 50 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

***Petroneis granulate* (Bailey) Mann. Comb. Nov.**

(ภาพที่ 20)

อรรถนีย์, 2545, p. 68, pl. 63, figs. a-g; Foged, 1975, p. 108, pl. 22, figs. 2-5; Ricard, 1987, p. 238, fig. 726

Synonym: *Navicula granulate* Bailey

Round *et al.*, 1990, p. 675

เซลล์ด้านข้างรูป lanceolate ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝามีแถวของรูรูปกลมขนาดเล็ก และที่ปากรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) การเรียงของแถวเป็นแบบ uniseriate เป็นรัศมีสู่ปลายฝา พบ 10 แถว ใน 10 ไมโครเมตร raphe system แบบตรง central raphe ending เป็นร่องรูป T-shaped บริเวณ central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านรูปร่างกลม terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอหันไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งสองด้าน axil area แผ่ขยายออกกว้าง เซลล์กว้างเซลล์ 38 ไมโครเมตร ยาว 9 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

Order Mastogloiales

Family Mastogloiaceae

Mastogloia fimbriata (Brightwell) Cleve

(ภาพที่ 21)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 71, pl. 69, figs. a-g; Foged, 1975, p. 92, pl. 14, figs. 1-2; Jensen, 1985, p. 401, fig. 884; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 186, pl. 26, figs. 2-3; Ricard, 1987, p. 244, figs. 775-779; John, 1990, p. 195, fig. 36

Synonym: *Cocconeis fimbriata* Brightwell

Mastogloia cribrata Grunow

Orthoneis fimbriata Grunow

Orthoneis clevei Grunow

Jensen, 1985, p. 401, fig. 884

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านยาวรูป broadly elliptical ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาเซลล์แบนราบ ลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูรูปกลม และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) การเรียงกันของรูเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ central area ขยายออกเห็นเป็นรูปรี raphe เป็นเส้นตรง และเห็นเป็นสันนูนชัดเจนที่บริเวณด้านใน partectal ring กว้างมากเกิดโดยรอบฝาเซลล์ มีจำนวน 4-6 คู่ ขนาดเท่า ๆ กัน กว้าง 4 ไมโครเมตร chamber หรือ partecta มีรูปร่างขนาดใหญ่ และมีรูกลม 1 รู เกิดขึ้นที่บริเวณปลายทั้งสองด้านของ partectal ring ที่บริเวณขอบฝาเซลล์มีรูกลมขนาดเล็กกว่าจำนวนมาก มีการเรียงตัวแบบ biseriate จึงทำให้เห็นบริเวณขอบเซลล์มีสีเข้มกว่า เซลล์กว้าง 17-45 ไมโครเมตร ยาว 20-70 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia punctifera* Brun**

(ภาพที่ 22)

อรรถนีย์, 2545, p. 72, pl. 73, figs. a-j; Jensen, 1985, p. 419, fig. 914; John, 1990, p. 198, pl. 4, figs. 68, 99

Synonym: *Mastogloia (cuspidate* Cl. Var.) *punctifer* Brun

Jensen, 1985, p. 419, fig. 914

เซลล์ด้านวาล์วรูป elliptical-lanceolate ปลายทั้งสองด้านยื่นยาวมากแบบ rostrate ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝาแบน ฐานฝาไม่มีรูปร่างและขนาดไม่สม่ำเสมอเรียงเป็นแถว พบ 17 แถวใน 10 ไมครอน ใกล้กับบริเวณ axial area รูมีลักษณะเป็นร่องยาว ราฟมีลักษณะเป็นเส้นคลื่น partectal ring ยาวจรดปลายฝาเซลล์ central raphe ending โค้งไปในทิศทางเดียวกัน partectatum chamber กว้างมากขนาด 2-2.5 ไมโครเมตร เซลล์กว้าง 7-13 ไมโครเมตร ยาว 20-38 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia quinquecostata* Grunow**

(ภาพที่ 23)

อรรถนีย์, 2545, p. 74, pl. 74, figs. a-i; Foged, 1975, p. 94, pl. 15, figs. 7-8; Ricad, 1987, p. 244, figs. 780-782; pl. 6, fig. 3; Jensen, 1985, p. 472, fig. 989

Synonym: *Mastogloia elongate* Leudiger-Fortmorel

Mastogloia concinna A. Schmidt

Jensen, 1985, p. 472, fig. 989

เซลล์ด้านวาล์วรูป elliptical-broad หรือ rhombic-lanceolate ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ราฟมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย lateral area ขยายกว้างออกเป็นแผ่นแบนปลายแหลม ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์ แบบ uniseriate เป็นรัศมีสู่ปลายฝาเซลล์ พบ 23 แถว ใน 10 ไมครอน ส่วนรูใกล้กับราฟเป็นรูปรียาว พบ 26 รู ใน 10 ไมโครเมตร มี rib เป็นแถวตลอดขอบเซลล์ partectal ring แคบมีขนาดใกล้เคียงกันยาวไม่ถึงปลายฝาเซลล์ เซลล์กว้าง 14-36 ไมโครเมตร ยาว 30-115 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia recta* Hustedt**

(ภาพที่ 24)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 74, pl. 75, figs. a-i; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 68, pl. 25, figs. 6-7

เซลล์ด้านข้างรูป linear-lanceolate ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูรูปกลมขนาดเล็กพาดตามขวางเซลล์ แบบ uniseriate พบ 16 แถว ใน 10 ไมครอน central area ขยายออกเป็นรูปรียาว partectal ring ยาวเกือบจรดปลายเซลล์ ผิวฝาเซลล์แบน ราฟีเห็นเป็นคลื่นเล็กน้อย ช่อง partecta รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่า ๆ กัน มองเห็น central nodule ชัดเจนที่บริเวณฝาเซลล์ด้านใน เซลล์กว้าง 20 ไมครอน ยาว 70 ไมครอน

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

***Mastogloia rhombica* Cleve**

(ภาพที่ 25)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 74, pl. 76, figs. a-i; Ricard, 1978, p. 287. pl. 1, fig. 18, Jensen, 1985, p. 423, fig. 920

เซลล์ด้านข้างรูป rhombic-lanceolate ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝาเซลล์เรียบ บริเวณกลางฝาเซลล์เว้าเข้าเล็กน้อย ราฟีมีลักษณะเป็นคลื่นชัดเจน ขยายออกเป็นแผ่นพับสลับซ้ายขวา ทำให้มองดูคล้ายกับ raphe บิดเป็นเกลียว terminal raphe fissure รูปตรงแบบเปิด axial area แคบมาก central area แคบแต่ยาว ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็ก และที่ปากรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) เป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 17 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ซึ่งเกิดต่อเนื่องกันจนถึงขอบฝาเซลล์ partectal ring แคบ เกิดต่อเนื่องเกือบถึงปลายเซลล์ partectum รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบตรงขนาดเท่า ๆ กัน กว้าง 2 ไมโครเมตร partectal duct แคบยาว เซลล์กว้าง 18-22 ไมโครเมตร ยาว 40-60 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia cf. crucicula* (Grunow) Cleve**

(ภาพที่ 26)

Jensen. N. G. 1985, p. 48, fig. 894; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 68, pl. 25, fig. 5

เซลล์ด้านวาล์วรูป elongated-elliptical ผิวฝาเรียบ ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็ก (areolae-punctate) พาดตามขวางเซลล์ พบ 18-20 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง central area เป็นแนวยาวพาดขวางเซลล์จากขอบเซลล์ด้านหนึ่งไปจนถึงขอบเซลล์อีกด้านหนึ่ง partectal ring แคบ ความกว้างประมาณ 1 ไมโครเมตร ไม่พบฝาด้านนอก เซลล์กว้าง 8-12 ไมโครเมตร ยาว 14-22 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia* sp.1**

(ภาพที่ 27)

เซลล์ด้านวาล์วรูป elliptic ปลายยื่นยาวออก ด้านगेดเคิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็กรูปยาวรีเป็นแถวที่มีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย พาดตามแนวยาวเซลล์ การเรียงกันของแถวของรูเกิดไม่สม่ำเสมอ central raphe ending แผ่ขยายออก และมีลักษณะเป็นคลื่นในทิศทางเดียวกัน partectal ring ยาวเกือบถึงปลายฝาเซลล์ เซลล์กว้าง 12 ไมโครเมตร ยาว 34 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Mastogloia* sp.2**

(ภาพที่ 28)

เซลล์ด้านวาล์วรูป broadly lanceolate ปลายแหลม ด้านगेดเคิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็กพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 14 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending ตรง central area ขยายออกกว้างค่อนข้างกลม partectal ring กว้าง เกิดยาวต่อเนื่องกันจรดปลายฝาเซลล์ chamber หรือ partecta รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดเท่า ๆ กัน กว้าง 1.8 ไมโครเมตร เซลล์กว้าง 54 ไมโครเมตร ยาว 37 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

***Mastogloia* sp.3**

(ภาพที่ 29)

เซลล์ด้านยาวรูป lanceolate ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending แบบตรง terminal raphe fissure ตรงแบบ simple, central area ฐานเล็กน้อย ขยายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมต่อกับ lateral area, partectal ring ขาวเกือบจรดปลายเซลล์ partectatum มีขนาดไม่เท่ากัน โดยมี partectum รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ 2 อัน ที่ขอบเซลล์ทั้ง 2 ด้าน ฝาด้านในมี rib เรียงเป็นแถวพาดตามขวางสลับกับแถวของรู เซลล์กว้าง 14 ไมโครเมตร ยาว 29 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

Order Cymbellales

Family Gomphonemataceae

***Gomphonema* sp.**

(ภาพที่ 29)

พบเป็นเซลล์เดี่ยว เซลล์ด้านยาวรูป hastate ปลายเซลล์ทั้งสองด้านมีขนาดไม่เท่ากัน ราฟีเป็นเส้นตรง central area กว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจรดขอบเซลล์ทั้งสองด้าน ฐานเป็นแบบ elongate poroids มีรูปร่างและขนาดไม่สม่ำเสมอ central raphe ending มีลักษณะตรงแบบ simple ไม่มี terminal raphe fissures ความยาวเซลล์ 16 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Achnanthales

Family Achnanthaceae

Achnanthes sp.

(ภาพที่ 30)

เซลล์อยู่เดี่ยว หรือเกาะกันเป็นสายสั้น ๆ เซลล์ด้านวาล์วรูป linear-lanceolate ตรงกลางเว้า เข้ารูป flexed cuneate ลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย ขอบเซลล์มน ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของ รูขนาดเล็กเห็นเป็นเส้นหนาพาดตามขวางเซลล์ ลักษณะของฝา 2 ฝาไม่เหมือนกัน (heterovalvar) ฝาบน (epitheca) ฐานมีราฟเทียม (pseudoraphe) เรียกว่า p-raphe ส่วนฝาล่าง (hypotheca) มีราฟจริง เรียกว่า r-raphe ราฟจริงที่เกิดขึ้นบริเวณฝาล่างมีลักษณะโค้งเล็กน้อย บริเวณกึ่งกลางราฟมีพื้นที่ใส จรดขอบเซลล์ทั้งสองด้าน เรียกว่า stauros เซลล์กว้าง 17 ไมโครเมตร ยาว 65 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Family Cocconeidaceae

Cocconeis pellucida (Hantzsch) Grunow

(ภาพที่ 30)

Ricard, 1977, pl. 10, fig. 9; Jensen, 1985, p. 315-316, fig. 812; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 45, pl. 14, fig. 1

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูปไข่ ฝาบนมีราฟเทียมเห็นชัดเจนที่บริเวณกลางเซลล์ ฝาล่างมีราฟแท้ polar nodule มีลักษณะฐาน central nodule ฐานเห็นชัด ราฟรูปร่าง sigmoid ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูแบบ puncta เป็นแถวพาดตามขวางเซลล์ พบ 16 แถว ใน 10 ไมครอน เซลล์กว้าง 20-70 ไมโครเมตร ยาว 30-100 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Cocconeis scutellum* Ehrenberg**

(ภาพที่ 31)

ลัดดา, 2544, p. 291, pl. 64, fig. 10; Patrick and Reimer, 1966, p. 238, no. fig; Chin *et al.*, 1985, p. 170, pl. 51, figs. 558-559; Nagumo and Kobayasi, 1990, p. 50, pl. 2, figs. 5-6; Kubota, 1999, p. 157, fig. 4

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วมองเห็นเป็นรูปไข่ ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แคบลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์ เป็นรัศมีสู่ปลายฝา แถวแบบ uniseriate พบ 6-7 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ฝาบ่น (epithea) และฝาล่าง (hypotheca) มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ฝาบ่นมีราฟีเทียม (sternum) เป็นแนวใส ๆ ส่วนฝาล่างมีราฟีแท้ มีเมดลัส 1 อันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ฝาเซลล์ด้านที่มีราฟีแท้ ราฟีจะมีความโค้งนูนมากกว่าฝาเซลล์ที่มีราฟีเทียม โดยบริเวณราฟีแท้ และราฟีเทียม ของทั้งสองฝา จะมีความสัมพันธ์กันทั้งในเรื่องของความกว้าง แนว และทิศทาง ที่บริเวณขอบเซลล์มีรู (punctae) ซึ่งอยู่ชิดกันมากกว่าบริเวณอื่น จึงทำให้เห็นขอบเซลล์มีสีเข้ม เซลล์กว้าง 17-20 ไมโครเมตร ยาว 20-30 ไมโครเมตร

สถานภาพ: โบหญาทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Naviculales**Suborder Sellaphorineae****Family Pinnulariaceae*****Pinnularia* sp.**

(ภาพที่ 32)

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูป linear หรือ lanceolate ปลายมน ผิวฝามีแถวของรูกลมขนาดเล็กแบบ poroid areolae เรียงเป็นแถวแบบ multiseriata พบ 7-8 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นแบบเส้นตรง central raphe ending ขยายออกกว้างบนออกเล็กน้อย terminal raphe fissure บนออกเล็กน้อยหันไปในทิศทางตรงข้ามกัน axial area ขยายกว้างและแคบลงที่บริเวณปลายเซลล์ พบเฉพาะฝาด้านนอก เซลล์กว้าง 12 ไมโครเมตร ยาว 42 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Caloneis alpestris* (Grunow) Cleve**

(ภาพที่ 33)

Jensen, 1985, p. 777, fig. 372

เซลล์ด้านข้างรูป linear-elliptical ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝาเกิดจากรูปลอกมขนาดเล็กเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบรัศมีคู่ปลายฝา พบ 15-16 แถว ใน 10 ไมโครเมตร raphe เป็นเส้นตรง axial area แคบยาว central area แผ่ขยายกว้างเป็นรูป narrow-lanceolate กลางฝาเซลล์มี marking เป็นร่องลึกรูปพระจันทร์ (crescent) จำนวน 1 คู่ ขอบเซลล์หนา ฝาเซลล์ด้านในบริเวณ polar ending พบ helitogossa จำนวน 1 อัน central nodule ไม่ปรากฏเห็นชัด central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในเป็นแบบ simple

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Caloneis liber* (W. Smith) Cleve**

(ภาพที่ 34)

Podzorski and Håkansson, 1987, p. 170, pl. 18, fig. 1

เซลล์ด้านข้างรูป narrowly linear ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูปลอกมขนาดเล็กพาดขวางเซลล์เป็นแถว แบบ multiserial พบ 18 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending ขยายกว้างโค้งเล็กน้อยไปในทิศทางเดียวกัน terminal raphe fissure ขยายออกกว้าง มี hyline area แผ่ขยาย กลางฝามี marking เป็นร่องลึกรูป lunate ลักษณะโค้งเล็กน้อยเข้าหากัน จำนวน 1 คู่ central area รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า polar ending ที่ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa ข้างละ 2 อัน central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในนูนขึ้นเห็นชัดเจน เซลล์กว้าง 10-15 ไมโครเมตร ยาว 80-115 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

***Caloneis samoensis* (Grunow) Cleve**

(ภาพที่ 35)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 79, pl. 82, figs. a-h; Foged, 1975, p. 102, pl. 19, figs. 1-2

เซลล์ด้านข้างรูป lanceolate ปลายแบบ sub-cuneate เกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบเซลล์หน้า ปลายบนฝาเกิดจากกรุลมขนาดเล็ก เรียงเป็นแถวแบบ triseriate พาดตามขวางเซลล์ แบบรัศมีสู่ปลายฝา พบ 11 แถว ใน 10 ไมครอน axial area รูป lanceolate, central raphe ending เป็นแบบ simple กลางฝาเซลล์ มี marking เป็นร่องลึกรูป lunate จำนวน 1 คู่ ที่บริเวณ polar ending มี hyaline area แผ่ขยายกว้าง และพบรูเปิดรูปรีขนาดใหญ่ที่บริเวณขั้วเซลล์ เซลล์กว้าง 18 ไมโครเมตร ยาว 65 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Suborder Diploneidinea**Family Diploneidaceae*****Diploneis crabro* (Ehrenberg) Ehrenberg**

(ภาพที่ 36)

Hendey, 1964, p. 225, pl. 32, figs. 1, 3; Foged, 1975, p. 100, pl. 18, fig. 6; Ricard, 1977, p. 313, pl. 13, figs. 7-13; Jensen, 1985, p. 519, fig. 1028; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 58-59, pl. 20, fig. 1; Ricard, 1987, p. 240, figs. 744-751

Synonym: *Pinnularia crabro* Ehrenberg

Navicula crabro Kützing

Jensen, 1985, p. 519, fig. 1028

เซลล์ด้านข้างรูป panduliform ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลางฝายุบลง ผิวฝาเซลล์ มีลักษณะเป็นคลื่น ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูขนาดเล็ก และที่ปากกรูมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) การเรียงของแถวเป็นแบบ biseriate พาดตามขวางเซลล์เป็นรัศมีสู่ปลายฝา ถูกกั้นด้วยช่อง longitudinal canal ที่เกิดขึ้นขนานกับแนวราฟ ด้านละ 1 แถว จึงทำให้แถวของรูเกิดขึ้นแบบไม่ต่อเนื่องกัน พบ 6-8 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟเป็นเส้นตรง central raphe ending โค้งงอเป็นรูป ตะขอ (strongly hooked) หันไปในทิศทางเดียวกัน terminal raphe fissure เบนออกไปทิศทางเดียวกัน central area กว้าง longitudinal canal เป็นแบบเปิดสู่ด้านในฝามีรูปร่างกลม ด้านในฝามี

ช่องรูปรี (elongate aperture) เกิดขึ้นต่อเนื่องกันที่บริเวณขอบฝา มองเห็นราฟี่ที่ฝาด้านในมีลักษณะเป็นร่องที่มีลักษณะเป็นคู่ เซลล์กว้าง 18 ไมโครเมตร ยาว 70 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Diploneis fusca* var. *pervasta* (Gregory) Cleve**

(ภาพที่ 37)

Jensen, 1985, p. 553, fig. 1056

Synonym: *Navicula aestiva* Donkin

Diploneis aestiva Cleve

Jensen, 1985, p. 519, fig. 1028

เซลล์ด้านยาวรูป rhombic-elliptical ปลายมน ขอบเซลล์หนามาก ราฟี่เป็นแบบตรง ผิวฝาด้านนอกมีรูกลม และที่ปากมีเยื่อแบบรูพรุน (cribra) พาดตามขวางเซลล์แบบ biseriate รูเปิดด้านในเป็นช่องรูปรียาว (elongate aperture) พาดตามขวางเซลล์ พบ 10 รู ใน 10 ไมโครเมตร longitudinal canal ไม่มีช่องเปิดที่ฝาด้านใน terminal raphe fissure เป็นแบบตรง central nodule กว้างมากเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยม เซลล์กว้าง 12 ไมโครเมตร ยาว 20.5 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Diploneis oblongella* (Naeg. ex Kütz.) Ross**

(ภาพที่ 38)

ลัดดา, 2544, p. 321. pl. 70, fig. 22.; Patrick and Reimer, 1966, p. 413, pl. 38. fig. 8; Jensen, 1985, p. 563, fig. 1065; Krammer and Lange-Bertalot, 1986, p. 286. fig. 188: 14-15; Sakabe and Nagumo, 1997, p. 115, pl. 3, fig. 20

Synonym: *Navicula oblongella* Naeg. ex Kütz.

Pinnularia ovalis (Hilse) Cleve

Navicula ovalis A. Schmidt

Navicula elliptica A. Schmidt

Navicula carvathorum Pantocsek

Patrick and Reimer, 1966, p. 413, pl. 38. fig. 8; Jensen, 1985, p.563, fig. 1065; Krammer and Lange-Bertalot, 1986, p. 286. fig. 188: 14-15

เซลล์ด้านวาล์วรูป elliptical ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ราฟิเป็นเส้นตรง central area กว้าง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของความกว้างฝาเซลล์ longitudinal canals แคบ ผิวฝามีแถวของรูพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate เรียงแบบรัศมีสู่ปลายฝา พบ 10 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ผิวฝาด้านในมีช่องเปิดรูปรียาว (elongate aperture) ไม่พบช่องเปิดของ longitudinal canals ที่บริเวณฝาด้านใน central nodule กว้างมาก เซลล์กว้าง 19-34 ไมโครเมตร ยาว 40-62 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญาทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Diploneis splendida* (Gregory) Cleve**

(ภาพที่ 39)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 83, pl. 90, figs. a-f; Hendey, 1964, p. 227, no. fig.; Jensen, 1985, p. 595, fig. 1089

Synonym: *Navicula splendida* Gregory

Navicula entomon Donkin

Navicula gemmatula Cleve

Jensen, 1985, p. 595, fig. 1089

เซลล์ด้านวาล์วรูป panduliform ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางเว้าเข้า ราฟิเป็นเส้นตรง terminal raphe fissure เบนเล็กน้อยไปในทิศทางเดียวกัน central raphe ending ขยายออกเล็กน้อยมีลักษณะเป็นร่อง central area ขยายออกกว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝามี rib เห็นได้ชัดเจน พบ 12 rib ใน 10 ไมโครเมตร ลึกลงไปพบเส้นพาดตามยาวเซลล์ที่มีความยาวจรดปลายทั้งสองด้านของเซลล์ longitudinal canal รูปร่างกลมขนาดเล็กขนานกับแนวราฟิ longitudinal canal เป็นแบบไม่มีช่องเปิดออกสู่ฝาด้านใน บริเวณฝาด้านในมีช่องเปิดรูปรียาวเรียงเป็นแถวตามขวาง เซลล์กว้าง 6 ไมโครเมตร ยาว 88 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญาทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

***Diploneis suborbicularis* (Gregory) Cleve**

(ภาพที่ 40)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 83, pl. 91, figs. a-h; Hendey, 1964, p. 224, no. fig.

เซลล์ด้านวาตัวรูป broad elliptical ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวฝาโค้งมนขยุบลงบริเวณกลางฝาเซลล์ รูปร่างกลมขนาดเล็กที่มีเยื่อบาง ๆ ที่เป็นรูพรุนปิดปากกรู เรียกว่า cribra เรียงเป็นแถวแบบรัศมีสู่ปลายฝา พบ 9-10 แถว ใน 10 ไมครอน ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending ขยายออกเป็นรูปกลม terminal raphe fissure เบนออกหันไปในทิศทางเดียวกัน central area ขยายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า longitudinal canal เป็นรูปกลมขนาดเล็ก เรียงเป็นแถวขนานกับราฟี ไม่เปิดออกสู่ผิวฝาด้านใน ผิวฝาด้านในมีรูรูปรีขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวตามขวาง terminal raphe ที่ด้านในฝาเซลล์ตรงแบบ simple เซลล์กว้าง 25 ไมโครเมตร ยาว 47 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Diploneis weissflogi* (A. Schmidt) Cleve**

(ภาพที่ 41)

Ricard, 1977, pl. 13, figs. 1-6; Jensen 1985, p. 588, fig. 1085; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 176, pl. 21, figs. 6-7

เซลล์ด้านวาตัวรูป panduriform ปลายมน ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า mantle หนา ผิวฝาโค้งมนเล็กน้อย ขยุบลงที่ตรงกลางฝา ลายบนผิวฝาเกิดจากกรูแบบมีเยื่อที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียงเป็นแถวแบบ uniseriate เป็นรัศมีที่ปลายฝา พบ 10 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง terminal raphe fissure เบนออกเล็กน้อยหันไปในทิศทางเดียวกัน central nodule ขนาดเล็ก central area แถบมีช่องรูปรียาวขยายออก และบริเวณใกล้เคียงกันใกล้เคียง ตรงส่วนปลายที่ติดกับ mantle เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม 2 ช่อง longitudinal canal รูปร่างกลมเรียงเป็นแถวขนานกับราฟี ผิวฝามี rib เรียงสลับกับแถวของรู เซลล์กว้าง 11-35 ไมโครเมตร ยาว 27-100 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Suborder Naviculineae

Family Naviculaceae

Frustulia rhomboides (Ehrenberg)

(ภาพที่ 42)

ลัดดา, 2544, p. 315, pl. 69, figs. 5-6; Jensen, 1985, p. 609, figs. 1098-1099; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 62, pl. 22, figs. 1-2

Synonym: *Navicula rhomboides* Ehrenberg

Vanheurckia rhomboides Brébisson

Jensen, 1985, p. 609, figs. 1098-1099

เซลล์ด้านข้างรูป elliptical หรือ rhombic-lanceolate ด้านนอกเคลือบสีเหลืองปนฟ้า ลวดลายบนผิวฝาดเกิดจากขนาดเล็กเป็นเส้นพาดตามขวางเซลล์มีทิศทางตั้งฉากกับแนวราฟ มีคลอโรพลาสต์ 2 แผ่นอยู่ที่ขอบเซลล์ ราฟเป็นเส้นตรงแบบ simple ที่บริเวณฝาด้านในเห็นแนวราฟเป็นร่องลึก central nodule ปรากฏชัดเจนที่บริเวณฝาด้านใน เซลล์กว้าง 15-30 ไมโครเมตร ยาว 70-160 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Navicula avenacea (Brébisson & Godey) Brébisson

(ภาพที่ 43)

อรรชนี, 2545, p. 84, pl. 93, figs. a-f, Hendey, 1964, p. 200, no. fig.; Sims, 1996, p. 280, pl. 132, fig. 5

เซลล์ด้านข้างรูป linear lanceolate ปลายแบบ cuneate ลายบนผิวฝาดเกิดจากการเรียงกันของรูปรูปร่างเรียงเป็นแถว แบบ uniseriate เป็นรัศมีสู่ปลายฝาด พบ 10-11 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟเป็นแบบเส้นตรง terminal raphe fissure เบนเล็กน้อยหันไปในทิศทางเดียวกัน central area ขยายออกเป็นรูปรี axial area แคบ terminal nodule ขยายออก ฝาด้านในมี hillogossa, central nodule ที่ฝาด้านในรูปรูปร่างเห็นชัดเจน เซลล์กว้าง 7.7-10 ไมโครเมตร ยาว 46-50 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Navicula sp.1

(ภาพที่ 44)

เซลล์ด้านข้างรูป narrowly lanceolate ปลายมน ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝา เกิดจากการเรียงกันของรูรูปรีเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์ แบบ uniseriate พบ 11 แถว ใน 5 ไมโครเมตร ราฟีเป็นแบบเส้นตรง central raphe ending ขยายออกเป็นรูปรี terminal raphe fissure รูปตะขอกันไปในทิศทางเดียวกัน central area ขยายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เซลล์กว้าง 2 ไมโครเมตร ยาว 10 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Navicula sp.2

(ภาพที่ 45)

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านข้างรูป narrowly-lanceolate ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณกลาง ฝายุบลงเล็กน้อย ลายบนฝาเซลล์เกิดจากรูรูปรียาวพาดตามขวางเซลล์ เรียงแบบ uniseriate เป็นรัศมี สู่ปลายฝาเซลล์ พบ 17 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นแบบตรง central raphe ending รูปตะขอ เห็นชัดเจน terminal raphe fissure รูปตะขอกันไปในทิศทางเดียวกัน axial area แคบ เซลล์กว้าง 3.5 ไมโครเมตร ยาว 18 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Navicula sp.3

(ภาพที่ 45)

เซลล์ด้านข้างรูป elliptic ขอบเซลล์หนา ที่ผิวฝามีแถวของรูพาดขวางเซลล์ แบบรัศมี สู่ปลายฝา พบ 16 แถวใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นแบบเส้นตรง central raphe ending ขยายออกเป็น รูปรี เบนออกเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ เบนออกไปใน

ทิศทางเดียวกัน central area ขยายออกกว้างเป็นรูปรี พบช่องเปิดรูปรางกลม 1 ช่อง ที่บริเวณ central area เซลล์กว้าง 8.5 ไมโครเมตร ยาว 28.5 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*

***Trachyneis aspera* (Ehrenberg) Cleve**

(ภาพที่ 46)

Hendey, 1964, p. 236, pl. 39, fig. 13; Chin *et al.*, 1985, p. 116, pl. 35, figs. 334-340; Jensen, 1985, p. 744, fig. T-1, T-2

Synonym: *Navicula aspera* Ehrenberg

Stauroneis pulchella Brébisson

Trachyneis aspera var. *pulchella* (Wm. Smith) Cleve

Hendey, 1964, p. 236, Pl. 39, fig. 13

เซลล์ด้านยาวรูป linear-lanceolate ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมฝามน ที่ผิวฝามีแถวของรูรูปรียาวพาดขวางเซลล์ พบ 15 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending ตรงแบบ simple, terminal raphe fissure รูปตะขอหันไปในทิศทางเดียวกัน central area ขยายกว้างมากเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่บริเวณกลางฝามีลักษณะเป็นรูปโบว์ (bow-tie shaped) central nodule นูนหนาเห็นชัดเจน ฝาด้านในมีรูรูปกลมที่เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอ จากช่องเปิดของ poroid areola ที่บริเวณผิวฝาด้านนอก มีรูรูปกลมที่บริเวณหัวเซลล์ทั้งสองด้าน เซลล์กว้าง 17 ไมโครเมตร ยาว 71 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Family Pleurosigmataceae

Pleurosigma angulatum (Quekett) W. Smith

(ภาพที่ 47)

ลัดดา, 2544, p. 310, pl. 61, fig. 17; Hendey, 1964, p. 242, pl. 35, figs. 1-2; Navarro, 1982, p. 336. figs. 89-92

เซลล์ด้านวาล์วรูป sigmoid ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายบนฝาเกิดจากรูปร่างขนาดเล็ก เรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์ ทำมุมกับแนวราฟิประมาณ 45 องศา พบ 11 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟิรูปร่างแบบ sigmoid มีทิศในแนวเดียวกับฝาเซลล์ central raphe ending รูปรีเบนออกเล็กน้อยไปในทิศทางเดียวกัน terminal raphe fissure รูปตะขอชัดเจน (strong hooked), central area ค่อนข้างกลม apical area ขยายออก central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในเห็นเป็นรูปรีชัดเจน เซลล์กว้าง 40 ไมโครเมตร ยาว 200 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Pleurosigma sp.1

(ภาพที่ 48)

เซลล์ด้านวาล์วรูป sigmoid ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝาเกิดจากรูปร่างยาวเรียงเป็นแถวทำมุมกับแนวราฟิประมาณ 45 องศา พบ 9 แถวใน 10 ไมโครเมตร ราฟิรูปร่าง sigmoid มีทิศทางเดียวกับฝาเซลล์ central raphe ending ตรงแบบ simple, terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ หันไปในทิศทางตรงข้ามกัน central area แคบ ไม่พบฝาด้านในเซลล์ เซลล์กว้าง 18 ไมโครเมตร ยาว 66 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Pleurosigma* sp.2**

(ภาพที่ 49)

เซลล์ด้านวาล์วรูป sigmoid lanceolate ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝาเกิดจากรูปรีขียวเรียงทำมุมกับแนวราฟิประมาณ 45 องศา ราฟิรูปร่างแบบ sigmoid และเป็นคลื่นเล็กน้อย ที่บริเวณใกล้กับ central raphe ending, terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ (strong hooked) หันไปในทิศทางตรงข้ามกัน central area แคบ เซลล์กว้าง 32 ไมโครเมตร ยาว 129 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Family Plagiotropidaceae***Plagiotropis pusilla* (Gregory) Kuntze**

(ภาพที่ 50)

ลัดดา, 2544, p. 323, pl. 71, figs. 2-3; อรรถนีย์, 2545, p. 88, pl. 100, figs. a-l; Hendey, 1964, p. 256, pl. 27, figs. 1-2; Foged, 1975, p. 112, pl. 25, figs. 5-9; Sims, 1996, p. 504, pl. 244, no. fig.

เซลล์ด้านวาล์วรูป lanceolate ปลายแหลม ลวดลายบนฝาเซลล์เกิดจากแถวของรูขนาดเล็ก ที่มีเยื่อเกี่ยวพันแบบ hymens เรียงตัวแบบ uniseriate พบ 23-24 แถว ใน 10 ไมครอน raphe อยู่บน keel ที่มีลักษณะคล้าย wing เป็นแบบ eccentric keel, central raphe ending มีรอยหยักเล็กน้อย หันไปในทิศทางเดียวกัน ตรงปลายสุดขยายออกเป็นรูปกลม terminal raphe fissure ขยายออกกว้างเป็นรูปหยดน้ำ central area ก่อนข้างกลม ฝาเซลล์ด้านในมีแถวของรูรูปร่างกลมขนาดเล็ก มี ridge 2 อัน อยู่บริเวณกลาง central nodule พบ helictoglossa รูป funnel-like ขนาดใหญ่ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้ง 2 ด้าน เซลล์กว้าง 16 ไมโครเมตร ยาว 94 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Order Thalassiophysales

Family Catenulaceae

Amphora obtuse Gregory

(ภาพที่ 51)

อรรถนีย์, 2545, p. 90, pl. 104, figs. a-k; Hendey, 1964, p. 268, no. fig.; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 164, pl. 15, figs. 1-3; Ricard, 1987, p. 258, figs. 910-914

เซลล์ด้านข้างรูป linear-semilanceolate ด้านเหนือรูป broadly linear มี girdle band จำนวนมาก ราฟรูปโค้งเห็นเป็นสันชัดเจน ฝาเซลล์ด้านในมีแถวของรูรูปกลมขนาดเล็กเรียงเป็น แถวแบบแตกแขนง raphe sternum แคบ central area ที่ฝาเซลล์ด้านในแผ่ขยายออกเป็นสันปกคลุม จึงทำให้มองไม่เห็น central raphe ending

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

Amphora ovalis Kützinger

(ภาพที่ 52)

Chin *et al.*, 1985, p. 146, pl. 44, fig. 446; Jensen, 1985, p. 794, fig. 628; Krammer and Lange-Bertalot, 1986, p. 344, fig. 149; Sakabe and Nagumo, 1997, p. 115, pl. 5, fig. 38

เซลล์รูป broad-elliptical ปลายเซลล์แบบ truncate ผิวฝามีลวดลายของรูขนาดเล็กเรียงเป็น เส้นพาดขวางเซลล์ พบ 25 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟเป็นเส้นโค้งเล็กน้อย ด้าน dorsal โค้งนูน ด้าน ventral เว้าเข้า central area มองเห็นได้จากด้าน ventral, axial area แคบยาว central nodule เห็นชัดเจน เซลล์กว้าง 17.5 ไมโครเมตร ยาว 27.5 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Amphora ventricosa* Gregory**

(ภาพที่ 53)

อรรถนีย์, 2545, p. 91, pl. 107, figs. a-g; Hendey, 1964, p. 269, pl. 38, fig. 12; Peragallo, 1965, p. 50, figs. 37-39

เซลล์ด้านวาล์วรูปพระจันทร์เสี้ยวค่อนข้างยาวปลายแหลม (crescentic) ขอบเซลล์หนา ผิวฝาด้านนอก มีรูรูปรีแคบขนาดเล็กจำนวนมาก เรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์เป็นรัศมีสู่ปลายฝาด การเรียงของเป็นแบบ uniseriate พบ 17 แถว ใน 10 ไมโครเมตร และมองเห็นแถวของรูมีลักษณะเป็นร่องที่ผิวฝาด้านใน ราฟีเป็นเส้นตรง central raphe ending ด้านในฝาด้านตรงแบบ simple, axial area แคบ raphe อยู่ก่อนไปทางด้าน ventral, polar ending มี helitogossa เซลล์กว้าง 5-18 ไมโครเมตร ยาว 38-110 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

***Amphora* sp.1**

(ภาพที่ 54)

เซลล์รูป elliptical ปลายตัดตรง ด้านวาล์วรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentic) ปลายมน ราฟีอยู่ก่อนไปทางด้าน ventral ลักษณะโค้งเล็กน้อยเป็นสันนูน axial area กว้าง central raphe ending โค้งงอในทิศทางเดียวกัน central area กว้าง ผิวฝามีรูรูปตัว T และรูปวงรีแคบขนาดไม่สม่ำเสมอ เรียงเป็นแถวแบบ uniseriate พบ 10 แถว ใน 10 ไมครอน โดยการเกิดของแถวของรูเป็นแบบต่อเนื่องกัน และใกล้กับบริเวณ central area พบรูรูปร่างกลม 2 รู raphe sternum ขยายออกกว้างที่ปลายฝาด้านเซลล์ ยาว 50 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Amphora* sp.2**

(ภาพที่ 55)

ฝาเซลล์รูป lanceolate ปลายฝาเป็นแบบ capitate หรือ rostrate มีอินเตอร์คาลารีแบนด์จำนวนมาก ผิวฝามีรูกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 11 แถว ใน 10 ไมครอน ราฟิอยู่ชิดขอบทางด้าน ventral มีลักษณะโค้งเล็กน้อย central raphe ending ตรงแบบ simple, central area กว้าง เซลล์กว้าง 8-13 ไมโครเมตร ยาว 37-58 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

Order Bacillariales**Family Bacillariaceae*****Bacillaria paxillifer* (O. F. Müller) Hendey**

(ภาพที่ 56)

Allen and Cupp, 1953, p. 162, fig. 117; Hendey, 1964, p. 274, pl. 21, fig. 5; Ricard, 1987, figs. 1125-1128; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 293, pl. 66, no. fig.

Synonym: *Bacillaria paradoxa* J. F. Gmelin

Nitzschia paxillifer (O. F. Müller) Heiberg

Nitzschia paradoxa (J. F. Gmelin) Grunow

Allen and Cupp, 1953, p. 162, fig. 117; Hendey, 1964, p. 274, pl. 21, fig. 5; Ricard, 1987, figs. 1125-1128; Hasle and Syvertsen, 1996, p. 293, pl. 66, no. fig.

เซลล์เกาะกันเป็นโคโลนี โดยใช้หน้าฝาแตะกัน ด้านยาวรูป linear-lanceolate หัวแหลมท้ายแหลม ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝาเซลล์เกิดจากการเรียงกันของรูแบบ uniseriate พบ 25 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟิเป็นเส้นตรงมีลักษณะเป็นสัน (keel) ระบบราฟิเป็นราฟิที่ฝังอยู่ในสันที่สูงจากหน้าฝาลึกน้อย พบเฉพาะฝาเซลล์ด้านนอก เซลล์กว้าง 6 ไมโครเมตร ยาว 69 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

***Psammodictyon panduriforme* (Gregory) Mann.**

(ภาพที่ 57)

อรรถนีย์, 2545, p. 93, pl. 112. figs. a-i; Hendey, 1964, p. 279, no. fig.; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 220, figs. 10-11; Ricard, 1987, p. 272, figs. 1029-1035

Synonym: *Nitzschia panduriform* Gregory

Hendey, 1964, p. 279, no. fig.; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 220, figs. 10-11

เซลล์ด้านวาล์วรูป panduriform ด้านगेดเคิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมน ขอบเซลล์หนา ผิวฝามีรูปกลม เรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 17 แถว ใน 10 ไมโครเมตร มี axial sternum เป็นแนวยาวบริเวณหน้าฝาสเซลล์ ทำให้การเกิดของแถวของรูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี keel raphe อยู่ที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของฝ

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Nitzschia amphibia* Grunow**

(ภาพที่ 58)

ลัดดา, 2544, p. 334, pl. 73. figs. 4-5; Krammer and Lange-Bertalot, 1988, p. 108, fig. 19; Lai, 2001, p. 123, figs. 18-20 and p. 124, figs. 24-25

เซลล์ด้านวาล์วรูป lanceolate ด้านगेดเคิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายบนฝเกิดจากรูปกลม ขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์ พบ 30-32 แถว ใน 10 ไมครอน บริเวณกึ่งกลางฝาสเซลล์ ไม่คอด ราวอยู่ในสัน ฝิบูลาไม่ยาวมาก terminal raphe ending เป็นแบบตะขอเบนออกเล็กน้อย ในทิศทางเดียวกัน เซลล์กว้าง 1-2 ไมโครเมตร ยาว 6-15 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Nitzschia sp.1**(ภาพที่ 59)**

เซลล์ด้านวาล์วรูป linear-lanceolate ปลายแบบ capitate ด้านเกอเดิลมีอินเตอร์คาร์ริแบนด์จำนวนมาก ผิวฝามีแถวของรูปรีเรียงเป็นแถวพาดตามขวางเซลล์สลับกับ interstriae พบ 23-24 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีเป็นเส้นตรง และโค้งเล็กน้อยที่กลางฝา central nodule ขยายกว้างออกเป็นรูปสามเหลี่ยม terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ (hooked) หันไปในทิศทางเดียวกัน axial area ขยายกว้าง ราฟีอยู่บริเวณขอบฝาด้านใดด้านหนึ่ง เซลล์กว้าง 5 ไมโครเมตร ยาว 102 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Nitzschia sp.2**(ภาพที่ 60)**

เซลล์ยาว กึ่งกลางเซลล์พองออกรูป lanceolate fusiform ผิวฝามีรูขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 40 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟีอยู่บนสันเป็นเส้นตรง central raphe ending ตรง terminal raphe fissure แบบตะขอ polar ending ขยายออก fibulae สันมี helitogossa ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้ง 2 ด้าน เซลล์กว้าง 7 ไมโครเมตร ยาว 250 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Nitzschia sp.3**(ภาพที่ 61)**

เซลล์รูปร่างแบบ sigmoid หัวเซลล์มนกลม มีคลอโรพลาสต์รูปกลมกระจายอยู่ทั่วเซลล์ ราฟีอยู่ก่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์ ผิวฝาด้านในมีรูรูปกลมเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate พบ 27 แถว ใน 10 ไมโครเมตร central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในนูนเห็นชัดเจน มี helitogossa ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้งสองข้าง

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Nitzschia* sp.4**

(ภาพที่ 62)

เซลล์ขนาดใหญ่ยาว บริเวณกลางเซลล์รูป lanceolate-fusiform ปลายเซลล์มน ราฟีเป็นเส้นตรง อยู่บนสันที่เป็นเส้นตรงโดยอยู่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์ กลอโรพลาสต์กระจายทั่วเซลล์ กึ่งกลางฝาไม่คอด มองเห็น fibula ชัดเจน เซลล์ยาว 863 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

Order Surirellales

Family Surirellaceae

***Plagiodiscus* sp.**

(ภาพที่ 63)

เซลล์ด้านวาล์วลักษณะลักษณะคล้ายไตรูป reniform ด้าน ventral มีส่วนเว้าลง มี keel raphe เป็นสันเห็นชัดเจนอยู่ที่ขอบของฝาเซลล์ ผิวฝาแบน ลวดลายบนฝาเกิดจากการเรียงกันของรูแบบ poroid areola เรียงเป็นแถวแบบ biseriate สลับกับ rib บาง ๆ พบ 19-20 แถว ใน 10 ไมครอน ฝาด้านในมี conspicuous rib จำนวนมาก conspicuous rib แต่ละอันเชื่อมรวมกันกับ rib ที่กลางฝา เห็นเป็นแนวสันชัดเจน central raphe ending ที่ด้านในฝาเซลล์ลักษณะคล้ายปากนก (beak-like) เซลล์กว้าง 32 ไมโครเมตร ยาว 80 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

***Surirella fastuosa* (Ehrenberg) Kützing**

(ภาพที่ 64)

อรรถนิษฐ์, 2545, p. 93, pl. 121. figs. a-l; Hendey, 1964, p. 288, pl. 40, fig. 4; Foged, 1975, p. 126, pl. 31, figs. 1-3; Ricard, 1977, p. 298, pl. 7, fig. 3; Chin *et al.*, 1985, p. 205-206, pl. 63, fig. 663; Podzorski and Håkansson, 1987, p. 266, pl. 46, figs. 10; Ricard, 1987, p. 264, figs. 951-961

Synonym: *Navicula fastuosa* Ehrenberg

Hendey, 1964, p. 288, pl. 40, fig. 4

เซลล์อยู่เดี่ยว ด้านวาล์วรูป broadly elliptical ด้านเกอเดิลรูป cuneate, sternum รูป lanceolate บริเวณกลางฝาเว้าเข้า มี costae รอบขอบฝาจำนวน 10 คู่ มีช่องเปิดของ chamber จำนวน 21 ช่อง มีเม็ด granule กระจายทั่วผิวฝาเซลล์ keel raphe เป็นสันอยู่รอบขอบฝาเซลล์ การเรียงแถวของรูเป็นแบบ biseriate และ triseriate อยู่รอบ sternum มีแถวสั้น 6-7 แถว สลับกับแถวยาว 2 แถว เซลล์กว้าง 32 ไมโครเมตร ยาว 44 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Surirella* sp.**

(ภาพที่ 65)

เซลล์ด้านวาล์วรูป ovate ขั้วเซลล์ทั้งสองข้างมีลักษณะต่างกัน (heteropole) มี chamber อยู่บริเวณขอบของ mantle จำนวน 27 ช่อง เรียงสลับกับ costae และมีช่องเปิดขนาดเล็ก 1 คู่ อยู่ที่บริเวณขั้วเซลล์ด้านที่แคบกว่า sternum รูป narrowly lanceolate มีรูรูปรียาวเรียงเป็นแถวรอบ sternum ความยาวเซลล์ 102 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis*

***Campylodiscus innominatus* Ross & Abdin**

(ภาพที่ 66)

Ricard, 1977, p. 300, pl. 15, figs. 1-2; Ricard, 1987, p. 266, figs. 965-973

เซลล์ด้านข้างรูป subcircular ด้านนอกเซลล์รูป subtriangular ราฟิดีตั้งอยู่ที่ขอบเซลล์ central raphe ending เป็นแบบตรง มีรูขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบ mutiseriate พบ 13 แถว ใน 10 ไมโครเมตร สลับกับเส้น costae การเรียงของแถวเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีแนวสันที่อยู่กลางฝาเซลล์พาดผ่านรูป elliptic พบ 6 อัน ใน 10 ไมโครเมตร มีเม็ด granule กระจายอยู่ทั่วผิวฝาเซลล์ พบเฉพาะฝาด้านนอก เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ 10 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata*

***Campylodiscus* sp.**

(ภาพที่ 67)

เซลล์ด้านข้างค่อนข้างกลม ผิวฝาเซลล์ด้านในไม่เรียบมีลักษณะเป็นลอนคลื่น มีรูขนาดเล็กเรียงโดยรอบขอบเซลล์อย่างสม่ำเสมอ พื้นที่ว่างกลางฝาเซลล์ด้านใน (sternum) เว้าเข้าทำให้มองเห็นเป็นร่องลึก fibulae ที่เกิดรอบฝาเซลล์มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ 80 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata*

pennate diatom 1


(ภาพที่ 68)

เซลล์ด้านข้างรูป broad-elliptic ปลายมน ปลายบนฝาใกล้กับขอบฝามองเห็นเป็นเส้นยาว ถัดมามีลักษณะเป็นรูปรี เรียงเป็นแถวแบบรัศมีสู่ปลายฝา พบ 19 แถว ใน 10 ไมโครเมตร ราฟิดีเป็นแบบเส้นตรง central raphe ending เบนออกเล็กน้อย มีทิศทางตรงข้ามกัน axial area ขยายกว้างเห็นชัดเจน central area ขยายออกกว้างมากประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างของเซลล์ มีรูปร่างแตกแขนง central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในมองเห็นชัดเจน ปลายบนฝาเซลล์ด้านในรูปร่างไม่สม่ำเสมอ axial area แผ่ขยายกว้างเป็นสันนูน เซลล์กว้าง 20 ไมโครเมตร ยาว 35 ไมโครเมตร

สถานภาพ: ใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*


ภาพที่ 2 *Thalassiosira* sp.

- (1) : เซลล์ด้านวาล์ว (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเคิล (LM)
- (3) : เซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
 - (a) strutted process ที่อยู่รอบขอบฝาเซลล์
 - (b) strutted process 1 อัน ที่บริเวณกลางฝา
 - (c) rimoportula 2 อัน อยู่ตรงข้ามกันทำมุม 180 องศา
ที่บริเวณขอบฝา
- (4) : ภาพขยาย strutted process ที่อยู่รอบขอบฝา และ rimoportula
- (5) : ภาพขยาย strutted process ที่บริเวณกลางฝา




ภาพที่ 3 *Cyclotella stylorum* Brightwell

- (1) : เซลล์ด้านวาล์ว (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิล (LM)
- (3) : เซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านนอก และฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : fulcrum ที่ผิวฝาด้านนอก
- (6) : fulcrum ที่ผิวฝาด้านใน
- (7) : การเรียงของรูที่ผิวฝาเซลล์ เป็นแถวแบบ fasciculate radial
- (8) : พื้นผิวบริเวณกึ่งกลางฝามีลักษณะขรุขระ มีเม็ด granule ขนาดเล็กกระจายอยู่




ภาพที่ 4 *Paralia sulcata* (Ehrenberg) Cleve






- (1) : เซลล์เชื่อมต่อกันเป็นสาย (LM)
- (2) : เซลล์ด้านวาล์วรูปร่างกลม (LM)
- (3) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มองเห็น terminal valve มีลักษณะนูน (LM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
 - (a) ช่องเปิดขนาดใหญ่เรียงเป็นวงรอบขอบเซลล์
 - (b) ridge เรียงเป็นวง
- (5) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
 - (a) mantle margin
- (6) : intercalary valve บริเวณฝาเซลล์ด้านใน (ดูกรสี)
- (7) : รูกมขนาดเล็กอยู่ถัดจากช่องเปิดขนาดใหญ่เรียงเป็นวงรอบเซลล์ (ดูกรสี)



ภาพที่ 5 *Coscinodiscus radiatus* Ehrenberg




- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์ว (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
- (3) : รู (areolae) มีเยื่อเกี่ยวพันแบบ cribra
- (4) : รูรูปหกเหลี่ยมเห็นชัดเจน (LM)
- (5) : รูเปิดขนาดเล็กด้านในฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)






ภาพที่ 6 *Actinocyclus* sp.1

- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูปกลม (LM)
- (2) : มองเห็น labiate process เป็นเงาจากฝาเซลล์ด้านนอก (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM) มีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ fasciculate radial striae
 - (a) labiate process แบบ complex-stalked romoportula เรียงตัวกันเป็นวงรอบขอบฝา
 - (b) รูเกิดหนาแน่นที่บริเวณ mantle
- (4) : ภาพขยายของ complex-stalked romoportula ที่ด้านในฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 7 *Actinocyclus* sp.2

- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูปกลม (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM) มีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ fasciculate radial striae
 - (a) labiata process แบบ complex-stalked romoportula 6 อัน เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอเป็นวงรอบขอบฝา
- (4) : ภาพขยายของ complex-stalked romoportula ที่ด้านในฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)



ภาพที่ 8 *Actinocyclus* sp.3


- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูปกลม (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM) มีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ fasciculate radial striae โดยขนาดของรูเล็กลงเมื่อเข้าใกล้ขอบฝา
 - (a) labiate process แบบ simple rimoportula 12 อัน เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอเป็นวงรอบขอบฝา
- (4) : ภาพขยายของ simple rimoportula ที่ด้านในฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)



ภาพที่ 9 *Actinoptychus senarius* (Ehrenberg) Ehrenberg (1-3)








Actinoptychus sp. (4-7)

- (1) : ผิวหน้าฝาไม่เรียบ มีลักษณะเป็นคลื่น แบ่งเป็น 6 ส่วน (SEM)
- (2) : รูปแบบ loculate areola รูปหกเหลี่ยมแบบมีเชือกกัน cribra
- (3) : บริเวณกึ่งกลางฝา มี central area
- (4) : ฝาเซลล์ด้านวาล์ว มีลักษณะเป็นคลื่น แบ่งเป็น 14 ส่วน (SEM)
 - (a) บริเวณกึ่งกลางฝา มี central area รูปรางกลม
 - (b) mantle เห็นชัดเจน
- (5) : rimoportula เรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอเป็นวงรอบขอบฝาเซลล์ด้านใน (ลูกศรชี้)
- (6) : ช่องเปิดของ rimoportula ที่ขอบฝาเซลล์ด้านนอก (ลูกศรชี้)
- (7) : rimoportula บริเวณขอบฝาเซลล์ด้านใน (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 10 *Asterolampra marylandica* Ehrenberg

- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูปร่างกลม (LM)
- (2) : บริเวณกลางฝาที่มีก้านที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 7 เส้น
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
 - (a) ฝาด้านนอกมี hyaline ray 7 อัน
 - (b) ปลาย ray มีช่องเปิดขนาดใหญ่
- (4) : รูบนผิวฝาแบบ loculate areola
- (5) : บริเวณขอบด้านล่าง ray มีช่องเปิดขนาดเล็ก (ลูกศรชี้)
- (6) : ฝาด้านในมองเห็น chamber ขนาดใหญ่ 7 อัน (ลูกศรชี้)
- (7) : มี rimoportula อยู่ที่ปลาย chamber (ลูกศรชี้)



ภาพที่ 11 *Triceratium favus* Ehrenberg


- (1) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูปสามเหลี่ยม (LM)
- (2) : รูรูปหกเหลี่ยมมีเยื่อเกี่ยวพันแบบ cribra
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM) มุมฝาเซลล์ยกสูง มี ocellus อยู่ที่มุมเซลล์ทั้ง 3 มุม
- (4) : ocellus รูปร่างกลม มีขนาดเล็กเรียงกันแบบปรัศมี
- (5) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (6) : มี spine ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณผิวฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)
- (7) : เห็นแผ่นเยื่อเกี่ยวพันชัดเจนที่บริเวณฝาเซลล์ด้านใน



ภาพที่ 12 *Lampriscus* sp. (1-4)


Biddulphia biddulphiana (J. E. Smith) (5-7)

- (1) : เซลล์ด้านगेอดิรูปทรงระบอ
- (2) : ที่มุมฝาเซลล์ มี pseudocellus ยกสูงขึ้น 4 อัน ลักษณะของ pseudocellus เป็นแบบปลายตัดเรียบ
- (3) : เซลล์ด้านวาถัรูปร่างกลม
- (4) : รูฐปรี (elliptical areola) ขนาดเล็กจำนวนมาก
 - (a) valvocopula
 - (b) copulae
- (5) : เซลล์ด้านगेอดิรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มุมฝายกสูงขึ้น มี pseudocellus ที่มุมฝาทั้งสองด้าน
- (6) : pseudocellus ที่มีลักษณะเป็นเขารูปร่างกลม (ลูกศรชี้)
- (7) : ลายบนฝาเกิดจากรูรูปกลมที่มีเยื่อถันแบบ cribra



ภาพที่ 13 *Isthmia enervis* Ehrenberg





- (1) : เซลล์ด้านगेอดิรูปลี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (LM)
- (2) : ขั้วเซลล์ทั้งสองข้างมีลักษณะต่างกัน
- (3) : เซลล์ด้านगेอดิ (SEM)
- (4) : รูบนฝาเซลล์รูปลี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แบบมีเชือกกัน cribra
- (5) : รูบน mantle รูปลี่ขนาดเล็กกว่าที่พบบนฝาเซลล์



ภาพที่ 14 *Cymatosira lorenziana* Grunow (1-2)





Podocystis spathulata (Schadbolt) Grunow (3-5)

- (1) : เซลล์ด้านगेเกิดรูป lanceolate ปลายตัดตรง โดยแต่ละเซลล์เชื่อมต่อกัน
โดยใช้หนามที่อยู่บริเวณขอบฝา
- (2) : หนามที่อยู่บริเวณขอบฝา เรียก marginal spine (ลูกศรชี้)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านวาล์วรูป spatulate หน้าฝาแบนราบ (LM)
- (4) : รูบนฝาแบบ areolae cicular ขนาดเล็ก มีเยื่อหุ้มแบบ vota
 - (a) ช่องเปิดของ rimorportula บริเวณฝาเซลล์ด้านนอก
- (5) : sternum ขาวจรดปลายฝา (ลูกศรชี้)



ภาพที่ 15 *Licmophora* sp.


- (1) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปลิ้ม (cuneate) ต่อกันเป็นแผง มองเห็นคลอโรพลาสต์
รูปกลมกระจายอยู่ทั่วเซลล์ (ดูกรสี) (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิล (SEM)
- (3) : การเรียงกันของรูบนแถบแบบ parallel striae
 - (a) sternum หรือ pseudoraphe บนฝาเซลล์ด้านวาล์ว
- (4) : ขั้วเซลล์ด้านล่าง



ภาพที่ 16 *Ardissonea* sp. (1-2)

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Husted (3-6)


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป narrowly linear ปลายมน
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเซลล์เรียบ มองเห็นคลอโรพลาสต์เป็นแผ่น
- (3) : เซลล์ต่อกันเป็นรูปซิกแซก คลอโรพลาสต์รูปกลมกระจายอยู่ทั่วเซลล์ (ดูกรสี)
- (LM)
- (4) : ผิวเซลล์ด้านข้าง (SEM)
- (5) : เซลล์เชื่อมต่อกันด้วยเจลาตินที่มีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ (ดูกรสี)
- (6) : รูปตัว Y ที่อยู่บริเวณขอบฝา ทำให้เมื่อมองดูคล้ายผิวฝามีหนามเล็ก ๆ



ภาพที่ 17 *Rhabdonema* sp. (1-3)







Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow (4-8)

- (1) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (2) : ocelli บริเวณปลายฝา (ลูกศรชี้)
- (3) : การเรียงของรูของแถวแบบ uniseriate
- (4) : เซลล์ด้านวาล์วรูป narrowly linear (LM)
 - (a) window บนฝาเซลล์ด้านวาล์ว
- (5) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
 - (a) septum 2 คู่ บนฝาเซลล์ด้านเกอเดิล
- (6) : เซลล์ด้านเกอเดิล (SEM)
- (7) : รูขนาดเล็กเกิดหนาแน่นที่บริเวณขั้วเซลล์
- (8) : รูบนผิวเซลล์รูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate




ภาพที่ 18 *Lyrella lyra* (Ehrenberg) Karajeva

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic-lanceolate (LM)
 - (a) lateral area รูป lyre-shaped ขาวจรดปลายฝ
- (2) : เซลล์ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (4) : ฝเซลล์ด้านใน (SEM) มองเห็นแถวของรูมีลักษณะเป็นร่อง
- (5) : (a) central raphe ending ที่ฝด้านนอกรูป lanceolate
 - (b) central area รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 - (c) การเรียงแถวของรูบนฝแบบ uniseriate
- (6) : terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ (strong hook) เบนออกในทิศทางเดียวกัน (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 19 *Lyrella* sp.

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป broadly lanceolate (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเกิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
 - (a) lateral area กว้าง รูป lyre-shaped ขอบตัวลง ขาวจรดปลายฝา
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : (a) central raphe ending ที่ผิวฝาด้านนอกรูป lanceolate
(b) central area รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (6) : terminal raphe fissure เป็นแบบตะขอ (strong hook) เบนออกในทิศทางเดียวกัน (ดูกรรขี)
- (7) : การเรียงแถวของรูบนผิวฝาแบบ uniseriate




ภาพที่ 20 *Petroneis granulata* (Bailey) Mann. Comb. Nov.

- (1) : เซลล์ด้านยาวรูป lanceolate (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก และฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (5) : (a) central area ขยายกว้าง
(b) central raphe ending รูปตัว T
- (6) : central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในรูปร่างกลม (ลูกศรชี้)
- (7) : รูเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate เป็นรัศมีสู่ปลายฝา
- (8) : terminal raphe fissure โค้งเล็กน้อย (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 21 *Mastogloia fimbriata* (Brightwell) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป broadly elliptical ปลายมน (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM) ราฟีเป็นเส้นตรง ผิวฝามีรูรูปกลม
เรียงแบบ uniseriate และเรียงแบบ biseriate ที่บริเวณขอบฝา
- (3) : (a) central raphe ending บริเวณฝาเซลล์ด้านนอกขยายออกรูป lanceolate
(b) รู (areola) มีเยื่อขึ้นแบบ cribra
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
(a) partectum รูปวงรีขนาดใหญ่
(b) ราฟีเป็นสันนูน
- (5) : central raphe ending บริเวณฝาเซลล์ด้านในตรงแบบ simple (ลูกศรชี้)
- (6) : รูกลมขนาดใหญ่ 1 รู ที่บริเวณปลายทั้งสองด้านของ partectal ring








ภาพที่ 22 *Mastogloia punctifera* Brun

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป elliptic-lanceolate ปลายเซลล์ยื่นยาวออก มองเห็น paretal ring ขาวจรดปลายฝา (ลูกศรชี้) (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : paretal ring (ลูกศรชี้)
- (4) : เซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
 - (a) ปลายเซลล์ยื่นยาวออกแบบ rostate
 - (b) ราฟีเป็นคลื่น
- (5) : รูบนฝามีขนาดและรูปร่างไม่สม่ำเสมอ central raphe ending โค้งไปในทิศทางเดียวกัน
- (6) : paretal duct บริเวณด้านข้างเซลล์ (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 23 *Mastogloia quinquecostata* Grunow

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptical มองเห็นคลอโรพลาสต์ลักษณะเป็นแผ่น 2 แผ่น (ลูกศรชี้) (LM)
- (2) : partectal ring แคบ ขาวไม่ถึงปลายเซลล์ (ลูกศรชี้) (LM)
- (3) : เซลล์ด้านข้าง (SEM) ที่ผิวมีรูรูปกลมเรียงแบบ uniseriate
 - (a) lateral area แผ่ขยายกว้าง ปลายแหลม
 - (b) ราฟที่อยู่บนสันนูน โค้งเล็กน้อย
- (4) : central raphe ending แบบตรง
- (5) : terminal raphe fissure โค้งเล็กน้อย เบนออกในทิศทางเดียวกัน
 - (a) rib ที่อยู่บน mantle




ภาพที่ 24 *Mastogloia recta* Hustedt

- (1) : เซลล์ด้านยาววาล์วรูป linear-lanceolate
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (3) : partectal ring ยาวเกือบถึงปลายฝาเซลล์ (ลูกศรชี้)
- (4) : partectal ring มองเห็นชัดเจนที่ด้านเกอเดิล (ลูกศรชี้)
- (5) : ผิวฝามีรูรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate
 - (a) ราฟีโค้งเล็กน้อย
- (6) : central raphe ending แบบตรง (ลูกศรชี้)







ภาพที่ 25 *Mastogloia rhombica* Cleve

- (1) : เซลล์ด้านยาวรูป rhombic-lanceolate, partertal ring แคบ (ดูกรรจ) (LM)
- (2) : ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : เซลล์ด้านยาว (SEM) ผิวฝามีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate
 - (a) mantle หนา เห็นชัดเจน
 - (b) ราฟเป็นคลื่นและขยายออกเป็นแผ่นพับ
- (4) : รูปนผิวรูปกลมมีเชื่อมกันแบบ cribra
- (5) : central area แคบยาว
- (6) : terminal raphe fissure เบนออกเล็กน้อย




ภาพที่ 26 *Mastogloia cf. crucicula* (Grunow) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic มองเห็น partectal ring ที่ขอบฝาเซลล์ (ลูกศรชี้) (LM)
- (2) : เซลล์ด้านข้าง (SEM) ฝาเซลล์มีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate
 - (a) central area เป็นแนวยาวพาดขวางเซลล์
- (3) : central raphe ending ขยายออก
- (4) : terminal raphe fissure แบบตรง




ภาพที่ 27 *Mastogloia* sp.1

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic ปลายเซลล์ยื่นยาวออก (LM)
 - (a) partectal ring ขาวเกือบถึงปลายเซลล์ (LM)
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (3) : เซลล์ด้านข้าง (SEM)
- (4) : ผิวขามีรูปร่างยาว แถวของรูมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย
 - (a) ราฟีบริเวณใกล้ central area มีลักษณะเป็นคลื่นในทิศทางเดียวกัน
- (5) : บริเวณปลายเซลล์



ภาพที่ 28 *Mastogloia* sp.2


- (1) : เซลล์ด้านยาวรูป broadly lanceolate (LM)
- (2) : ราฟเป็นเส้นตรง, central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกขยายออก (ลูกศรชี้) (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
 - (a) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง
- (4) : terminal raphe fissure ที่ด้านในฝาเซลล์ตรง (ลูกศรชี้)
- (5) : partectum รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่า ๆ กัน (ลูกศรชี้)



ภาพที่ 29 *Mastogloia* sp.3 (1-4)

Gomphonema sp. (5)


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป broadly-lanceolate ราฟีเป็นเส้นตรง (ลูกศรชี้)
- (2) : ผิวฝามีรูปกลมเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate
- (3) : central nodule เป็นสันนูนเห็นชัดเจน
- (4) : partectal ring ขาวจรดปลายเซลล์, partectum มีขนาดไม่เท่ากัน
 - (a) partectum รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ 2 อัน
- (5) : (a) เซลล์ด้านข้างรูป hastate ปลายเซลล์สองด้านมีขนาดไม่เท่ากัน (LM)
 - (b) central area กว้าง ขาวจรดขอบเซลล์ทั้งสองด้าน ที่ผิวเซลล์มีรูขนาดใหญ่
 - (c) central raphe ending แบบตรง



ภาพที่ 30 *Achnanthes* sp. (1-3)


Cocconeis pellucida (Hantzsch) Grunow (4-7)

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป linear-lanceolate ตรงกลางเว้าเข้า
- (2) : ด้านนอกเคียวรูป flared cuneate
- (3) : บริเวณกลางมีราฟจริง เรียก r-raphe
 - (a) พื้นที่ว่างรอบขอบเซลล์ทั้งสองด้านเรียก stauros หรือ fascia
- (4) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic (LM)
- (5) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM) ผิวฝาไม่เรียบลักษณะเป็นคลื่น ราฟเป็นสันนูน
- (6) : (a) central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในรูปกลม ลักษณะนูนเห็นชัดเจน
 (b) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในเบนออกเล็กน้อยในทิศทางตรงข้ามกัน
- (7) : terminal raphe fissure เบนออกเล็กน้อยในทิศทางตรงข้ามกัน (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 31 *Cocconeis scutellum* Ehrenberg

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptical (LM)
- (2) : ฝาเซลล์บน (SEM) บริเวณฝาด้านนอก เห็นราฟีเทียม หรือ sternum เป็นแนวใสชัดเจนยาวตลอดเซลล์ (ลูกศรชี้)
- (3) : ผิวฝาเซลล์มีรูปลักษณะใหญ่เรียงเป็นแถวแบบ uniseriate และรูขนาดเล็กแบบ multiseriate ที่บริเวณขอบฝา
- (4) : ฝาเซลล์ล่าง (SEM) มีราฟีแท้
- (5) : central raphe ending ที่บริเวณฝาเซลล์ด้านใน เบนออกเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
- (6) : terminal raphe fissure แบบตรง
- (7) : rib บริเวณขอบฝาเซลล์ด้านใน




ภาพที่ 32 *Pinnularia* sp.

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป linear lanceolate (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายมน (LM)
- (3) : เซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
- (4) : central raphe ending ขยายออก
- (5) : terminal raphe fissure รูปตะขอ (strong hooked) เบนออกในทิศทางเดียวกัน
- (6) : รู (poroid areolae) เรียงเป็นแถวแบบ multiserial




ภาพที่ 33 *Caloneis alpestris* (Grunow) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป linear-elliptical (LM)
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : กลางฝา มี marking เป็นร่องลึกรูปพระจันทร์ (crescent) จำนวน 1 คู่ (ลูกศรชี้)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (5) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
 - (a) รูปร่างกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวขนานกับแนวราฟี และโค้งออกที่บริเวณ central area
- (6) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกขยายออกเล็กน้อย
 - (a) marking เป็นร่องลึกรูปพระจันทร์ (crescent) 1 คู่
- (7) : terminal raphe fissure แบบเปิดบนออกเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
- (8) : polar ending ที่ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa ด้านละ 1 อัน
- (9) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง
- (10) : ผิวฝามีรูปร่างกลมขนาดเล็กเป็นแถวพาดขวางเซลล์




ภาพที่ 34 *Caloneis liber* (W. Smith) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป narrowly linear (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเกิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : (a) marking เป็นร่องลึกรูป lunate โค้งเล็กน้อย 1 คู่
(b) central raphe ending ขยายออกเล็กน้อย
- (6) : terminal raphe fissure แบบเปิดเบนออกเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
- (7) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง, central nodule เห็นชัดเจน
(a) รูปร่างกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวขนานกับแนวราฟี และโค้งออกที่บริเวณ central area
- (8) : polar ending ที่ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa ด้านละ 2 อัน
- (9) : ผิวฝามีรูปร่างกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ multiserial




ภาพที่ 35 *Caloneis samoensis* (Grunow) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป lanceolate (LM)
- (2) : เกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน (LM)
- (3) : เซลล์ด้านวาล์ว (SEM)
- (4) : (a) marking เป็นร่องลึกรูป lunate 1 คู่
(b) central raphe ending ตรง
- (5) : บริเวณหัวเซลล์ hyaline area แผ่ขยายกว้าง
(a) รูปร่างขนาดใหญ่บริเวณหัวเซลล์
- (6) : (a) แถวของรูพาดขวางเซลล์สลับกับ rib
(b) mantle หน้า




ภาพที่ 36 *Diploneis crabro* (Ehrenberg) Ehrenberg

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป panduliform (LM)
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางฝาเซลล์ยวบลง (LM)
- (3) : เซลล์ด้านข้าง longitudinal canal ขนานกับแนวราฟี (ลูกศรชี้) (SEM)
- (4) : central raphe ending โค้งงอเป็นรูปตะขอ (strongly hooked) ในทิศทางเดียวกัน (ลูกศรชี้)
- (5) : terminal raphe fissure รูปตะขอ (hook) หันไปในทิศทางเดียวกัน (ลูกศรชี้)
- (6) : รูปลูกกลมขนาดเล็กแบบมีเยื่อเกี่ยวกัน cribra เรียงเป็นแถวแบบ biseriate




ภาพที่ 37 *Diploneis fusca* var. *pervasta* (Gregory) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านวาถรูป rhombic-elliptical (LM)
 - (a) longitudinal canal ที่ฝาเซลล์ด้านนอก
- (2) : เซลล์ด้านเกอเติลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
 - (a) transapical rib ขาว
 - (b) ไม่มีช่องเปิดของ longitudinal canal ที่ฝาเซลล์ด้านใน
- (4) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 38 *Diploneis oblongella* (Naeg. ex Kütz.) Ross

- (1) : เซลล์ด้านยาวรูป elliptic (LM)
- (2) : ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ผิวฝาเซลล์มีแถวของรูพาดขวางเซลล์
 - (a) longitudinal canal แคบ เป็นแถวขนานกับแนวราฟี และโค้งออกที่บริเวณ central area
 - (b) central area กว้าง
 - (c) central raphe ending ขยายออก
- (4) : (a) transapical rib ขาว
 - (b) ไม่มีช่องเปิดของ longitudinal canal ที่ฝาเซลล์ด้านใน
 - (c) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง




ภาพที่ 39 *Diploneis splendida* (Gregory) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป panduliform (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางเว้าเข้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (4) : (a) transapical rib
(b) longitudinal canal เรียงเป็นแถวขนานกับแนวราฟี
(c) central nodule กลม
- (5) : central raphe ending ลักษณะเป็นร่อง
- (6) : terminal raphe fissure รูปตะขอ (strong hooked) หันไปในทิศทางเดียวกัน




ภาพที่ 40 *Diploneis suborbicularis* (Gregory) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเกิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ผิวฝาไม่เรียบ ราฟีเป็นเส้นตรง (SEM)
 - (a) แถวของ longitudinal canal
 - (b) central raphe ending แบบตรงขยายออกเล็กน้อย
 - (c) แถวของรูพาดตามขวางเซลล์
- (4) : ผิวฝามีรูที่มีเชื้อหุ้มแบบ cribra
- (5) : terminal raphe fissure เบนออกในทิศทางเดียวกัน




ภาพที่ 41 *Diploneis weissflogi* (A. Schmidt) Cleve

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป panduriform ปลายเซลล์มี longitudinal canal
รูปกลมเรียงเป็นแถวขนานกับแนวราฟี
- (2) : ราฟีเป็นเส้นตรง (ลูกศรชี้)
- (3) : เซลล์ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- (4) : (a) central area แคบ มีช่องรูปรียาวขยายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ตรง
บริเวณส่วนปลายที่ติดกับ mantle
(b) central raphe ending ตรง
- (5) : (a) terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked) เบนออกเล็กน้อย
หันไปในทิศทางเดียวกัน
(b) ผิวฝาเซลล์มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate สลับกับ rib




ภาพที่ 42 *Frustulia rhomboides* (Ehrenberg)

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป rhombic-lanceolate ราฟเป็นเส้นตรง (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเกิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (4) : (a) central raphe ending ตรง
(b) central nodule เห็นชัดเจนที่ฝาเซลล์ด้านใน
- (5) : polar ending ที่ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa ด้านละ 1 อัน




ภาพที่ 43 *Navicula avenacea* (Brébisson & Godey) Brébisson

- (1) : เซลล์ด้านยาวรูป linear lanceolate (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : (a) แถวของรูรูปรียาวเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate
(b) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกรูปรีเบนออกเล็กน้อย
ในทิศทางเดียวกัน
(c) central area ขยายออกกว้าง
- (6) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked)
- (7) : ราฟิที่ฝาเซลล์ด้านในเป็นสันนูน, central nodule มองเห็นชัดเจน (ลูกศรชี้)
- (8) : polar ending ที่ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa



ภาพที่ 44 *Navicula* sp.1


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป narrow lanceolate (LM)
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
 - (a) central area ขยายออกกว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 - (b) รูปร่างเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate
 - (c) central raphe ending ขยายออกรูปกลม
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง (ลูกศรชี้)
- (5) : terminal raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกแบบตะขอ (strong hooked) เบนออกในทิศทางเดียวกัน
- (6) : terminal raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในขยายออกรูปรี



ภาพที่ 45 *Navicula* sp.2 (1-5)

Navicula sp.3 (6-8)

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป narrowly-lanceolate (LM)
- (2) : ด้านนอกเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM) ผิวฝาเรียบรูปรียาวเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์
แบบ uniseriate
- (4) : central raphe ending โค้งงอรูปตะขอหันไปในทิศทางเดียวกัน
- (5) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked)
หันไปในทิศทางเดียวกัน
- (6) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptic ราฟี่เป็นเส้นตรง
- (7) : (a) central raphe ending ขยายออกรูปรีเบนออกเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
(b) central area ขยายกว้างรูปรี
(c) ช่องเปิดรูปกลม 1 ช่อง บริเวณ central area
- (8) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked) หันไปในทิศทางเดียวกัน



ภาพที่ 46 *Trachyneis aspera* (Ehrenberg) Cleve

(1) : เซลล์ด้านข้างรูป linear-lanceolate ราฟเป็นเส้นตรง (LM)

(a) central area ขยายกว้างมากรูปโบว์ (bow-tie shaped)

(2) : เซลล์ด้านนอกเคลือบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)

(3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)

(4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)

(5) : ผิวฝาเซลล์ด้านนอกมีรูรูปรีแคบยาว

(a) central raphe ending แบบตะขอหันไปในทิศทางเดียวกัน

(b) central area รูปโบว์ (bow-tie shaped)


(6) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked)

(7) : ผิวฝาเซลล์ด้านในมีรูรูปกลม

(a) central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในเห็นชัดเจน


(b) central area รูปโบว์ (bow-tie shaped)

(8) : ฝาด้านในมีรูรูปกลมอยู่ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้ง 2 ข้าง




ภาพที่ 47 *Pleurosigma angulatum* (Quekett) W. Smith

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป sigmoid (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูป lanceolate fusiform (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟีรูป sigmoid โค้งไปในทิศทางเดียวกัน
กับฝาเซลล์ (SEM) (ลูกศรชี้)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : central raphe ending รูปรี เบนออกเล็กน้อยในทิศทางตรงข้ามกัน
- (6) : terminal raphe fissure ที่ฝาเซลล์ด้านนอกรูปตะขอ (strong hooked)
หันไปในทิศทางตรงข้ามกัน
- (7) : terminal raphe fissure ที่ฝาเซลล์ด้านในขยายออกเป็นแผ่น
- (8) : central nodule เห็นชัดเจนที่ฝาเซลล์ด้านใน
- (9) : รูขนาดเล็กบริเวณผิวฝาด้านนอกเป็นแถว มีทิศทางตั้งฉากกับแนวราฟี
ประมาณ 45 องศา




ภาพที่ 48 *Pleurosigma* sp.1

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป sigmoid (LM)
- (2) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูป lanceolate fusiform (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟีรูป sigmoid โค้งไปในทิศทางเดียวกันกับฝาเซลล์ (SEM) (ลูกศรชี้)
- (4) : ผิวฝาเซลล์มีรูขนาดเล็กเรียงเป็นแถว มีทิศทางตั้งฉากกับแนวราฟีประมาณ 45 องศา
 - (a) central nodule เห็นชัดเจน
- (5) : central raphe ending เบนเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
- (6) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked)




ภาพที่ 49 *Pleurosigma* sp.2

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป sigmoid (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (3) : central area แคบ ราฟีที่บริเวณใกล้ central raphe ending มีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย
- (4) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked)
- (5) : ผิวฝามีรูขนาดเล็กรูปรีเรียงเป็นแถว มีทิศทางตั้งฉากกับแนวราฟี ประมาณ 45 องศา




ภาพที่ 50 *Plagiotropis pusilla* (Gregory) Kuntze

- (1) : ฝาเซลล์รูป lanceolate ปลายแหลม
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟิอยู่บนสัน (ลูกศรชี้) (SEM)
- (3) : ผิวฝามีรูขนาดเล็กแบบ uniseriate พาดขวางเซลล์
 - (a) raphe มีรอยหยักตรงบริเวณเข้าใกล้ central area
 - (b) central raphe ending ขยายออกรูปกลม
- (4) : terminal raphe fissure แบบเปิด (ลูกศรชี้)
- (5) : helictoglossa ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้งสองด้าน
- (6) : central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในมี ridge 2 อัน (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 51 *Amphora obtusa* Gregory

- (1) : เซลล์ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมน ราฟีเป็นสันโค้งมองเห็นชัดเจน (ลูกศรชี้) (LM)
- (2) : girdle band จำนวนมาก (ลูกศรชี้) (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน ราฟีอยู่บนสันโค้งนูน (ลูกศรชี้) (SEM)
- (4) : central nodule ที่ฝาเซลล์ด้านในลักษณะนูนหนาเห็นชัดเจน
- (5) : helictoglossa ที่บริเวณขั้วเซลล์ทั้งสองด้าน (ลูกศรชี้)
- (6) : ผิวด้านในฝาเซลล์มีรูรูปกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 52 *Amphora ovalis* Kützing

- (1) : เซลล์รูป broad-elliptical
- (2) : (a) central nodule เห็นชัดเจน
(b) ราฟเป็นเส้นโค้ง
- (3) : girdle band จำนวนมาก (ลูกศรชี้)
- (4) : เซลล์ด้านข้างรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentic) ถายบนฝาเป็นแถว
พาดขวางเซลล์




ภาพที่ 53 *Amphora ventricosa* Gregory

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentic) (LM)
- (2) : ด้านเกอเดิลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางพองออก (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟีเป็นเส้นตรง (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน แถวของรูมีลักษณะเป็นร่อง (SEM)
- (5) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกเบนออกในทิศทางเดียวกัน (ลูกศรชี้)
- (6) : ผิวฝามีรูรูปรีขนาดเล็กจำนวนมาก เรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate ขอบเซลล์หนา
- (7) : central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในรูปตรง (ลูกศรชี้)
- (8) : ฝาเซลล์ด้านในมี helictoglossa ที่บริเวณขั้วเซลล์ (ลูกศรชี้)
- (9) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (strong hooked) หันไปในทิศทางเดียวกัน




ภาพที่ 54 *Amphora* sp.1

- (1) : เซลล์รูป elliptical (LM)
- (2) : เซลล์ด้านยาวรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentic) (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟีเป็นเส้นโค้งอยู่บนสัน (ลูกศรชี้)
- (4) : รูปบนผิวฝาเป็นเส้นยาว มีขนาดและรูปร่างไม่สม่ำเสมอ
- (5) : central raphe ending แบบตรง โค้งเล็กน้อยในทิศทางเดียวกัน
 - (a) รูรูปกลม 2 รู ที่บริเวณ central area
- (6) : terminal raphe fissure เบนออกในทิศทางเดียวกัน




ภาพที่ 55 *Amphora* sp.2

- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentic) ปลายฝาเซลล์แบบ capitate หรือ rostrate (LM)
- (2) : girdle band จำนวนมาก (ลูกศรชี้) (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (4) : (a) central raphe ending รูปตรง
(b) รูปร่างกลมแบบมีเอือกัน cribra เรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate







ภาพที่ 56 *Bacillaria paxillifer* (O. F. Müller) Hendey

- (1) : เซลล์ด้านगेอดิรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เกาะกันเป็นโคโลนี (LM)
- (2) : เซลล์ด้านวาล์วรูป lanceolate แต่ละเซลล์แตะกันโดยใช้ส่วนของหน้าฝา (SEM)
- (3) : (a) ราฟีฝังอยู่ในสันที่สูงจากหน้าฝา
(b) แถวของรูพาดตามขวางเซลล์เรียงแบบ uniseriate สลับกับ rib
- (4) : terminal raphe fissure ขยายออก (ลูกศรชี้)




ภาพที่ 57 *Psammodictyon panduriforme* (Gregory) Mann


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป panduriform (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
 - (a) keel raphe อยู่บน mantle
 - (b) พื้นที่ว่างกลางเซลล์ (axial sterna) ของฝาเซลล์ด้านนอก
 - (c) ขอบเซลล์หนา
- (3) : central raphe ending ที่อยู่บน mantle มีลักษณะตรง
- (4) : ผิวฝามีรูปกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate



ภาพที่ 58 *Nitzschia amphibia* Grunow


- (1) : เซลล์ด้านวาล์วรูป lanceolate ไม่มีลอคอดที่บริเวณกึ่งกลางฝา
- (2) : ผิวฝามีรูปกลมขนาดใหญ่พาดขวางเซลล์
 - (a) ราฟิอยู่บริเวณ mantle
- (3) : fibulae ที่บริเวณฝาเซลล์ด้านในไม่ยาวมาก (ดูกรสรชี้)






ภาพที่ 59 *Nitzschia* sp.1

- (1) : ฝาเซลล์รูป linear-lanceolate ปลายมนกลม (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านยาวแล้ว และ เกอเดิลแบนด์ (SEM)
- (3) : (a) ราฟีโค้งเว้าที่บริเวณกลางฝาเซลล์
(b) เกอเดิลแบนด์
(c) central nodule ขยายออกรูปสามเหลี่ยม
- (4) : ผิวฝามีรูรูปรีเรียงเป็นแถวแบบ uniseriate สลับกับ rib พาดตามขวางเซลล์
- (5) : terminal raphe fissure แบบตะขอ (hook)




ภาพที่ 60 *Nitzschia* sp.2

- (1) : เซลล์ยาวมาก กึ่งกลางเซลล์พองออกรูป lanceolate fusiform (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก (SEM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟิอยู่ก่อนไปทางฝาเซลล์ด้านในด้านหนึ่ง (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : ฝาเซลล์ด้านใน มีราฟิอยู่ภายใน fibula (ลูกศรชี้) (SEM)
- (6) : ผิวฝาเซลล์ด้านนอกมีรูปร่างกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์
แบบ uniseriate, central area ขยายกว้างรูป lanceolate
(a) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกแบบตรง ขยายออกเล็กน้อย
- (7) : ผิวฝาเซลล์ด้านในมีรูปร่างกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์
แบบ uniseriate
(a) ฝาเซลล์ด้านในมี fibulae ภายในมีราฟิ
(b) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในยกมี ridge ยกสูง
- (8) : terminal raphe fissure เป็นร่อง มีลักษณะโค้งงอ
- (9) : ฝาเซลล์ด้านในมี helitoglossa ที่บริเวณหัวเซลล์ทั้งสองข้าง




ภาพที่ 61 *Nitzschia* sp.3


- (1) : เซลล์รูป sigmoid ปลายเซลล์มนกลม (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (3) : ขอบเซลล์หนา ผิวฝามีรูปกลมเรียงเป็นแถวพาดขวางเซลล์แบบ uniseriate
 - (a) fibulae ที่ด้านในฝาเซลล์ ภายในมีราไฟ
 - (b) central nodule ฐานเห็นชัดเจน
- (4) : ฝาเซลล์ด้านในมี helitogossa ที่บริเวณข้อเซลล์ทั้งสองข้าง



ภาพที่ 62 *Nitzschia* sp.4


- (1) : เซลล์ยาวใหญ่ กึ่งกลางเซลล์พองออกรูป lanceolate fusiform
- (2) - (3) : ราฟิอยู่ก่อนไปทางด้านในด้านหนึ่งของเซลล์ (ลูกศรชี้)
- (4) : fibulae เห็นชัดเจน ภายในมีราฟิ (ลูกศรชี้)
- (5) : terminal raphe fissure ขยายออก (ลูกศรชี้)






ภาพที่ 63 *Plagiodiscus* sp.

- (1) : ฝาเซลล์คล้ายไต (reniform) เว้าลงด้าน ventral (LM)
- (2) : ฝาเซลล์ด้านนอก ราฟอยู่บริเวณขอบเซลล์ (SEM)
 - (a) ปลายราฟด้าน ventral
 - (b) ปลายราฟด้าน dorsal
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (4) : ปลายราฟ ด้าน ventral ของฝาด้านนอก (ลูกศรชี้)
- (5) : (a) fibulae ภายในมีราฟ
 (b) beak-like บริเวณปลายราฟ ด้าน ventral ของฝาด้านใน (ลูกศรชี้)
- (6) : ผิวฝามีรูรูปกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบ biseriate สลับกับ rib




ภาพที่ 64 *Surirella fastuosa* (Ehrenberg) Kützing


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป broadly elliptical (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเซลล์รูป cuneate (LM)
- (3) : เซลล์ด้านข้าง (SEM)
 - (a) ราฟเป็นแบบ keel raphe อยู่รอบขอบฝาเซลล์
 - (b) sterna รูป lanceolate
 - (c) chamber
- (4) : เซลล์ด้านนอกเซลล์ (SEM)
 - (a) keel raphe อยู่รอบขอบฝาเซลล์
 - (b) girdle band



ภาพที่ 65 *Surirella* sp.


- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป elliptical (LM)
- (2) : เซลล์ด้านข้างรูป cuneate ขอบปากสูงชัน (ลูกศรชี้) (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านใน sterna รูป narrow lanceolate (ลูกศรชี้) (SEM)
- (4) : รูปร่าง 2 รู บริเวณหัวเซลล์ด้านที่มีปลายแหลม
- (5) : chamber ด้านในฝาเซลล์






ภาพที่ 66 *Campylodiscus innominatus* Ross & Abdin

- (1) : ฝาเซลล์รูปอานม้า หรือ saddle-shaped (LM)
- (2) – (3) : ฝาเซลล์โค้ง keel raphe อยู่ที่ขอบฝาเซลล์ (ลูกศรชี้) (SEM)
- (4) : (a) rib เป็นเส้นพาดขวางเซลล์
(b) กลางฝาเซลล์มี sterna เป็นสัน
- (5) : บริเวณปลายราฟ (ลูกศรชี้)
- (6) : แนวสันที่อยู่เชื่อมติดขอบเซลล์ เรียงสลับกับช่องรูปรียาว
- (7) : เม็ดกรานูลขนาดเล็ก (granule) กระจายทั่วเซลล์




ภาพที่ 67 *Campylodiscus* sp.

- (1) : ฝาเซลล์ค่อนข้างกลม (LM)
- (2) : ฝาเซลล์โค้งงอรูปอานม้า หรือ saddle-shaped (SEM)
- (3) : ฝาเซลล์มีลักษณะเป็นคลื่น
 - (a) แนวสันบริเวณติดกับขอบฝา เรียงสลับกับช่องรูปรี
 - (b) sterna ที่บริเวณกลางเซลล์เว้าเข้า
- (4) : (a) ตำแหน่งของปลาย keel raphe ที่ตั้งอยู่ขอบฝา
- (b) รูขนาดเล็กเรียงเป็นแถวแบบ biseriate รอบขอบฝา



ภาพที่ 68 pennate diatom 1 (1-10)

- (1) : เซลล์ด้านข้างรูป broad-elliptic (LM)
- (2) : เซลล์ด้านนอกเค็ดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LM)
- (3) : ฝาเซลล์ด้านนอก axia area แผ่ขยายกว้างเป็นสันนูน (ลูกศรชี้) (SEM)
- (4) : ฝาเซลล์ด้านใน (SEM)
- (5) : (a) central nodule นูนเห็นชัดเจน central area ที่ฝาเซลล์ด้านนอก
ขยายออกกว้างแบบแตกแขนง
(b) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านนอกตรง เบนออกเล็กน้อยใน
ทิศทางตรงข้ามกัน
- (6) : (a) central area ที่ฝาเซลล์ด้านในขยายออกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(b) central raphe ending ที่ฝาเซลล์ด้านในตรง ราฟีมีลักษณะเป็นร่อง
- (7) : terminal raphe fissure ที่ฝาเซลล์ด้านนอกตรง
- (8) : terminal raphe fissure ที่ฝาเซลล์ด้านในเบนออกเล็กน้อย
- (9) : ลายบนฝาเซลล์ด้านนอก บริเวณใกล้ขอบฝาเป็นเส้นยาว ถัดมาเป็นรูปรี
เรียงเป็นแถวแบบรัศมีสู่ปลายฝา
- (10) : ผิวฝาเซลล์ด้านในมีรูที่มีขนาด และรูปร่างไม่สม่ำเสมอ



จำนวนชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้

เดือนตุลาคม 2549 จำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 56 ± 1.26 ชนิด รองลงมาคือบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* เท่ากับ 41 ± 1.26 , 38 ± 2.06 และ 33 ± 0.50 ชนิด ตามลำดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 70 (A)) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิดที่ทำการศึกษา ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) แสดงให้เห็นว่าหญ้าทะเลต่างชนิดกันมีจำนวนชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)

เดือนมีนาคม 2550 จำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 63 ± 1.15 ชนิด รองลงมาคือบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* เท่ากับ 46 ± 2.75 , 44 ± 1.91 และ 38 ± 1.26 ชนิด ตามลำดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 69 (B)) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิดของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิดที่ทำการศึกษา ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) จากนั้นทำการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Duncan's test พบว่าจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอมที่อยู่บนใบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ *Thalassia hemprichii* กับ *Cymodocea rotundata* ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 5)

เมื่อทำการเปรียบเทียบจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไคอะตอม ที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 และ เดือนมีนาคม 2550 พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีจำนวนชนิดเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนชนิดเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต



ชนิดหญ้าทะเล	จำนวนชนิดเฉลี่ย	
	ตุลาคม 2549	มีนาคม 2550
<i>Enhalus acoroides</i>	56±1.26	63±1.15
<i>Thalassia hemprichii</i>	38±2.06	44±1.91
<i>Cymodocea rotundata</i>	41±1.26	46±2.75
<i>Halophila ovalis</i>	33±0.50	38±1.26

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 ด้วยวิธีการ Duncan's test

ชนิดหญ้าทะเล	ตุลาคม 2549
<i>Enhalus acoroides</i>	56 ^a
<i>Thalassia hemprichii</i>	38 ^b
<i>Cymodocea rotundata</i>	41 ^c
<i>Halophila ovalis</i>	33 ^d

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550 ด้วยวิธีการ Duncan's test

ชนิดหญ้าทะเล	มีนาคม 2550
<i>Enhalus acoroides</i>	63 ^a
<i>Thalassia hemprichii</i>	44 ^b
<i>Cymodocea rotundata</i>	46 ^b
<i>Halophila ovalis</i>	38 ^c



ภาพที่ 69 จำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด

(A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550

อีพีไฟติกไดอะตอมที่พบในการศึกษารั้งนี้ ทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล โดยมีความหลากหลายชนิดสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* พบทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล รองลงมา คือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* พบทั้งสิ้น 63 ชนิด 34 สกุล และหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* พบทั้งสิ้น 58 ชนิด 32 สกุล ส่วนหญ้าทะเล *Halophila ovalis* มีความหลากหลายชนิดของอีพีไฟติกไดอะตอมต่ำที่สุด พบทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุล (ตารางภาคผนวก ก)

เดือนตุลาคม 2549 พบอีพีไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 37 ชนิด 21 สกุล บนใบหญ้าทะเลทุกชนิดที่ทำการศึกษา ได้แก่ *Cyclotella stylorum*, *Paralia sulcata*, *Actinocyclus* sp.1, *Actinocyclus* sp.2, *Actinocyclus senarius*, *Thalassionema nitzschioides*, *Grammatophora oceanica*, *Lyrella lyra*, *Mastogloia fimbriata*, *M. punctifera*, *M. rhombica*, *M. cf. crucicula*, *Mastogloia* sp.1, *Gomphonema* sp., *Achnanthes* sp., *Cocconeis pellucida*, *C. scutellum*, *Pinnularia* sp., *C. samoensis*, *Diploneis crabro*, *D. oblongella*, *D. suborbicularis*, *Frustulia rhomboids*, *Navicula avenacea*, *Navicula* sp.1, *Navicula* sp.2, *Trachyneis aspera*, *Pleurosigma angulatum*, *Pleurosigma* sp.1, *Pleurosigma* sp.2, *Amphora ovalis*, *Amphora* sp.1, *Nitzschia amphibian*, *Nitzschia* sp.1, *Nitzschia* sp.2, *Nitzschia* sp.3 และ *Surirella fastuosa*

เดือนมีนาคม 2550 พบอีพีไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 40 ชนิด 21 สกุล บนใบหญ้าทะเลทุกชนิดที่ทำการศึกษา ได้แก่ *Cyclotella stylorum*, *Paralia sulcata*, *Actinocyclus* sp.1, *Actinocyclus* sp.2, *Actinocyclus senarius*, *Actinocyclus* sp., *Thalassionema nitzschioides*, *Grammatophora oceanica*, *Lyrella lyra*, *Mastogloia fimbriata*, *M. punctifera*, *M. quinquecostata*, *M. rhombica*, *M. cf. crucicula*, *Gomphonema* sp., *Cocconeis pellucida*, *C. scutellum*, *Pinnularia* sp., *Caloneis alpestris*, *Diploneis crabro*, *D. fusca* var. *pervasta*, *D. oblongella*, *D. suborbicularis*, *Frustulia rhomboids*, *Navicula avenacea*, *Navicula* sp.1, *Navicula* sp.2, *Trachyneis aspera*, *Pleurosigma* sp.1, *Pleurosigma* sp.2, *Amphora ovalis*, *Amphora* sp.1, *Psammodictyon panduriforme*, *Nitzschia amphibian*, *Nitzschia* sp.1, *Nitzschia* sp.2, *Nitzschia* sp.3, *Nitzschia* sp.4, *Surirella fastuosa* และ *Surirella* sp.

ดังนั้นจากการศึกษาทั้ง 2 ครั้ง พบอีฟิฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุล บนใบหญ้าทะเลทุกชนิดที่ทำการศึกษา ได้แก่ *Cyclotella stlorum*, *Paralia sulcata*, *Actinocyclus* sp.1, *Actinocyclus* sp.2, *Actinoptychus senarius*, *Actinoptychus* sp., *Thalassionema nitzschioides*, *Grammatophora oceanica*, *Lyrella lyra*, *Mastogloia fimbriata*, *M. punctifera*, *M. quinquecostata*, *M. rhombica*, *M. cf. crucicula*, *Mastogloia* sp.1, *Gomphonema* sp., *Achnanthes* sp., *Cocconeis pellucida*, *C. scutellum*, *Pinnularia* sp., *Caloneis alpestris*, *C. samoensis*, *Diploneis crabro*, *D. fusca* var. *pervasta*, *D. oblongella*, *D. suborbicularis*, *Frustulia rhomboids*, *Navicula avenacea*, *Navicula* sp.1, *Navicula* sp.2, *Trachyneis aspera*, *Pleurosigma angulatum*, *Pleurosigma* sp.1, *Pleurosigma* sp.2, *Amphora ovalis*, *Amphora* sp.1, *Psammodictyon panduriforme*, *Nitzschia amphibian*, *Nitzschia* sp.1, *Nitzschia* sp.2, *Nitzschia* sp.3, *Nitzschia* sp.4, *Surirella fastuosa* และ *Surirella* sp.

อีฟิฟติกไดอะตอม 13 ชนิด 12 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata* ได้แก่ *Thalassiosira* sp., *Asterolampra marylandica*, *Biddulphia biddulphiana*, *Podocystis spathulata*, *Licmophora* sp., *Caloneis liber*, *Diploneis splendida*, *D. weissflogi*, *Plagiotropis pusilla*, *Amphora* sp.2, *Bacillaria paxillifer*, *Plagiodiscus* sp. และ *Campylodiscus* sp.

อีฟิฟติกไดอะตอม 1 ชนิด 1 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Thalassia hemprichii* ได้แก่ *Coscinodiscus radiatus*

อีฟิฟติกไดอะตอม 6 ชนิด 5 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata* ได้แก่ *Cymatosira lorenziana*, *Rhabdonema* sp., *Petroneis granulata*, *Amphora obtuse*, *A. ventricosa* และ *Campylodiscus innominatus*

อีฟิฟติกไดอะตอม 11 ชนิด 8 สกุล ที่พบเฉพาะบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่านั้น ได้แก่ *Actinocyclus* sp.3, *Triceratium favus*, *Lampriscus* sp., *Isthmia enervis*, *Ardissonea* sp., *Lyrella* sp., *Mastogloia recta*, *Mastogloia* sp.2, *Mastogloia* sp.3, *Navicula* sp.3 และ pennate diatom 1

ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล

อีพีไฟติกไดอะตอมที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เมื่อทำการตรวจนับเซลล์บนสไลด์นับ (sedgwick-Rafter counting slide) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงแบบใช้แสงธรรมดา ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากไม่สามารถกระทำในระยะกำลังขยายที่สูงมากได้ จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดโครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์ได้อย่างละเอียด อีกทั้งลักษณะเซลล์ของอีพีไฟติกไดอะตอมที่เป็นสกุลเดียวกัน เมื่อมองจากด้านเกอเดิลก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจำแนกชนิด ดังนั้นจึงทำการศึกษาความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

เดือนตุลาคม 2549 พบความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่ากับ $4,953 \pm 573.24$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* เท่ากับ $2,339 \pm 264.38$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* เท่ากับ $2,072 \pm 215.64$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* เท่ากับ $1,702 \pm 321.37$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 6 และภาพที่ 70 (A)) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด ที่ทำการศึกษานี้ ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) จากนั้นทำการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Duncan's test พบว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่อยู่บนใบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ *Thalassia hemprichii* กับ *Cymodocea rotundata* ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 7)

เดือนมีนาคม 2550 พบความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่ากับ $6,089 \pm 591.69$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* เท่ากับ $3,007 \pm 157.33$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* เท่ากับ $2,409 \pm 352.63$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* เท่ากับ $2,338 \pm 211.13$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 6 และภาพที่ 70 (B)) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด ที่ทำการศึกษานี้ ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) จากนั้นทำการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Duncan's test พบว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่อยู่บนใบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ *Thalassia hemprichii* กับ *Halophila ovalis* ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 8)

เมื่อทำการเปรียบเทียบความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอม ที่พบบนใบหญ้าทะเล ทั้ง 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 และ เดือนมีนาคม 2550 พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ หญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* ตามลำดับ

ตารางที่ 6 ความหนาแน่นเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบ บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต



ชนิดหญ้าทะเล	จำนวนชนิดเฉลี่ยอีพีไฟติกไดอะตอม	
	ตุลาคม 2549	มีนาคม 2550
<i>Enhalus acoroides</i>	4,953±573.24	6,089±591.69
<i>Thalassia hemprichii</i>	2,072±215.64	2,409±352.63
<i>Cymodocea rotundata</i>	2,339±264.38	3,007±157.33
<i>Halophila ovalis</i>	1,702±321.37	2,338±211.13

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบ บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 ด้วยวิธีการ Duncan's test

ชนิดหญ้าทะเล	ตุลาคม 2549
<i>Enhalus acoroides</i>	4,953 ^a
<i>Thalassia hemprichii</i>	2,072 ^b
<i>Cymodocea rotundata</i>	2,339 ^b
<i>Halophila ovalis</i>	1,702 ^c

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบ บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550 ด้วยวิธีการ Duncan's test


ชนิดหญ้าทะเล	ตุลาคม 2549
<i>Enhalus acoroides</i>	6,089 ^a
<i>Thalassia hemprichii</i>	2,409 ^b
<i>Cymodocea rotundata</i>	3,007 ^c
<i>Halophila ovalis</i>	2,338 ^b




ภาพที่ 70 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหอยน้ำทะเล 4 ชนิด

(A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550

จากการนำองค์ประกอบและความหนาแน่นของอีฟิฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบหลายตัวแปรด้วยวิธีคลัสเตอร์ (cluster analysis) ซึ่งแสดงผลการจัดกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบเดนโดรแกรม และวิธีอวกาศหลายมิติแบบ MDS (Multi-Dimensional scaling) พบว่าในเดือนตุลาคม 2549 ความคล้ายคลึงกันของอีฟิฟติกไคอะตอมที่ประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน กลุ่มที่ I คือ หญ้าทะเล *Enhalus acoroides* (Ea1-Ea4) กลุ่มที่ II คือ หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* (Th1-Th4) กลุ่มที่ III คือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* (Cr1-Cr4) และกลุ่มที่ IV คือ หญ้าทะเล *Halophila ovalis* (Ho1-Ho4) (ภาพที่ 71 และ 72) ส่วนเดือนมีนาคม 2550 ความคล้ายคลึงกันของอีฟิฟติกไคอะตอมที่ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตัวอย่าง เช่นเดียวกันกับในเดือนตุลาคม 2549 โดยตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน กลุ่มที่ I คือ หญ้าทะเล *Enhalus acoroides* (Ea1-Ea4) กลุ่มที่ II คือ หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* (Th1-Th4) กลุ่มที่ III คือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* (Cr1-Cr4) และกลุ่มที่ IV คือ หญ้าทะเล *Halophila ovalis* (Ho1-Ho4)




ภาพที่ 71 ภาพอวกาศ 2 มิติ จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี non-metric multidimensional scaling (MDS) ของอีฟิฟติกไคอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนตุลาคม 2549 บริเวณบ้านปากลอก จังหวัดภูเก็ต



ภาพที่ 72 เคนไดรแกรมความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างอีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนตุลาคม 2549 บริเวณบ้านปากลอก จังหวัดภูเก็ต



ภาพที่ 73 ภาพออไดเนชัน 2 มิติ จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี non-metric multidimensional scaling (MDS) ของอีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนมีนาคม 2550 บริเวณบ้านปากลอก จังหวัดภูเก็ต



ภาพที่ 74 เคนไดรแกรมความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างอีฟไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด
จำนวน 4 ซ้ำ ในเดือนมีนาคม 2550 บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต ทำการศึกษาโดยเริ่มจากสกุลที่มีร้อยละความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด สิ้นสุดถึงสกุลที่เมื่อรวมกันแล้ว ได้ความหนาแน่นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของความหนาแน่นเฉลี่ยทั้งหมด ดังนี้

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนตุลาคม 2549 ทั้งสิ้น 6 สกุล คือ *Amphora* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 603 ± 140.35 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Nitzschia* เท่ากับ 557 ± 107.22 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Navicula* เท่ากับ 406 ± 86.56 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Trachyneis* เท่ากับ 393 ± 45.66 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร สกุล *Lyrella* เท่ากับ 379 ± 108.07 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตรสกุล และสกุล *Cyclotella* เท่ากับ 308 ± 84.30 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลที่พบเด่นบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนตุลาคม 2549 ทั้งสิ้น 3 สกุล คือ *Nitzschia* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 443 ± 65.15 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Amphora* เท่ากับ 330 ± 62.20 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Navicula* เท่ากับ 301 ± 51.31 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนตุลาคม 2549 ทั้งสิ้น 4 สกุล คือ *Nitzschia* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 505 ± 52.74 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Trachyneis* เท่ากับ 335 ± 32.47 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Navicula* เท่ากับ 282 ± 90.26 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Amphora* เท่ากับ 205 ± 71.78 เซลล์ ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนตุลาคม 2549 ทั้งสิ้น 3 สกุล คือ *Nitzschia* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 523 ± 99.00 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Navicula* เท่ากับ 269 ± 75.45 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Amphora* เท่ากับ 208 ± 40.21 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งสิ้น 6 สกุล คือ *Nitzschia* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 704 ± 206.99 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Amphora* เท่ากับ 621 ± 89.63 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Navicula* เท่ากับ 586 ± 66.36 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Paralia* เท่ากับ 408 ± 51.65 เซลล์ต่อ ตารางเซนติเมตร สกุล *Trachyneis* เท่ากับ 397 ± 49.25 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Grammatophora* เท่ากับ 390 ± 91.55 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 10)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งสิ้น 4 สกุล คือ *Navicula* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 417 ± 56.93 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Amphora* เท่ากับ 361 ± 82.40 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Nitzschia* เท่ากับ 346 ± 45.85 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Trachyneis* เท่ากับ 312 ± 52.48 เซลล์ต่อ ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 10)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งสิ้น 5 สกุล คือ *Navicula* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 375 ± 96.53 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Amphora* เท่ากับ 375 ± 55.02 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Trachyneis* เท่ากับ 373 ± 48.51 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร สกุล *Nitzschia* เท่ากับ 336 ± 71.76 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร และสกุล *Lyrella* เท่ากับ 269.58 ± 40.30 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 10)

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งสิ้น 3 สกุล คือ *Nitzschia* มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 527 ± 70.80 เซลล์ต่อตาราง เซนติเมตร รองลงมาคือสกุล *Navicula* เท่ากับ 480 ± 61.01 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และสกุล *Amphora* เท่ากับ 292 ± 46.42 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 10)


ตารางที่ 9 ร้อยละความหนาแน่นเฉลี่ยของของอีฟไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล
4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549

ชนิดหญ้าทะเล	สกุลอีฟไฟติกไดอะตอม	ร้อยละความ หนาแน่นเฉลี่ย	ร้อยละความหนาแน่น เฉลี่ยสะสม
<i>E. acoroides</i>	<i>Amphora</i>	12.18	12.18
	<i>Nitzschia</i>	11.25	23.43
	<i>Navicula</i>	8.19	31.62
	<i>Trachyneis</i>	7.94	39.56
	<i>Lyrella</i>	7.65	47.21
	<i>Cyclotella</i>	6.22	53.43
<i>T. hemprichii</i>	<i>Nitzschia</i>	21.39	21.39
	<i>Amphora</i>	15.93	37.32
	<i>Navicula</i>	14.51	51.83
<i>C. rotundata</i>	<i>Nitzschia</i>	21.59	21.59
	<i>Trachyneis</i>	14.30	35.89
	<i>Navicula</i>	12.04	47.93
	<i>Amphora</i>	8.78	56.71
<i>H. ovalis</i>	<i>Nitzschia</i>	29.26	29.26
	<i>Navicula</i>	15.06	44.32
	<i>Amphora</i>	11.63	55.95


ตารางที่ 10 ร้อยละความหนาแน่นเฉลี่ยของของอู่ฟิฟติกโคอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล
4 ชนิด ในเดือนมีนาคม 2550

ชนิดหญ้าทะเล	สกุลอู่ฟิฟติกโคอะตอม	ร้อยละความ หนาแน่นเฉลี่ย	ร้อยละความหนาแน่น เฉลี่ยสะสม
<i>E. acoroides</i>	<i>Nitzschia</i>	11.57	11.57
	<i>Amphora</i>	10.20	21.77
	<i>Navicula</i>	9.63	31.40
	<i>Paralia</i>	6.69	38.09
	<i>Trachyneis</i>	6.53	44.62
	<i>Grammatophora</i>	6.40	51.02
<i>T. hemprichii</i>	<i>Navicula</i>	17.33	17.33
	<i>Amphora</i>	14.98	32.31
	<i>Nitzschia</i>	14.35	46.66
	<i>Trachyneis</i>	12.99	59.65
<i>C. rotundata</i>	<i>Navicula</i>	12.48	12.48
	<i>Amphora</i>	12.46	24.94
	<i>Trachyneis</i>	12.39	37.33
	<i>Nitzschia</i>	11.18	48.51
	<i>Lyrella</i>	8.97	57.48
<i>H. ovalis</i>	<i>Nitzschia</i>	22.52	22.52
	<i>Navicula</i>	20.51	43.03
	<i>Amphora</i>	12.48	55.51

จากการเปรียบเทียบการศึกษาในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 พบว่ามีอู่ฟิฟติกโคอะตอมทั้งสิ้น 3 สกุล ที่พบเด่นบนใบหญ้าทะเลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ สกุล *Navicula* (ภาพที่ 75) *Amphora* (ภาพที่ 76) *Nitzschia* (ภาพที่ 77)





(A)



(B)

ภาพที่ 75 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีฟิไฟดิกไดอะตอมสกุล *Navicula* บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด


(A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550



(B)

ภาพที่ 76 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีฟิไฟดิกไดอะตอมสกุล *Amphora* บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด


(A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550



ภาพที่ 77 ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล *Nitzschia* บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด
(A) = เดือนตุลาคม 2549 และ (B) = เดือนมีนาคม 2550

พื้นที่ของใบหญ้าทะเล

พื้นที่ของใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* ที่ทำการเก็บตัวอย่างบริเวณ บ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ พบว่าพื้นที่ต่อใบของหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 86.47 ± 9.15 ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* เท่ากับ 14.83 ± 1.05 ตารางเซนติเมตร หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* เท่ากับ 10.16 ± 2.06 ตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* เท่ากับ 3.25 ± 0.28 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (ภาพที่ 78)



ภาพที่ 78 พื้นที่ต่อใบของหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

วิจารณ์

ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* บริเวณบ้านปากลอก จังหวัดภูเก็ต ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 พบทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล โดยความหลากหลายที่พบในการศึกษานี้ มีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ Mississippi Sound ประเทศสหรัฐอเมริกา พบทั้งสิ้น 45 ชนิด (Sullivan, 1979) และมีค่าใกล้เคียงกับแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบทั้งสิ้น 81 ชนิด (Sullivan, 1982) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ Roscoff ประเทศฝรั่งเศส พบว่ามีค่าค่อนข้างต่ำมาก เนื่องจากบริเวณนี้พบอีพีไฟติกไดอะตอมมากถึง 199 ชนิด (Jacobs and Noten, 1980) อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะการมีเทคนิคการเก็บตัวอย่างจำนวนจำกัด สถานที่ รวมถึงชนิดของหญ้าทะเลที่ศึกษาแตกต่างกัน

อีพีไฟติกไดอะตอมสกุล *Mastogloia* มีความหลากหลายสูงสุด พบทั้งสิ้น 9 ชนิด รองลงมาคือ *Diploneis* พบทั้งสิ้น 6 ชนิด และสกุล *Amphora* กับ *Nitzschia* พบทั้งสิ้น 5 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sullivan (1980) ที่ทำการศึกษาอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Thalassia testudium* บริเวณท่าเรือ Bimini ประเทศ Bahamas พบอีพีไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 83 ชนิด 25 สกุล โดยพบว่าอีพีไฟติกไดอะตอมสกุล *Mastogloia* มีความหลากหลายสูงสุด พบทั้งสิ้น 18 ชนิด และสกุลที่มีความหลากหลายรองลงมาคือสกุล *Amphora* พบทั้งสิ้น 6 ชนิด และสกุล *Nitzschia* กับ *Navicula* มีความหลากหลายเท่ากัน พบทั้งสิ้น 4 ชนิด และพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Jacobs and Noten (1980) ที่ทำการศึกษาอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Zostera marina* บริเวณ Roscoff ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจากการศึกษาพบอีพีไฟติกไดอะตอมมากถึง 199 ชนิด 48 สกุล และพบว่าสกุล *Nitzschia* มีความหลากหลายสูง พบทั้งสิ้น 21 ชนิด รองจากสกุล *Navicula* ซึ่งพบทั้งสิ้น 27 ชนิด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Sullivan (1982) ที่ทำการศึกษาอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Thalassia testudium* บริเวณอ่าวฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบอีพีไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 81 ชนิด 22 สกุล โดยพบว่าสกุล *Mastogloia* มีความหลากหลายสูงสุด พบทั้งสิ้น 11 ชนิด และสกุลที่มีความหลากหลายรองลงมาคือสกุล *Amphora* กับ *Nitzschia* พบทั้งสิ้น 6 ชนิด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Corlett and Jones (2006) ที่ทำการศึกษาอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล *Thalassia testudium* บริเวณ Grand

Cayman ประเทศอังกฤษ พบอีฟิไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 61 ชนิด 16 โดยสกุล *Mastogloia* เป็นสกุลที่มีความหลากหลายชนิดสูงสุด พบทั้งสิ้น 22 ชนิด รองลงมาคือสกุล *Amphora* พบทั้งสิ้น 8 ชนิด

การศึกษานี้พบอีฟิไฟติกไดอะตอม ที่เป็นชนิดเดียวกับการศึกษาของ Sullivan (1979, 1980 และ 1982) ที่ทำการศึกษานบนใบหญ้าทะเล *Halodule beaudettei*, *Cymodocea filiformis*, *Thalassia testudinum* และ *Syringodium filiforme* ทั้งสิ้น 18 ชนิด 11 สกุล และการศึกษาของ Jacobs and Noten (1980) ที่ทำการศึกษานบนใบหญ้าทะเล *Zostera marina* ทั้งสิ้น 14 ชนิด 13 สกุล นอกจากนี้ยังพบว่า เป็นชนิดเดียวกันกับที่มีในรายงานการศึกษานบนพื้นผิวปะการังเทียม ของ อรรถนัย (2545) ทั้งสิ้น 28 ชนิด 20 สกุล (ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบชนิดของอีฟิไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษานครั้งนี้ กับการศึกษาที่ผ่านมา

ชนิดอีฟิไฟติกไดอะตอม ที่พบในการศึกษานครั้งนี้	<i>Halodule beaudettei</i> ¹	<i>Cymodocea filiformis</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ²	<i>Zostera marina</i> ³	<i>Thalassia testudinum</i> ⁴	<i>Syringodium filiforme</i> ⁴	พื้นผิวปะการังเทียม
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
<i>Coscinodiscus radiatus</i> Ehrenberg	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<i>Actinopteryx senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Triceratium favus</i> Ehrenberg	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Isthmia enervis</i> Erenberg	-	-	-	-	✓	-	-	-
<i>Cymatosira lorenziana</i> Grunow	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	-	-	-	-	✓	-	-	✓

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ชนิดอีฟไฟติกไดอะตอม ที่พบในการศึกษาครั้งนี้	<i>Halodule beaudettei</i> ¹	<i>Cymodocea filiformis</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ²	<i>Zostera marina</i> ³	<i>Thalassia testudinum</i> ⁴	<i>Syringodium filiforme</i> ⁴	พันธุ์ปะการังเทียม
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg)	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Grunow								
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Petroneis granulata</i> (Bailey) Mann.	-	-	-	-	-	-	-	✓
Comb. Nov								
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<i>M. punctifera</i> Brun	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
<i>M. quinquecostata</i> Grunow	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. recta</i> Hustedt	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. rhombica</i> Cleve	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	-	-	-	✓	-	-	-	-
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<i>C. samoensis</i> (Grunow) Cleve	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	-	-	-	-	-	✓	-	-
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey)	-	-	-	-	-	-	-	✓
Brébisson								
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W.	-	-	-	✓	-	-	-	-
Smith								

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ชนิดอีพีไฟติกไดอะตอม ที่พบในการศึกษาครั้งนี้	<i>Halodule beaudettei</i> ¹	<i>Cymodocea filiformis</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ¹	<i>Thalassia testudinum</i> ²	<i>Zostera marina</i> ³	<i>Thalassia testudinum</i> ⁴	<i>Syringodium filiforme</i> ⁴	พันธุ์ปะการังเทียม
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Amphora obtusa</i> Gregory	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>A. ovalis</i> Kützting	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
<i>A. ventricosa</i> Gregory	-	-	-	-	-	-	-	✓
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützting	-	-	-	✓	-	-	-	✓
<i>Campylodiscus innominatus</i> Ross & Abdin	-	-	-	-	-	-	-	✓

หมายเหตุ 1 = Sullivan (1979) ทำการศึกษาวบริเวณ Mississippi sound ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 = Sullivan (1980) ทำการศึกษาวบริเวณ ป่าชายเลน ในเขตท่าเรือ Bimini ประเทศ Bahamas

3 = Jacobs and Noten (1980) ทำการศึกษาวบริเวณ Roscoff ประเทศฝรั่งเศส

4 = Sullivan (1982) ทำการศึกษาวบริเวณอ่าวฟลอริดา

5 = อรรถนิตย์ (2545) ทำการศึกษาวบริเวณอ่าวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

หญาทะเล *Halophila ovalis* มีความหลากหลายชนิดของอีพีไฟติกไดอะตอมต่ำกว่าหญาทะเลชนิดอื่น พบทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุล และอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบอยู่บนใบหญาทะเล *Halophila ovalis* ทุกชนิดนั้น ก็ยังพบอยู่บนใบหญาทะเลชนิดอื่นที่ทำการศึกษารวมกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของหญาทะเลแล้ว พบว่าหญาทะเล *Halophila ovalis* เป็นหญาทะเลที่มีขนาดเล็ก ใบรูปไข่เจริญเติบโตปกคลุมผิวหน้าดิน แตกต่างจากหญาทะเล *Enhalus acoroides* ซึ่งมีใบยาวใหญ่เกิดขึ้นเป็นกอจากเหง้าที่มีความสูงจากพื้นดินมาก และหญาทะเล *Thalassia hemprichii* กับ *Cymodocea rotundata* ซึ่งเป็นหญาทะเลที่มีขนาดกลาง ใบเป็นแถบยาว ขนาดของใบใกล้เคียงกัน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญาทะเล *Halophila ovalis* นั้นจะเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในตะกอนดินบริเวณที่ทำการศึกษา เพราะเนื่องจากหญาทะเลชนิดนี้เจริญเติบโตปกคลุมผิวหน้าดิน และจากการเก็บตัวอย่างขณะน้ำลง ก็พบว่าการสะสมของตะกอนที่บริเวณผิวใบของหญาทะเลชนิดนี้มาก และจากการที่หญาทะเลชนิดอื่นก็พบอีพีไฟติกไดอะตอมชนิดเดียวกันกับที่พบบนใบหญาทะเล *Halophila ovalis* นั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าขณะที่น้ำขึ้น-ลง ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนดิน เป็นเหตุให้เบนธิกไดอะตอมที่อยู่ในตะกอนดินมีโอกาสดำรงที่ขึ้นสู่ผิวน้ำ และลงเกาะเจริญเติบโตเป็นอีพีไฟต์บนใบหญาทะเล ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุนได้ว่า อีพีไฟติกไดอะตอม ทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุลนี้ น่าจะเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในแหล่งหญาทะเล บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีอีพีไฟติกไดอะตอมจำนวน 11 ชนิด 8 สกุล ที่พบอยู่บนใบหญาทะเล *Enhalus acoroides* เท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชนิดที่เคยมีรายงานว่าเป็นกลุ่มยึดเกาะ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ *Triceratium favus*, *Isthmia enervis*, *Mastogloia recta* (นิรุชา, 2547; อรรถนิษฐ์, 2545) ส่วนชนิดที่เหลือจำแนกได้เพียงระดับสกุลเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถทำการเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นได้

จากการนำค่าความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญาทะเลทั้ง 4 ชนิด มาทำการทดสอบทางสถิติ โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอม ผลจากการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติของค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญาทะเลแต่ละชนิด แสดงว่าหญาทะเลต่างชนิดกันส่งผลต่อความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่อาศัยอยู่ โดยหญาทะเลที่มีขนาดใบใหญ่ จะมีความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่อาศัยอยู่บนใบมากกว่าหญาทะเลที่มีขนาดใบเล็ก ซึ่งการศึกษารั้งนี้ พบว่าหญาทะเล *Enhalus acoroides* มีความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมสูงที่สุด เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ใบมากกว่าหญาทะเลชนิดอื่น เท่ากับ 86.47 ± 9.15 ตารางเซนติเมตร และหญาทะเล *Halophila ovalis* มีความหนาแน่นของ

อีพีไฟติกไดอะตอมต่ำที่สุด เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ใบน้อยกว่าหญ้าทะเลชนิดอื่น เท่ากับ 3.25 ± 0.28 ตารางเซนติเมตร โดยที่หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* กับ *Cymodocea rotundata* นั้นพบว่ามีความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมใกล้เคียงกัน เนื่องจากใบหญ้าทะเลทั้ง 2 ชนิดนี้มีขนาดพื้นที่ใบใกล้เคียงกัน โดยหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* มีพื้นที่ขนาดพื้นที่ใบเท่ากับ 14.83 ± 1.05 ตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* มีพื้นที่ขนาดพื้นที่ใบเท่ากับ 10.16 ± 2.06 ตารางเซนติเมตร โดยพบความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้า *Cymodocea rotundata* มากกว่า *Thalassia hemprichii* ซึ่งสอดคล้องกับ Hemminga and Carlos (2000) ที่รายงานว่า ถึงแม้หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* จะมีปริมาณผลผลิตเบื้องต้นต่ำกว่าหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ซึ่งมีค่า 1.28 และ 1.67-2.78 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลำดับ แต่ก็ยังพบว่าปริมาณผลผลิตเบื้องต้นของอีพีไฟต์บนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* สูงกว่าบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.79 และ 0.38-1.64 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลำดับ

Hemminga and Carlos (2000) รายงานว่า ช่วงอายุของใบ และต้นหญ้าทะเล (life span) ส่งผลต่อปริมาณของอีพีไฟต์ที่อาศัยอยู่บนใบหญ้าทะเล โดยหญ้าทะเลที่มีอายุมาก จะมีปริมาณของอีพีไฟต์ที่อาศัยอยู่บนใบมากกว่าหญ้าทะเลที่มีช่วงอายุน้อย ดังการศึกษาของ Brauner (1975) ที่พบว่าสาหร่ายที่เป็นอีพีไฟต์บนใบหญ้าทะเล *Zostera marina* จะมีปริมาณน้อยกว่าบนใบหญ้าทะเล *Posidonia* sp. และ *Amphibolis* sp. เนื่องจากหญ้าทะเล *Zostera marina* มีช่วงอายุใบสั้นกว่าหญ้าทะเล *Posidonia* sp. และหญ้าทะเล *Amphibolis* sp. ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่าหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีความหนาแน่นของอีพีไฟติกมากกว่าใบหญ้าทะเลชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีช่วงอายุใบสูงสุด (72 วัน) และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* มีความหนาแน่นของอีพีไฟต์น้อยกว่าใบหญ้าทะเลชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีช่วงอายุใบน้อยสุด (11-42 วัน) ดังนั้นหญ้าทะเลที่มีช่วงอายุของใบมาก ทำให้ระยะเวลาที่อีพีไฟติกไดอะตอมจะมีโอกาสเข้ามายึดเกาะและเพิ่มจำนวนก็จะมากกว่าหญ้าทะเลที่มีช่วงอายุใบน้อย (Johntone, 1979; Heijis, 1984; Heijis, 1985; Brouns, 1985; Hillman, 1989; Borwitzka and Lethbridge, 1989)

นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับสารยับยั้งการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณผิวใบหญ้าทะเล ซึ่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งสร้างสารหลายชนิด (Zapata and Mcmillan, 1979; Ferrat *et al.*, 2001) โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอล ซึ่งเป็นสารที่มีผลในการยับยั้งการลงเกาะของอีพีไฟต์ แบคทีเรีย และเชื้อรา (พันธุ์ทิพย์ และคณะ, 2545; Harrison and Chan, 1980; Bernard and Pesando, 1989; Jensen, *et al.*,

1998) โดยเยวลักษณะ (2551) ทำการศึกษาความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลที่มีผลต่อความหนาแน่นของไส้เดือนตัวกลมทะเล พบว่าหญ้าทะเล *Halophila ovalis* มีสารประกอบฟีนอลที่อยู่ในส่วนของลำต้นเหนือดิน และลำต้นใต้ดินมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* และ *Halodule uninervis* หลังจากนั้นได้ทำการทดลองหาความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชาคมไส้เดือนทะเล พบว่าสารประกอบฟีนอลจากหญ้าทะเลทั้ง 3 ชนิดนี้ ไม่มีผลต่อโครงสร้างของประชาคมไส้เดือนตัวกลมทะเล แต่หลังจาก 1 วัน ขณะดำเนินการทดลอง พบว่าสารประกอบฟีนอลจากหญ้าทะเลชนิด *Halophila ovalis* ทำให้ความหนาแน่นของไส้เดือนตัวกลมมีค่าลดลง ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ก็พบว่าหญ้าทะเล *Halophila ovalis* มีค่าความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าทะเลชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวกับการที่หญ้าทะเลชนิดนี้มีการผลิตสารฟีนอลในปริมาณที่มาก ทำให้มีผลในการยับยั้งการลงเกาะของอีพีไฟติกไคอะตอม

การศึกษานี้ทำการเก็บตัวอย่างในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน คือในเดือนตุลาคม 2549 (ปลายฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2550 (ฤดูแล้ง) ซึ่งฤดูกาลน่าจะส่งผลต่อปัจจัยในเรื่องของความขุ่นและความสามารถในการส่องผ่านของแสงในน้ำ โดยในฤดูฝนความขุ่นของน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อความขุ่นมากก็จะมีส่วนในการขัดขวาง หรือลดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของอีพีไฟติกไคอะตอม ทำให้ผลผลิตมีค่าลดลง (มันสิน, 2540) ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ก็พบว่า ค่าความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน มากกว่าเดือนตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม Jacob and Noten (1980) รายงานว่า การผันแปรของฤดูกาลจะมีผลต่อลักษณะโครงสร้างของประชาคมของอีพีไฟติกไคอะตอมในช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น นอกจากนี้ Heijis (1984, 1985) กล่าวว่า การผันแปรของมวลชีวภาพของอีพีไฟต์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางชีวภาพ อันได้แก่ ผู้ล่า อายุของหญ้าทะเล และการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ และความเค็ม ที่บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคอก จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความผันแปรรอบปีไม่มากนัก จูติมา และเนตรดาว (2548) จึงไม่น่าจะส่งผลต่อปริมาณของอีพีไฟติกไคอะตอมที่พบ

จากการนำองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของอีพีไฟติกไคอะตอมมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้หลายตัวแปร แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างประชาคมของอีพีไฟติกไคอะตอมมีความแตกต่างกันไปตามใบหญ้าทะเลแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ โดยพบว่าโครงสร้างประชาคมของ

อีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างประชาคมของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* มากที่สุด เนื่องจากหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata* มีรูปร่างและขนาดของพื้นที่ใบใกล้เคียงกัน เท่ากับ 14.83 ± 1.05 และ 10.16 ± 2.06 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ความหลากหลายชนิดและความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบก็มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนโครงสร้างประชาคมของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Halophila ovalis* นั้นมีความคล้ายคลึงกันน้อยที่สุด เนื่องจากหญ้าทะเลทั้ง 2 ชนิดนี้มีรูปร่างใบที่แตกต่างกัน หญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ใบมีขนาดใหญ่และยาว ส่วนหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ใบมีขนาดเล็ก รูปไข่ ขนาดของพื้นที่ใบของหญ้าทะเล 2 ชนิดนี้ก็มีความแตกต่างกันมาก หญ้าทะเล *Enhalus acoroides* มีขนาดพื้นที่ใบเท่ากับ 6.47 ± 9.15 ตารางเซนติเมตร ส่วนหญ้าทะเล *Halophila ovalis* มีขนาดพื้นที่ใบเท่ากับ 3.25 ± 0.28 ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ความหลากหลายชนิดและความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ก็มีค่าสูงกว่า *Halophila ovalis* มากอีกด้วย ดังนั้นจากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า อีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล มีลักษณะโครงสร้างประชาคมที่ชัดเจน แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของหญ้าทะเลที่อาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Lewis (1984) ที่รายงานว่า รูปร่างลักษณะของชนิดหญ้าทะเลที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความซับซ้อน (complexity) ในระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งน่าจะมีส่วนมาจากลักษณะโครงสร้างของใบ ที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนี้โครงสร้างที่ซับซ้อนที่เกิดจากราก ไรโซม และใบ ของหญ้าทะเล ยังทำให้เกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอีกด้วย (Heck and Welstone, 1977) หรือในทางกลับกันอาจเป็นเพราะอีพีไฟติกไดอะตอมมีความเฉพาะเจาะจงในการที่จะเลือกเข้ามาอยู่อาศัยบนใบหญ้าทะเลแต่ละชนิดก็เป็นไปได้

การศึกษานี้มีอีพีไฟติกไดอะตอม 3 สกุล ที่พบเด่นบนใบหญ้าทะเลทุกชนิดได้แก่ *Navicula*, *Amphora* และ *Nitzschia*

สกุล *Navicula* ปกติแล้วจะพบว่าการดำรงชีพแบบเกาะติด (bentric diatom) เป็นส่วนใหญ่ เป็นไดอะตอมที่มีการพัฒนาของผนังเซลล์ได้ดีมาก และมีความสามารถในการยึดเกาะกับ substratum ได้ดี โดยจะมีการสร้างเมือกหนาเคลือบที่ผนังเซลล์เพื่อใช้ในการยึดเกาะ หรือฝังตัวอยู่ในสารเมือกที่แผ่เป็นแผ่น และที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงก็มักพบไดอะตอมสกุลนี้ (Smith, 1951) นอกจากนี้ไดอะตอม *Navicula* ยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้ดี เช่นเดียวกัน

ไคอะตอมสกุล *Nitzschia* และยังพบแพร่กระจายได้กว้างขวางในหลายสภาพที่อยู่อาศัย สามารถพบอาศัยอยู่ได้ทั้ง ในดิน และในที่ชื้นแฉะ เป็นไคอะตอมกลุ่มที่มีราฟี (raphe) ดังนั้นเมื่อใดที่พบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมมีความแห้งแล้ง ไคอะตอมสกุลนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ไปยังแหล่งใหม่ที่ลึกและมีความชื้นกว่าเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ (Patrick and Reimer, 1966; Patrick, 1977; Barber and Harworth, 1981; Round *et al.*, 1990)

สกุล *Amphora* พบว่าเป็นอีฟิไฟติกสกุลที่พบเด่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sullivan (1980) ที่ทำการศึกษาน้ำพุไฟติกไคอะตอม ที่อาศัยอยู่บริเวณรากของต้นโกงกาง *Rhizophora mangle* ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอีฟิไฟติกไคอะตอมสกุล *Amphora* เป็นชนิดเด่นที่สุด รองลงมาคือ *Nitzschia* และ *Cocconeis* ตามลำดับ

สกุล *Nitzschia* พบว่าเป็นอีฟิไฟติกสกุลที่พบเด่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sullivan (1980) ที่ทำการศึกษาน้ำพุไฟติกไคอะตอมที่อาศัยอยู่บริเวณส่วน pneumatophores ของต้นแสม *Avicennia germinans* ที่พบว่ามีอีฟิไฟติกไคอะตอมสกุล *Nitzschia* เป็นชนิดเด่นรองจากสกุล *Mastogloia* เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าไคอะตอมสกุลนี้มีคุณสมบัติในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ดี และสามารถทนความเค็มได้ในช่วงกว้าง (นิภาภรณ์, 2537) และจากการศึกษาของ พันธุ์ทิพย์ และคณะ (2545) ยังพบว่าไคอะตอมสกุล *Nitzschia* มีคุณสมบัติทนทานต่อสารสกัดที่หญาทะเลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการยับยั้งการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตได้ดีที่สุด จึงน่าเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้พบไคอะตอมกลุ่มนี้เด่นบนใบหญาทะเลทุกชนิด และเนื่องจากไคอะตอมสกุลนี้มีขนาดเล็ก สามารถเพิ่มปริมาณได้รวดเร็ว และเป็นไคอะตอมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถสร้างวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินเอได้มาก (Round, 1973) จึงมีประโยชน์ในการเป็นอาหารของพวกอีฟิฟานา (epifauna) ที่เกาะอาศัยอยู่ตามใบหญาทะเล สัตว์น้ำวัยอ่อน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งหญาทะเล (Paszkwycz and Ryszard, 2002; Mukai and Kasim, 2006) เนื่องจากไคอะตอม *Nitzschia* มีคุณค่าทางอาหารสูง และปัจจุบันยังมีการนำไคอะตอมสกุลนี้มาเพาะเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนจำนวนมาก (จิรารัตน์ และคณะ, 2547; อมรรรัตน์ ชมรุ่ง, 2543; Brown *et al.*, 1997)

สรุป

1. การจำแนกชนิดของอีพีไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata* และ *Halophila ovalis* บริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดภูเก็ต ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 พบอีพีไฟติกไดอะตอมทั้งสิ้น 75 ชนิด 39 สกุล
2. อีพีไฟติกไดอะตอมสกุล *Mastogloia* มีความหลากหลายชนิดสูงที่สุด พบ 9 ชนิด รองลงมาคือสกุล *Diploneis* พบ 6 ชนิด และสกุล *Amphora* กับ *Nitzschia* พบ 5 ชนิด
3. จำนวนชนิดเฉลี่ยของอีพีไฟติกไดอะตอม ในเดือนตุลาคม 2549 พบมีค่าสูงสุดบนใบหญ้า *Enhalus acoroides* เท่ากับ 56 ± 1.26 ชนิดต่อพื้นที่ 1 ตร.ซม. รองลงมาคือหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* มีค่าเท่ากับ 41 ± 1.26 , 38 ± 2.06 และ 33 ± 0.50 ชนิดต่อพื้นที่ 1 ตร.ซม. ตามลำดับ ในเดือนมีนาคม 2550 พบมีค่าสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่ากับ 63 ± 1.15 ชนิด รองลงมาคือหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* และ *Halophila ovalis* มีค่าเท่ากับ 46 ± 2.75 , 44 ± 1.196 และ 38 ± 1.26 ชนิดตามลำดับ
4. อีพีไฟติกไดอะตอมที่พบอยู่บนใบหญ้าทะเล 4 ชนิดทั้งสิ้น 44 ชนิด 22 สกุล ได้แก่ *Cyclotella stylum*, *Paralia sulcata*, *Actinocyclus* sp.1, *Actinocyclus* sp.2, *Actinoptychus senarius*, *Actinoptychus* sp., *Thalassionema nitzschioides*, *Grammatophora oceanica*, *Lyrella lyra*, *Mastogloia fimbriata*, *M. punctifera*, *M. quinquecostata*, *M. rhombica*, *M. cf. crucicula*, *Mastogloia* sp.1, *Gomphonema* sp., *Achnanthes* sp., *Cocconeis pellucida*, *C. scutellum*, *Pinnularia* sp., *Caloneis alpestris*, *C. samoensis*, *Diploneis crabro*, *D. fusca* var. *pervasta*, *D. oblongella*, *D. suborbicularis*, *Frustulia rhomboids*, *Navicula avenacea*, *Navicula* sp.1, *Navicula* sp.2, *Trachyneis aspera*, *Pleurosigma angulatum*, *Pleurosigma* sp.1, *Pleurosigma* sp.2, *Amphora ovalis*, *Amphora* sp.1, *Psammodictyon panduriforme*, *Nitzschia amphibian*, *Nitzschia* sp.1, *Nitzschia* sp.2, *Nitzschia* sp.3, *Nitzschia* sp.4, *Surirella fastuosa* และ *Surirella* sp.

5. อีฟิไฟติกไคอะตอม 13 ชนิด 12 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* และ *Cymodocea rotundata* ได้แก่ *Thalassiosira* sp., *Asterolampra marylandica*, *Biddulphia biddulphiana*, *Podocystis spathulata*, *Licmophora* sp., *Caloneis liber*, *Diploneis splendida* D. weissflogi, *Plagiotropis pusilla*, *Amphora* sp.2, *Bacillaria paxillifer*, *Plagiodiscus* sp. และ *Campylodiscus* sp.

6. อีฟิไฟติกไคอะตอม 1 ชนิด 1 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Thalassia hemprichii* ได้แก่ *Coscinodiscus radiatus*

7. อีฟิไฟติกไคอะตอม 6 ชนิด 5 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* และ *Cymodocea rotundata* ได้แก่ *Cymatosira lorenziana*, *Rhabdonema* sp., *Petroneis granulata*, *Amphora obtuse*, *A. ventricosa* และ *Campylodiscus innominatus*

8. อีฟิไฟติกไคอะตอม 11 ชนิด 8 สกุล ที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่านั้น ได้แก่ *Actinocyclus* sp.3, *Triceratium fавus*, *Lampriscus* sp. *Isthmia enervis*, *Ardissonea* sp., *Lyrella* sp., *Mastogloia recta*, *Mastogloia* sp.2, *Mastogloia* sp.3, *Navicula* sp.3 และ pennate diatom 1

9. ความหนาแน่นเฉลี่ยของอีฟิไฟติกไคอะตอม ในเดือนตุลาคม 2549 พบมีค่าสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่ากับ $4,953 \pm 573.24$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* เท่ากับ $2,339 \pm 264.38$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* เท่ากับ $2,072 \pm 321.37$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* เท่ากับ $1,702 \pm 321.37$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนเดือนมีนาคม 2550 พบว่าค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของอีฟิไฟติกไคอะตอมมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับเดือนตุลาคม 2549 คือ มีค่าสูงสุดบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* เท่ากับ $6,089 \pm 591.69$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ หญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* เท่ากับ $3,007 \pm 157.33$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร หญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* เท่ากับ $2,409 \pm 352.63$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร และหญ้าทะเล *Halophila ovalis* เท่ากับ $2,338 \pm 211.13$ เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

10. อีฟิไฟติกไดอะตอมสกุลเด่นที่พบบนใบหญ้าทะเล 4 ชนิด ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือนมีนาคม 2550 ได้แก่ *Navicula*, *Amphora* และ *Nitzschia*



เอกสารและสิ่งอ้างอิง

- จิตติมา อายุตะทะกะ. 2544. การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นท้องทะเล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ซัซรี สุพันธุ์วิช. 2537. ประชาคมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบนใบหญ้าทะเล *Enhalas acoroides* (Linnacus f.) Royle บริเวณแหลมหยงหล้า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ซัซรี แก้วสุริยิต. 2549. เอกสารคำสอนวิชาสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาหญ้าทะเล. ภาควิชาชีววิทยาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จิตติมา นิยมศิลป์ชัย และ เนตรดาว สองหลง. 2548. ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณแนวหญ้าทะเล ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต. ปัญหาพิเศษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง.
- ธิดารัตน์ น้อยรักษา, จารุพันธ์ ประทุมยศ, ชลทิพย์ ถนอมพันธุ์ และ ภากร วิรุฬประภา. 2547. ผลของความเค็ม ความเป็นกรด-เบส และระยะเวลาการให้แสงสว่าง ต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางอาหารของไดอะตอมน้ำเค็ม *Nitzschia* cf. *ovalis* BIMAPP0004. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (section T), 3(1): 227-236
- นิภากรณ โชติญาณวงษ์. 2537. ชีววิทยาและโครงสร้างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของไดอะตอม *Nitzschia* sp.. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- นิรุชา มงคลแสงสุริย์. 2547. ความหลากหลายของชนิดและมวลของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์, สุนันท์ ภัทรจินดา และ จิตติมา อายุตตะกะ. 2545. การคัดเลือกสารสกัดจากหย้าทะเลที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มันสิน ตันทุลเวศม์. 2540. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ๑.

ลัดดา วงศ์รัตน์. 2544. แพลงก์ตอนพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2549. หย้าทะเลในน่านน้ำไทย. บริษัท ลิ้มมาร์ค แอ็คเวอร์ไทซิง จำกัด, กรุงเทพฯ.

ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้. 2543. การสำรวจหย้าทะเล. ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล, กรุงเทพฯ.

สมบัติ ภูวชิรานนท์, จุฑารัตน์ วงษ์เทวัญ, ชัยมงคล เข้มอรุณพัฒนา และ อรุมา จริงเกียรติจิร. 2548. สถานภาพทรัพยากรแหล่งหย้าทะเลในอ่าวพังงาเล่ม 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.

สมบัติ ภูวชิรานนท์, กาญจนา อุดุลยานุโกศล, ภูธร แซ่หลิม, อติสร เจริญวัฒนาพร, ชัยมงคล เข้มอรุณพัฒนา และ จันทร์เพ็ญ วุฒิวรวงศ์. 2549. หย้าทะเลในน่านน้ำไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.

สมหมาย เจนกิจการ. 2538. นิเวศวิทยาของปลาในแนวหน้าหย้าทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุวลักษณ์ นทีกาญจนลาภ. 2534. หย้าทะเล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ ชมรุ่ง. 2543. คุณค่าทางอาหารของไดอะตอม 2 ชนิด เพื่อเป็นอาหารของลูกหอยเป่าอี้อ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยบูรพา

อรรชนี ชำนาญศิลป์. 2545. การจำแนกชนิดไดอะตอมที่พบบนพื้นผิวปะการังเทียม บริเวณอ่าว
ขาม เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลำแสงส่องกราด
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เกสร เทียรพิสุทธิ์. 2549. ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนไดอะตอมทะเลบริเวณหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เขวลักษณ์ มั่นธรรม. 2551. นิเวศวิทยาใต้ดินตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระในแหล่งหญ้าทะเล อ่าว
ท่าเลน จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Allen, W.E. and E. E. Cupp. 1935. **Plankton Diatom of The Java Sea.** Cambridge university
press, England.

Bell, J. D., J. J. Burchmore and D. A. Pollard. 1978. Feeding ecology of three sympatric species of
leatherjackets (Pisces: Monacanthidae) from *Posidonia* seagrass habitat in New South
Wales. Cited by M. A. Borowitzka and R. C. Lethbridge. **Seagrass Epiphytes**, pp. 458-
499. In A. D. W. Larkum, A. J. McComb and S. A. Shepherd. *Biology of Seagrasses*.
Elsevier, Oxford.

Barber, H.G. and E.Y. Harworth. 1981. **A guide to the morphology of the diatom frustule.**
Freshwater Biological Association, Scientist Publication.

Bernard P. and Pesanda. 1989. Antibacterial and antifungal activity of extracts from the
rhizomes of the Mediterranean seagrass *Posidonia oceanica* (L.) Delile. **Bot. mar.** 32:
85-88.

- Bérard–Therriault, L., M. Poulin and L. Bossé. 1999. **D' Identification du Phytoplankton Marin de l' Estuaire et du Golfed u Saint – Laurent**. Les presses scientifiques du CNRC, Ottwa.
- Borwitzka, M.A. and R.C. Lethbridge. 1989. Seagress epiphytes, pp. 458-499. *In* A.D.W. Larkum, A.J. Mccomb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of Seagrass**. Elsevier, Oxford.
- Brauner, F. 1975. The seasonality of epiphytic algae on *Zostera marina* at Beaufort, North Carolina. **Nova Hedwigia**. 26 (1): 125-133.
- Brouns, J.J.W.M. 1985. The plastochrone interval method for the study of the productivity of seagrasses; possibilities and limitations. **Aquatic Botany**. 21 (1): 71-88.
- Brown, M.R., S.W. Jeffrey, J.K. Volkman and G.A. Dunstan. 1997. Nutritional properties of microalgae for mariculture. **Aquaculture**. 151: 315-331.
- Burdick D.M. and A.K. Gray. 2000. Standards for seagrass collection, identification and sample design, pp. 79-100. *In* F. T. Short, R.G. Coles and C.A. Short, eds. **Grobal Seagrass Research Methods**. Elsevier, Netherlands.
- Cook, Christopher D.K. 1996. **Aquatic Plant Book**. SPB Academic Publishing, Amsterdam.
- Chansang H. and Sombat P. 1994. The distribution and species composition of seagrass beds along the Andaman sea coast of Thailand. **Phuket mar. boil. Cent. Res. Bull.** 59: 43-52.
- Chin, T.G., C. Zhaodi, L.Junmin and L. Shicheng. 1985. **The Marine Benthic Diatom in Chaina**. Chaina Ocean Press, Beijing.

Cox, E.J. 1996. **Identification of Freshwater Diatoms From Live Material.** Chapman & Hall, London.

Corleet, H. and B. Jones. 2006. Epiphyte communities on *Thalassia testudium* from Grand Cayman, British West Indies: Their composition, structure and contribution to lagoonal sediment. **Sedimentary Geology.** 194: 245-262.

Cupp, E. E. 1943. **Marine Plankton Diatom of The West Coast of North America.** University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

den Hartog, C. 1967. The structure aspect in the ecology of sea-grass communities. **Helgoländer Wiss. Meeresunters.** 15: 648-659.

Duart, C.M., M. Merino, N.S.R. Agawin, J. Uri, M.D. Fortes, M.E. Gallegos, N. Marba and M. Hemminga. 1998. Root production and belowground seagrass biomass. **Mar. Ecol. Prog. Ser.** 171: 97-108.

Ferrat, L., C. Fernandez, and O. Dumay. 2001. Analysis of the phenolic compounds in *Posidonia oceanica* from sites colonized by *Caulerpa taxifolia*, pp. 185-194. In V. Gravez, S. Ruitton, C.F. Boudouresque, L. le Direach, A. Meinesz, G. Scabbia, and M. Verlaque, eds. **Fourth International Workshop on *Caulerpa taxifolia***. GIS Posidonie publ., France.

Foged, N. 1975. **Some Littoral Diatom from The Coast of Tanzania.** Bibliotheca Phycologica.

Gedde, D. 1996. **Floristis Underøgelse af Kiselalger Tilhørende Underklasserne Coscinodiscophycidae og Thalassiosirophycidae in Dsamlet i Farvandet ud for Phuket (Thailand) – et Stadium Baseret Pålys-og Electron Mikroskopiske Observationer.** Specialerapport. Botanisk Institut, Denmark.

- Harlin, M.M. 1975. Epiphyte-host relations in seagrass communities. **Aquatic Botany**. 1: 125-131.
- Harlin, M.M. 1980. Seagrass epiphytes, pp. 117-152. *In* R.C. Phillips and C.P. McRoy, eds. **Handbook of Seagrass Biology : An Ecosystem Perspective**. Garland STMP Press, New York.
- Harper, M.A. 1977. Movements, pp. 224-249. *In* D. werner, ed. **The Biology of Diatom**. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Harrison, P.G. and A.T. Chan. 1980. Inhibition of the growth of micro-algae and bacteria by extracts of eelgrass (*Zostera marina*) leaves. **Mar. Biol.** 61: 21-26.
- Hasle, G.R. and P.A. Sims. 1986. The diatom genus *Coscinodiscus* Ehrenb. : *C. argus* Ehrenb. and *C. radiatus* Ehrenb. **Bolanica Marine**. 29 ; 305-318.
- Hasle, G.R. and E.E Syvertsen. 1996. Marine diatom, pp. 5-385. *In* C.R. Tomas, ed. **Identify Marine Diatom and Dinoflagellates**. Academic Press, San Diega CA.
- Heck Jr, K.L. and G.S. Welstone. 1977. Habitat complexity and invertebrate species richness and abundance in tropical seagrass meadows. **J. Biogeogr.** 4: 135-142.
- Heijis, F.M.L. 1984. Annual biomass and production of epiphytes in three monospecific seagrass communities of *Thalassia hemprichii* (Ehrenb.) Ashhers. **Aquatic Botany**. 20: 195-218.
- Heijis, F.M.L. 1985. Some structural and function aspects of the epiphytic component of four seagrass species (Cymodoceoideae) from Papua new Guinea. **Aquatic Botany**. 23: 225-247.

- Heijis, F.M.L. 1985a. The seasonal distribution and community structure of the epiphytic algae on *Thalassia hemprichii* (Ehrenb.) Aschers. from Papua New Guinea. **Aquatic Botany**. 21: 295-324.
- Hemminga, M.A. and M.D, Carlos. 2000. **Seagrass Ecology**. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Hendey, N.I. 1964. **An Introductory Account of the Smaller of British Coastal Water**. Part V. Bacillariophyceae (diatom). Fish. Tnvest. Series IV. HMSO, London.
- Hillman, K. 1989. The production ecology of the seagrass *Halophila ovalis* (R. Br.) Hook, pp. 458-499. In A.D.W. Larkum, A.J. McComb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of seagrasses**. Elsevier, Oxford.
- Hillman, K., D.I. Walker, A.D.W. Larkum and A.J. McComb. 1989. Productivity and Nutrient Limitation, pp. 635-685. In A.D.W. Larkum, A.J. McComb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of seagrasses**. Elsevier, Oxford.
- Jacobs, R.P.W.M. and T.M.P.A. Noten. 1980. The annual pattern of diatom in the epiphyton of Eelgrass (*Zostera marina* L.) at Roscoff, France. **Aquatic Botany**. 8: 355-370.
- Jensen, N.G. 1985. **The Pennate Diatoms**. (English translation from German), Koenigstien, Germany.
- Jensen, P.R., K.M. Jenkins, D. Porter and W. Fenical. 1998. Evidence that a new antibiotic flavone glycoside chemically defends the seagrass *Thalassia testudinum* against zoosporic fungi. **Appl. Envir. Microbiol.** 64: 1490-1496.

- John, J. 1990. Mastogloia species associated with active stromatolites in shark Bay, West Coast of Australia, pp. 189-209. In J.P. Kociolek, ed. **Proceedings of the 11th Symposium on Recent and Fossil Diatom**. California Academy of Science San Francisco, California.
- Johnstone, I. M. 1979. Papua New Guinea seagrass and aspect of the biology and growth of *Enhalus acoroides* (L.F.) Royle. **Aquatic Botany**. 7: 197-208.
- Kendrick G.A. 2001. Assessing biomass, assemblage structure and productivity of algal epiphytes on seagrasses. pp. 199-222. In F. T. Short, R.G. Coles and C.A. Short, eds. **Global Seagrass Research Methods**. Elsevier, Netherlands.
- Klumpp, D.W., R.K. Howard and D.A. Pollard. 1989. Trophodynamic and nutritional ecology of seagrass communities, pp. 394-457. In A.D.W. Larkum, A.J. McComb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of Seagrasses**. Elsevier, Oxford.
- Krammer, K. and H. Lange-Bertalot. 1986. **Bacillariophyceae. 1 Teil: Naviculaceae**. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Kubota, H. 1999. Attached diatoms from alewa heights spring in the south of Oahu Island, Hawaii. **The Japanese Journal of Diatomology**. 15: 165-168.
- Kuo, J. and A.J. McComb. 1989. Seagrass taxonomy, Structure and development, pp. 6-73. In A.D.W. Larkum, A.J. McComb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of Seagrasses**. Elsevier, Oxford.
- Kuo, J. and C. den Hartog. 2001. Seagrass Taxonomy and Identification Key, pp. 31-58. In F.T. short, R.G. Coles and C.A. Short, eds. **Global Seagrass Research Methods**. Elsevier, Amsterdam.

- Lai, S.D. 2001. An ecological study of brackish water diatom community in wetland, near the Tseng-Wen Estuary, in southwestern Taiwan. **The Japaness Society of Diatomology**. 17: 111-133.
- Leskinen, E. and G. Hallfor. 1988. Community structure of epiphytic diatom in relation to eutrophication on the Hanko Peninsula, South Coast of Finland, pp. 323-333. R. Ross, ed. **Proceedings of the 10th Symposium on Recent and Fossil Diatoms**. Otto Koeltz Press, Koenigstein.
- Lewin, R.A. 1962. **Physiology and biochemistry of algae**. Academic Press, New York.
- Lewis, F.G. 1984. Distribution of macrobenthic crustaceans associated with *Thalassia*, *Halodule* and bare substrata. **Mar. Ecol. Prog. Ser.** 19: 101-113.
- Longinova, L. P. 1988. Classification of Diatom Genus *Cyclotella*. pp. 37-46 **In Proceedings International Diatom of the 10th Symposium**. Joensuu, Finland.
- Loseva, E.I. 1988. The valve ultrastructure of fossil *Paralia sulcata* (Bacillariophyceae). pp. 83-91. R. Ross, ed. **Proceedings of the 10th Symposium on Recent and Fossil Diatoms**. Otto Koeltz Press, Koenigstein.
- Mazzella, L., M. Buia and L. Spinoccia. 1994. Biodiversity of epiphytic diatom community on leaves of *Posidonia oceanica*. pp. 241-251. R. Ross, ed. **Proceedings of the 13rd Symposium on Recent and Fossil Diatoms**. Otto Koeltz Press, Koenigstein.
- McCormick, P.V. and R.J. Stevenson. 1988. Periphyton as a tool for ecological assesment and management in the Florida Everglades. **Phycol.** 34: 726-733.

- McIntire, C.D. and W.M. Moore. 1977. Marine littoral diatom: Ecological consideration, pp. 333-371. In D.werner, ed. **The Biology of Diatom**. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Moncreiff, C.A. and M.J. Sullivan. 2001. Trophic importance of epiphytic algae in subtropical sea grass bed : evidence from multiple stable isotope analyses. **Marine egology progress series**. 215: 93-106.
- Mukai, H. and Kasim M. 2006. Contribution of benthic and epiphytic diatoms to Clam and Oyster production in the Akkeshi-ko estuary. **Journal of Oceanography**. 62: 267-281.
- Nagumo, T. and H. Kubayasi. 1990. The Bleaching method for gently loosening and cleaning a single diatom frustule. **The Japanese Journal of Diatomology**. 5: 45-50.
- Navarro, J.N. 1982. A survey of the marine diatom of Puerto Rico V. suborder Raphidinea: families Achnanthaceae and Naviculaceae (Excluding *Navicula* and *Mastogloia*). **Botanica Marine**. 35: 321-338.
- Nichols, P. D., D. W. Klump and R. B. Johns. 1985. A Study in food chain in seagrass communities. III. Stable carbon isotope ratios. Cited by M. A. Borowitzka and R. C. Lethbridge. **Seagrass Epiphytes**, pp. 458-499. In A. D. W. Larkum, A. J. McComb and S. A. Shepherd. *Biology of Seagrasses*. Elsevier, Oxford.
- Nigorikawa, A. and Y. Hasegawa. 1999. Changes in the environment and diatom thanatocoenoses from superficial oozes from the bottom of Matsukawausa Lagoon, Fukushima Pre fecture, Northeast Japan. **The Japaness Journal of Diatomology**. 15: 18-101.

- Ogden, J.C. 1980. Faunal relationships in Caribbean seagrass beds, pp. 173-198. *In* R.C. Phillips and C.P. McRoy, eds. **Handbook of Seagrass Biology : An Ecosystem Perspective**. Garland STPM Press, New York.
- Patrick, R. and C.W. Reimer. 1966. **The Diatom of the United States I**. United of America Press, Philadelphia.
- Partick, R. 1977. Ecology of freshwater Diatom-Diatoms Communities, pp. 284-332. *In* D. werner, ed. **The Biology of Diatom**. University of California Press, Berkey and Los Angeles.
- Paszowycz M.B. and L. Ryszard . 2002. Diatoms as food source indicator for som Antarctic Cumacea and Tanaidacea (Crustacea). **Antarctic Science**. 14 (1): 11-15.
- Podzorski, A. C. and H. Håkansson. 1987. **Freshwater and Marine Diatoms from Palawan (a Philippine island)**. Gebrüder Borntraeger, Geramany
- Poovachiranon, S. and H. Chansang. 1994. Community structure and biomass of seagrass bed in the Andaman sea. I. Mangrove-associated seagrass beds. **Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull.** 59: 53-64.
- Phillip, R.C. and E.G. Meñez. 1988. **Seagrasses**. Smithsonian Contributions to the Marine Sciences, no. 34. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
- Ricard, M. 1977. **Revue Algologique. Lab.** Nat. D' Histo. Nato, Paris.
- Ricard, M. 1987. **Atlas du Phytoplankton Marin**. Vol. II. Diatomophyces. Cent. Nat. De La Rech. Sci., Paris.

- Riznyk, R. Z. 1973. Interstitial diatoms from two tidal flats in Yaquina estuary, Oregon, USA. **Bot. Mar.** 16: 113-138.
- Round, F. E. 1973. **The biology of the algae.** Edward Arnold, London.
- Round, F.E., R.M. Crawford and D.G. Mann. 1990. **The Diatom: Biology Morphology of the Genera.** Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Sakabe, M. And T. Nagumo. 1997. Attached diatom flora of Kakita River springs, shizuoka Prefecture, Japan. **The Japanese Journal of Diatomology.** 13: 113-127.
- Sand – Jensen, K. 1977. Effect of epiphytes on eelgrass photosynthesis. **Aquatic Botany.** 3: 55-63.
- Sheperd, S.A., A.J. McComb, D.A. Bulthuis, V. Neverauskas, D.A. Steffensen and R. West. 1989. Decline of seagrasses, pp. 346-393. *In* A.D.W. Larkum, A.J. McComb and S.A. Shepherd, eds. **Biology of Seagrass.** Elsevier, Oxford.
- Short, F.T., R.G. Coles and C. Pergent-Martini. 2001. Global Seagrass Distribution, pp. 5-30. *In* F.T. Short, R.G. Coles and C.A. Short, eds. **Global Seagrass Research Methods.** Elsevier, Amsterdam.
- Sims, P.A. 1996. **An atlas of British Diatoms** : based on illustrations. Biopress Ltd., England.
- Sullivan. M.J. 1979. Epiphytic diatom of three seagrass species in Mississippi sound. **Bulletin of Marine Science.** 29: 459-464.
- Sullivan. M.J. 1980. Community structure of diatom epiphytic on Mangroves and *Thalassia* in Bimini Harbour, Bahamas. pp. 374-384. R. Ross, ed. **Proceedings of the 6th Symposium on Recent and Fossil Diatoms.** Otto Koeltz Press, Koenigstein.

- Sullivan, M.J. 1982. Community structure of epiphytic diatom from the Gulf Coast of Florida, USA. pp. 374-384. R. Ross, ed. **Proceedings of the 7th Symposium on Recent and Fossil Diatoms**. Otto Koeltz Press, Koenigstein.
- Werner, D. 1977. Introduction with a note on taxonomy, pp. 1-17. *In* D. Werner, ed. **The Biology of Diatoms**. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Zapata, O. and C. Mcmillan. 1979. Phenolic acids in seagrasses. **Aquatic Botany**. 7: 307-317.
- Zlaman, J.C. and G.W. Robert. 1980. Productivity in seagrass : Methods and Rates, pp. 87-116. *In* R.C. Phillips and C.P. McRoy, eds. **Handbook of Seagrass Biology : An Ecosystem Perspective**. Garland STMP Press, New York.



ตารางผนวกที่ ก1 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนตุลาคม 2549

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceidae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stilorum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												
<i>Coscinodiscus radiatus</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinocyclus</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Triceratiales												
Family Triceratiaceae												
<i>Triceratium favus</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หูกทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Lampriscus</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis spathulata</i> (Schadbolt) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Licmophorales												
Family Licmophoraceae												
<i>Licmophora</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Ardissonales												
Family Ardissonaceae												
<i>Ardissona</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Petroneis granulata</i> (Bailey) Mann. Comb. Nov	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	/	-
Order Mastogloiales												

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หูก้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Mastogloieceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. quinquecostata</i> Grunow	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.3	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Caloneis samoensis</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญาทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Diploneis suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	-	-	/	/	-	-	/	-	-	-	/	/
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.3	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-
Order Thalassiphysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora obtusa</i> Gregory	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>A. ovalis</i> Kützing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>A. ventricosa</i> Gregory	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญาทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.4	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
<i>Campylodiscus innominatus</i> Ross & Abdin	/	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-
<i>Campylodiscus</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก2 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนตุลาคม 2549

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceidae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophyceidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/	-	/
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	-	/	/	-	-	-	-	/	-	/	-	/
<i>Actinocyclus</i> sp.2	/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/
Subclass Biddulphiophyceidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	/	-
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophyceidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis spathulata</i> (Schadbolt) Grunow	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-

ตารางผนวกที่ ก2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Licmophorales												
Family Licmophoraceae												
<i>Licmophora</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	-	/	/	/	-	-	-	/	-	/	-	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	-	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	-	/	/	-	-	-	-	/	-	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	-	-	-	-	-	/	-	/	/	-
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	/	/	-	-	/	/	/	/	/	-	/	-
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	-	/	/	-	/	-	-	/	/	/	/	/
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	-	-	/	-	/	-	/	/	/	/	/	-
Family Cocconeidaceae												

ตารางผนวกที่ ก2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	-	-	-	/	/	-	/	-	/	-	-	-
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	-	/	/	/	/	-	/	-	/	/	-
<i>Caloneis samoensis</i> (Grunow) Cleve	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	-	/	-	-	/	-	/	-	/	/	/	-
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												

ตารางผนวกที่ ก2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Amphora ovalis</i> Kützting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Campylodiscus innominatus</i> Ross & Abdin												
<i>Campylodiscus</i> sp.	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	/	-

ตารางผนวกที่ ก3 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนตุลาคม 2549

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceidae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	-	-	-	-	/	-	/	-	-	/	-	/
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophyceidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	-	/	-	/	/	-	-	/	-	-	/	/
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	-	/	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-
<i>Actinocyclus</i> sp.2	-	-	-	-	/	-	/	-	-	/	/	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Biddulphiophyceidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	-	/	-	/	-	/	-	-	-	-	-	/
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophyceidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis spathulata</i> (Schadbolt) Grunow	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	/

ตารางผนวกที่ ก3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Licmophorales												
Family Licmophoraceae												
<i>Licmophora</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Petroneis granulata</i> (Bailey) Mann. Comb. Nov	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	-	/	/	-	-	-	/	-	/	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	-	-	-	-	/	/	/	-	/	/	/	-
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หอยทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	/	/
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	/	-	/	/	-	/	-	/	-	-	-
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/
<i>Caloneis samoensis</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	-	/	/	/	/	-	/	/	-	/	/
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora ovalis</i> Kützting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Amphora ventricosa</i> Gregory	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	-
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
<i>Campylodiscus innominatus</i> Ross & Abdin	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
<i>Campylodiscus</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-

ตารางผนวกที่ ก4 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนตุลาคม 2549

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophycidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	/
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-
<i>Actinocyclus</i> sp.2	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	/	-	/	-	/	-	-	/	/	/	-	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	-	-	-	/	-	/	/	/	/	-	-	-
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												

ตารางผนวกที่ ก4 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	/	-	/	/	-	/	/	-	-	-
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	-	-	-	/	/	-	/	-	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	-	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	-	-	-	/	-	/	-	-	-	/	/	-
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	-	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	-	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
<i>Caloneis samoensis</i> (Grunow) Cleve	/	-	/	-	-	-	/	-	-	/	/	/
Suborder Diploneidineae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	/	-
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก4 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	-	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora ovalis</i> Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey												
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก5 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนมีนาคม 2550

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophycidae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												
<i>Coscinodiscus radiatus</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinocyclus</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinocyclus</i> sp.3	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	/	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinopterychus</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Triceratiales												

ตารางผนวกที่ ๕ (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญาทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Triceratiaceae												
<i>Triceratium favus</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Lampriscus</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Isthmia enervis</i> Erenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Cymatosirophyceae												
Order Cymatosirales												
Family Cymatosiraceae												
<i>Cymatosira lorenziana</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis spathulata</i> (Schadbolt) Grunow	/	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Rhabdonematales												
Family Rhabdonemataceae												
<i>Rhabdonema</i> sp.	/	/	/	-	/	/	-	/	/	/	-	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												

ตารางผนวกที่ ๕ (ต่อ)

รายชื่อแมลงก้นด่อน	หูก้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Lyrella</i> sp.	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	/	-
<i>Petroneis granulata</i> (Bailey) Mann. Comb. Nov	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. quinqucostata</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. recta</i> Hustedt	-	-	-	/	/	-	-	-	-	/	-	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-
<i>Mastogloia</i> sp.2	/	/	/	/	-	-	/	/	-	-	/	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Caloneis alpestris</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ๕ (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญาทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Caloneis liber</i> (W. Smith) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Suborder Diploneidinae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	/	/	-	/	-	-	/	/	/
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
Suborder Naviculinae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmaaceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora obtusa</i> Gregory	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>A. ovalis</i> Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>A. ventricosa</i> Gregory	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ๕ (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หูกทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Amphora</i> sp.2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-	-	-
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pennate diatom 1	/	/	-	-	/	-	-	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ 6 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนมีนาคม 2550

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												
<i>Coscinodiscus radiatus</i> Ehrenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	-	-	/	-	/	/	-	/	-	/	/	-
<i>Actinocyclus</i> sp.2	/	-	-	/	/	-	-	-	-	/	-	/
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinopterychus</i> sp.	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-
Class Fragilariophyceae												

ตารางผนวกที่ 6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	-	/	-	-	/	/	/	/	-	-	/	/
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. quinquecostata</i> Grunow	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	-	-	/	-	/	-	/	/	/	-	/	/
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	-	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	-
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	/	-	/	/	-	-	/	/	/	-	/
Order Naviculales												

ตารางผนวกที่ ก6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	/	-	/	/	-	-	/	-	-	-	/
<i>Caloneis alpestris</i> (Grunow) Cleve	/	-	/	-	/	/	/	/	-	-	/	/
<i>C. liber</i> (W. Smith) Cleve	-	-	-	/	-	/	-	/	/	-	-	-
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	/
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	-	/	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmaaceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												

ตารางผนวกที่ ก6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Amphora ovalis</i> Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.2	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	/	-
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	-	/	/	-	-	-	/	-	-	/	-	/
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.4	-	-	/	/	/	-	/	-	/	-	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก7 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนมีนาคม 2550

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophyceidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-
<i>Actinocyclus</i> sp.2	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopteryx senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinopteryx</i> sp.	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	/	-
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra marylandica</i> Ehrenberg	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subclass Biddulphiophyceidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia biddulphiana</i> (J. E. Smith)	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
Subclass Cymatosirophyceidae												
Order Cymatosirales												
Family Cymatosiraceae												
<i>Cymatosira lorenziana</i> Grunow	-	-	-	/	/	-	-	-	/	-	/	-

ตารางผนวกที่ ก7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/
Order Rhabdonematales												
Family Rhabdonemataceae												
<i>Rhabdonema</i> sp.	-	/	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	-	-	-	-	/	-	-	-	/	/	-	-
<i>M. quinquecostata</i> Grunow	-	/	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Mastogloia</i> sp.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	-	-	/	/	-	-	-	/	-	/	/	-
Order Achnanthales												

ตารางผนวกที่ ก7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	-	/	/	-	/	/	-	/	/	/	-	/
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	/	/	-	-	/	-	/	/	-	-	/	-
<i>Caloneis alpestris</i> (Grunow) Cleve	/	-	/	-	/	-	-	/	/	-	/	-
<i>C. liber</i> (W. Smith) Cleve	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. splendida</i> (Gregory) Cleve	/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. weissflogi</i> (A. Schmidt) Cleve	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma angulatum</i> (Quekett) W. Smith	-	-	-	/	/	-	-	-	/	-	-	-
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis pusilla</i> (Gregory) Kuntze	-	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora obtusa</i> Gregory	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-
<i>A. ovalis</i> Kützting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>A. ventricosa</i> Gregory	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.2	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	-	-	/	/	-	-	-	/	-	-	/	-
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.4	/	-	/	/	-	/	/	/	-	-	/	/
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	-	-	-	/	-	-	/	-	/	-	-	-
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ก8 ความหลากหลายของอีพีไฟติกไดอะตอมที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนมีนาคม 2550

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophycidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella stylum</i> Brightwell	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> sp.1	-	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-
<i>Actinocyclus</i> sp.2	/	/	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Actinopterychus</i> sp.	/	-	-	/	/	/	-	/	-	-	/	-
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Husted	-	/	/	-	-	-	/	-	/	/	/	-
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehrenberg) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												

ตารางผนวกที่ ๘ (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella lyra</i> (Ehrenberg) Karajeva	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia fimbriata</i> (Brightwell) Cleve	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/
<i>M. punctifera</i> Brun	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-
<i>M. quinquecostata</i> Grunow	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. rhombica</i> Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M. cf. crucicula</i> (Grunow) Cleve	-	-	/	-	/	-	/	/	-	/	/	/
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	-	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis pellucida</i> (Hantzsch) Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>C. scutellum</i> Ehrenberg	/	-	-	/	/	/	-	/	/	-	-	-
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	-	/	/	-	-	/	/	-	/	/	/	/
<i>Caloneis alpestris</i> (Grunow) Cleve	/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	/	/
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis crabro</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	-	/	/	/	-	/	-	-	/	/	/	/
<i>D. fusca</i> var. <i>pervasta</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. oblongella</i> (Naeg. ex Kütz.) Ross	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>D. suborbicularis</i> (Gregory) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ๘ (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg)	/	/	-	/	-	/	-	/	/	-	-	-
<i>Navicula avenacea</i> (Brébisson & Godey) Brébisson	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Navicula</i> sp.2	/	/	-	/	/	/	/	-	/	-	-	/
<i>Trachyneis aspera</i> (Ehrenberg) Cleve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Pleurosigma</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora ovalis</i> Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Amphora</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria paxillifer</i> (O. F. Müller) Hendey												
<i>Psammodictyon panduriforme</i> (Gregory) Mann.	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Nitzschia</i> sp.4	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	/	-
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Kützinger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Surirella</i> sp.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางผนวกที่ ข1 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนตุลาคม 2549
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	61	38	54	40	82	56	49	51	83	76	68	43
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	200	328	299	226	413	284	255	244	312	438	247	450
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	113	57	82	77	118	95	71	85	114	86	147	147
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Coscinodiscus</i> sp.	16	13	8	9	22	10	5	11	23	35	7	17
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	18	38	49	24	56	29	66	12	48	36	13	26
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinopterychus</i> sp.	139	250	207	142	142	187	149	176	157	164	174	134
Order Asteroламprales												
Family Asteroламpraceae												
<i>Asterolampra</i> sp.	10	20	15	11	6	29	18	7	20	20	27	14
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Triceratiales												
Family Triceratiaceae												
<i>Triceratium</i> sp.	0	5	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0
<i>Lampriscus</i> sp.	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia</i> sp.	46	33	79	40	66	72	36	49	64	61	70	32

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis</i> sp.	30	20	12	19	16	39	32	41	24	35	35	17
Order Licmophorales												
Family Licmophoraceae												
<i>Licmophora</i> sp.												
Order Ardissonaeales	31	61	30	33	64	45	54	32	70	31	52	42
Family Ardissonaceae												
<i>Ardissonaea</i> sp.	1	8	2	0	3	0	5	4	1	3	17	9
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	121	168	284	174	313	141	250	133	248	201	116	267
Order Striatellales												

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	157	238	289	250	168	193	195	217	271	313	200	222
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	276	348	452	251	486	325	414	259	497	564	255	420
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	151	230	217	178	261	239	214	255	105	143	129	201
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	59	49	102	66	126	95	146	39	51	69	80	79
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Achnanthes</i> sp.	26	41	62	40	18	29	19	54	38	58	19	46
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	147	106	150	102	155	89	136	82	157	130	148	162
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	18	22	15	25	64	37	19	37	27	39	12	66
<i>Caloneis</i> sp.	104	162	100	113	85	174	157	66	164	117	70	148
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	212	203	342	340	299	346	277	260	393	326	314	310
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	204	356	182	175	328	256	224	238	215	234	198	232
<i>Navicula</i> spp.	350	521	391	362	504	353	487	285	350	495	290	482
<i>Trachyneis</i> sp.	433	476	424	364	422	409	384	324	358	419	324	383

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	46	74	48	39	62	80	97	60	72	54	76	63
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	554	801	626	766	505	621	671	495	279	727	571	623
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria</i> sp.	16	63	44	41	18	30	62	11	74	49	73	37
<i>Psammodictyon</i> sp.	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
<i>Nitzschia</i> spp.	565	579	726	482	510	578	782	400	501	505	473	587
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ ข1 (ต่อ)

รายชื่อเพลงก่ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Surirella</i> spp.	59	109	99	70	114	56	66	62	88	49	62	62
<i>Campylodiscus</i> spp.	31	19	49	20	58	27	65	27	38	77	24	22

ตารางผนวกที่ ข2 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนตุลาคม 2549
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	71	47	59	70	76	37	44	31	81	79	37	50
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	19	11	0	0	0	0	0	17	11	8	0	14
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	8	4	4	4	0	6	0	2	0	4	0	2

ตารางผนวกที่ ข2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus</i> sp.	6	2	2	4	2	0	4	10	7	10	0	2
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis</i> sp.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	0	9	22	17	0	0	0	13	0	8	0	34
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	0	25	14	0	6	16	22	8	13	0	0	5
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												

ตารางผนวกที่ ข2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	201	292	148	311	163	234	137	193	145	214	153	256
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	93	116	120	81	86	142	65	145	103	109	74	121
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	0	9	6	0	0	0	0	8	2	6	2	2
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	0	0	4	0	6	0	4	0	0	14	7	0
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	10	0	6	2	11	0	6	0	2	0	4	0
Order Naviculales												

ตารางผนวกที่ ข2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	8	0	4	6	2	12	0	4	0	2	9	0
<i>Caloneis</i> sp.	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Suborder Diploneidineae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	102	94	142	136	159	61	92	61	79	44	101	160
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	71	125	122	85	75	0	116	99	90	111	129	87
<i>Navicula</i> spp.	245	314	349	337	247	343	290	226	392	246	300	319
<i>Trachyneis</i>	282	361	258	328	266	335	262	348	329	246	188	397
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	27	45	32	34	23	30	37	40	48	53	33	46
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis</i> sp.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ ข2 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	313	401	353	290	365	400	311	442	278	232	276	301
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Nitzschia</i> spp.	467	459	504	545	384	416	351	436	515	404	344	493
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella</i> sp.	46	36	55	55	34	61	63	34	44	44	63	64
<i>Campylodiscus</i> sp.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ ๓3 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนตุลาคม 2549
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	0	0	0	0	10	0	6	0	0	15	0	9
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	74	104	110	65	111	98	117	88	108	103	133	94
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	0	17	0	53	29	0	0	34	0	0	68	41
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												

ตารางผนวกที่ ข3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Actinocyclus</i> spp.	0	10	0	6	16	0	3	0	9	12	10	0
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus</i> sp.	22	14	16	12	10	19	18	15	9	15	26	16
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia</i> sp.	0	17	0	9	0	19	0	0	0	0	0	9
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis</i> sp.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	15	0	12
Order Licmophorales												
Family Licmophoraceae												
<i>Licmophora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0

ตารางผนวกที่ ข3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	35	24	44	37	26	0	21	34	15	24	0	44
Order Rhabdonematales												
Family Rhabdonemataceae												
<i>Rhabdonema</i> sp.	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	77	66	50	46	69	91	82	55	72	92	75	56
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	243	349	164	136	220	151	167	210	282	163	234	156
<i>Petroneis</i> sp.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ ข3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	121	200	170	149	118	135	85	180	150	95	185	122
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	0	0	0	0	13	22	38	0	24	12	36	0
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	10	21	3	31	0	13	6	0	0	24	10	0
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	10	31	13	22	39	0	9	18	24	0	13	22
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	10	21	6	6	0	13	0	9	0	3	0	16

ตารางผนวกที่ ข3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Caloneis</i> sp.	26	52	19	34	33	41	59	40	21	12	36	25
Suborder Diploneidinae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	176	142	116	198	108	179	82	125	156	115	101	156
Suborder Naviculinae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	109	145	66	142	82	120	79	58	102	139	114	128
<i>Navicula</i> spp.	355	328	79	371	341	258	223	216	270	310	218	409
<i>Trachyneis</i> sp.	329	393	299	368	334	315	287	353	315	313	331	378
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	38	21	28	50	23	31	23	40	18	30	29	44
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	217	359	170	186	138	242	97	247	153	266	143	246
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												

ตารางผนวกที่ ข3 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Nitzschia</i> spp.	489	580	601	501	482	478	466	420	480	570	481	512
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella</i> spp.	38	31	47	34	56	31	67	58	30	44	65	28
<i>Campylodiscus</i> spp.	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ ๔ ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนตุลาคม 2549
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophycidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	83	59	88	82	44	70	80	77	90	98	82	70
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	0	0	0	51	10	42	0	0	0	0	0	10
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	0	7	15	13	19	7	18	10	18	19	29	0
Family Heliopeltaceae												

ตารางผนวกที่ ข4 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Actinoptychus</i> sp.	34	23	4	7	15	9	11	7	18	7	15	16
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	28	0	41	0	4	0	0	19	13	30	0	23
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	0	0	0	15	0	26	30	15	9	0	0	0
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	59	89	90	115	100	152	68	123	60	155	157	142
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												

ตารางผนวกที่ ๗4 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Mastogloia</i> spp.	114	129	152	68	104	82	68	116	77	120	60	116
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	39	0	0	51	19	33	0	0	0	0	5	0
Order Achnanthales												
Family Achnanthaceae												
<i>Achnanthes</i> sp.	0	16	4	0	0	0	0	0	0	7	15	3
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	0	9	0	20	10	33	11	24	15	26	15	0
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	0	0	4	9	15	7	14	5	20	0	7	21
<i>Caloneis</i> sp.	31	0	13	0	0	0	7	0	0	9	24	16
Suborder Diploneidineae												
Family Diploneidaceae												

ตารางผนวกที่ ๗4 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Diploneis</i> spp.	18	66	69	68	42	94	34	82	35	98	53	85
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	85	56	79	64	92	96	77	90	126	98	87	72
<i>Navicula</i> spp.	191	335	351	313	113	232	307	293	170	298	285	339
<i>Trachyneis</i> sp.	122	110	197	179	190	239	200	203	207	267	256	297
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	10	12	13	29	25	12	11	7	0	16	29	36
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	241	241	244	172	208	225	150	133	174	227	252	225
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Nitzschia</i> spp.	352	544	529	488	506	464	425	491	499	630	617	727
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												

ตารางผนวกที่ ข4 (ต่อ)

รายชื่อเพลงกัศอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Surirella</i> sp.	40	33	26	64	6	30	7	2	13	33	48	23

ตารางผนวกที่ ข5 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Enhalus acoroides* ในเดือนมีนาคม 2550
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Thalassiosiraceae												
<i>Thalassiosira</i> sp.	40	21	60	28	54	45	35	78	30	68	42	81
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	314	402	329	492	307	410	464	457	297	400	260	455
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	417	389	365	395	410	447	329	477	320	466	465	410
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												

ตารางผนวกที่ ข5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Coscinodiscus</i> sp.	61	30	30	87	46	57	67	123	49	35	78	58
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	71	76	55	40	101	73	52	43	82	58	95	77
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus</i> spp.	397	257	282	333	230	272	353	336	345	310	318	265
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra</i> sp.	32	43	19	21	49	34	36	18	25	39	18	52
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Triceratiales												
Family Triceratiaceae												
<i>Triceratium</i> sp.	26	4	26	33	10	18	22	43	20	54	21	39
<i>Lampriscus</i> sp.	28	15	13	36	26	45	10	59	32	31	55	23
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia</i> sp.	47	49	34	50	74	52	35	74	74	25	57	50

ตารางผนวกที่ ข5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Isthmia</i> sp.	63	27	47	52	31	37	43	27	17	23	32	17
Subclass Cymatosirophyceae												
Order Cymatosirales												
Family Cymatosiraceae												
<i>Cymatosira</i> sp.	14	3	30	9	5	31	17	4	39	8	2	15
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Fragilariales												
Family Fragilariaceae												
<i>Podocystis</i> sp.	10	0	6	3	175	0	8	4	8	4	13	8
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	205	202	171	165	293	198	114	352	193	258	162	313
Order Rhabdonematales												
Family Rhabdonemataceae												

ตารางผนวกที่ ข5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Rhabdonema</i> sp.	6	1	2	0	0	15	0	2	28	0	0	4
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	456	287	521	392	252	306	409	412	469	285	375	515
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> spp.	275	300	290	341	198	264	387	283	178	353	250	437
<i>Petroneis</i> sp.	6	0	2	0	3	0	2	6	3	0	2	8
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	202	95	214	185	206	224	171	236	122	281	187	279
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												

ตารางผนวกที่ ข5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Gomphonema</i> sp.	85	30	53	55	41	24	57	43	50	97	37	64
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	111	107	196	106	240	133	203	184	184	357	171	251
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	65	36	30	35	51	21	41	18	50	49	18	70
<i>Caloneis</i> spp.	49	53	111	118	54	121	168	100	117	159	48	44
Suborder Diploneidaceae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	288	322	363	225	284	329	285	471	250	256	325	311
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	150	180	184	196	113	130	162	168	102	138	197	174

ตารางผนวกที่ ๖5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Navicula</i> spp.	668	596	662	536	451	531	684	580	591	598	599	540
<i>Trachyneis</i> sp.	454	331	453	411	353	360	336	432	402	450	346	441
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	95	48	56	97	44	62	65	59	85	114	40	64
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis</i> sp.	8	3	13	9	2	13	8	10	18	29	10	6
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	640	655	711	539	667	570	480	819	576	561	582	654
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria</i> sp.	47	67	36	49	82	58	95	84	44	58	94	159
<i>Psammodictyon</i> sp.	12	19	13	17	5	13	22	10	8	17	10	17
<i>Nitzschia</i> spp.	610	398	792	861	512	818	504	830	856	671	494	1,107
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												

ตารางผนวกที่ ข5 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Enhalus acoroides</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Plagiodiscus</i> sp.	4	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0
<i>Surirella</i> spp.	184	150	218	163	181	126	127	209	224	171	147	151
pennate diatom 1	4	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0

ตารางผนวกที่ ๖6 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Thalassia hemprichii* ในเดือนมีนาคม 2550
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	125	141	116	134	67	134	92	122	158	72	174	100
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	109	61	97	147	63	84	126	66	88	92	139	64
Order Coscinodiscales												
Family Coscinodiscaceae												
<i>Coscinodiscus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Family Hemidiscaceae												

ตารางผนวกที่ ข6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Actinocyclus</i> spp.	0	0	0	5	8	2	0	4	0	4	2	4
Family Heliopeltaceae												
<i>Actinoptychus</i> spp.	4	5	2	2	2	6	6	2	4	2	8	4
Order Asteroламprales												
Family Asteroламpraceae												
<i>Asterolampra</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Triceratales												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												

ตารางผนวกที่ ข6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Thalassionema</i> sp.	0	7	0	0	16	0	6	0	0	0	19	8
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	27	36	39	68	22	46	43	58	33	15	75	32
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	146	173	235	229	146	243	281	148	232	150	201	226
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	154	112	151	129	150	166	98	104	171	126	120	147
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	0	0	4	0	2	0	2	0	7	0	0	0

ตารางผนวกที่ ข6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	6	2	0	9	4	2	2	2	4	9	2	2
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	2	5	0	5	2	0	0	8	0	0	0	6
<i>Caloneis</i> spp.	4	0	11	5	0	4	15	6	7	0	0	0
Suborder Diploneidlineae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	109	92	164	220	87	143	181	138	147	89	170	128
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	19	31	26	77	30	55	47	32	61	59	29	40
<i>Navicula</i> spp.	392	415	414	517	378	384	511	340	462	344	434	418
<i>Trachyneis</i> sp.	321	231	330	401	295	306	390	246	316	287	272	360

ตารางผนวกที่ ข6 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Thalassia hemprichii</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	48	22	80	20	22	33	43	26	55	26	39	53
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis</i> sp.	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	344	249	435	515	327	293	409	294	408	266	452	337
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria</i> sp.	0	0	0	36	0	38	0	0	0	0	54	0
<i>Psammodictyon</i> sp.	0	4	4	0	0	0	2	0	0	6	0	4
<i>Nitzschia</i> spp.	277	379	371	429	276	340	384	334	342	294	355	367
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Surirella</i> spp.	117	161	140	129	104	134	107	92	180	111	100	109

ตารางผนวกที่ ๗7 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Cymodocea rotundata* ในเดือนมีนาคม 2550
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophyceae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	81	101	131	128	66	119	116	88	105	148	98	113
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	140	124	172	142	201	134	183	167	121	218	173	176
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	6	0	3	8	6	0	0	0	0	3	0	0
Family Heliopeltaceae												

ตารางผนวกที่ ข7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Actinoptychus</i> spp.	38	48	66	53	27	73	61	36	53	82	50	68
Order Asterolamprales												
Family Asterolampraceae												
<i>Asterolampra</i> sp.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subclass Biddulphiophycidae												
Order Biddulphiales												
Family Biddulphiaceae												
<i>Biddulphia</i> sp.	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Subclass Cymatosiropheycidae												
Order Cymatosirales												
Family Cymatosiraceae												
<i>Cymatosira</i> sp.	0	0	0	6	18	0	0	0	0	0	3	0
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												

ตารางผนวกที่ ข7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้ําทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.												
Order Rhabdonematales	38	29	0	45	42	21	61	26	37	0	47	33
Family Rhabdonemataceae												
<i>Rhabdonema</i> sp.	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	134	98	181	137	183	101	157	128	204	178	173	143
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	247	216	300	287	243	280	207	292	310	227	293	333
Order Mastogloiales												
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	160	225	187	126	153	192	207	216	111	145	176	125

ตารางผนวกที่ ข7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	0	0	6	3	0	0	0	10	0	9	13	0
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	90	86	109	120	108	101	84	131	115	79	63	122
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	15	6	0	0	3	0	12	13	0	0	9	0
<i>Caloneis</i> spp.	12	0	16	0	0	0	9	3	15	0	6	0
Suborder Diploneidineae												
Family Diploneidaceae												
<i>Diploneis</i> spp.	151	257	128	251	204	250	227	187	105	263	192	307
Suborder Naviculineae												

ตารางผนวกที่ ข7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้ำทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	70	67	56	73	36	101	49	95	46	30	57	71
<i>Navicula</i> spp.	419	333	271	313	402	619	404	302	396	281	447	318
<i>Trachyneis</i>	372	336	402	368	423	411	361	426	279	435	321	336
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	41	67	31	25	42	58	70	92	65	42	79	27
Family Plagiotropidaceae												
<i>Plagiotropis</i> sp.	0	0	3	0	0	0	6	0	3	0	0	0
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	439	425	393	360	336	299	317	469	365	414	374	304
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Bacillaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	82	0
<i>Psammodictyon</i> sp.	0	0	3	6	0	0	0	3	0	6	6	0
<i>Nitzschia</i> spp.	335	415	250	304	303	402	288	465	285	417	245	324

ตารางผนวกที่ ๗7 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Cymodocea rotundata</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Plagiodiscus</i> sp.	0	0	0	3	0	0	6	0	3	0	0	0
<i>Surirella</i> spp.	102	149	193	142	126	88	166	128	139	190	123	137

ตารางผนวกที่ ข8 ความหนาแน่นของอีพีไฟติกไดอะตอมในระดับสกุลที่พบบนใบหญ้าทะเล *Halophila ovalis* ในเดือนมีนาคม 2550
(หน่วยเซลล์ต่อตารางเซนติเมตร)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Division Bacillariophyta												
Class Coscinodiscophyceae												
Subclass Thalassiosirophycidae												
Order Thalassiosirales												
Family Stephanodiscaceae												
<i>Cyclotella</i> sp.	80	106	66	108	117	90	135	70	98	94	77	110
Subclass Coscinodiscophycidae												
Order Paraliales												
Family Paraliaceae												
<i>Paralia</i> sp.	42	67	43	77	38	44	66	82	68	66	75	55
Order Coscinodiscales												
Family Hemidiscaceae												
<i>Actinocyclus</i> spp.	23	52	28	0	11	0	12	23	45	13	13	0
Family Heliopeltaceae												

ตารางผนวกที่ ข8 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้ำทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Actinoptychus</i> spp.	30	10	15	30	20	31	15	18	5	2	29	8
Class Fragilariophyceae												
Subclass Fragilariophycidae												
Order Thalassionematales												
Family Thalassionemataceae												
<i>Thalassionema</i> sp.	0	21	26	0	0	0	36	0	35	21	33	0
Order Striatellales												
Family Striatellaceae												
<i>Grammatophora</i> sp.	75	59	88	113	73	81	123	80	85	96	106	90
Class Bacillariophyceae												
Subclass Bacillariophycidae												
Order Lyrellales												
Family Lyrellaceae												
<i>Lyrella</i> sp.	122	93	86	70	104	50	99	61	103	58	102	173
Order Mastogloiales												

ตารางผนวกที่ ข8 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Family Mastogloiaceae												
<i>Mastogloia</i> spp.	124	91	99	129	55	125	129	68	138	71	133	120
Order Cymbellales												
Family Gomphonemataceae												
<i>Gomphonema</i> sp.	0	18	4	12	2	17	0	9	0	4	0	23
Order Achnanthales												
Family Cocconeidaceae												
<i>Cocconeis</i> spp.	59	26	28	30	49	67	27	43	53	54	44	40
Order Naviculales												
Suborder Sellaphorineae												
Family Pinnulariaceae												
<i>Pinnularia</i> sp.	0	31	19	0	0	29	12	0	10	2	17	8
<i>Caloneis</i> sp.	5	0	0	12	0	2	0	0	0	0	2	3
Suborder Diploneidineae												
Family Diploneidaceae												

ตารางผนวกที่ ข8 (ต่อ)

รายชื่อแพลงก์ตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Diploneis</i> spp.	63	57	34	68	73	23	36	23	60	41	63	173
Suborder Naviculineae												
Family Naviculaceae												
<i>Frustulia</i> sp.	26	13	0	14	0	6	0	14	3	0	0	0
<i>Navicula</i> spp.	459	587	401	513	516	465	567	493	490	456	415	393
<i>Trachyneis</i> sp.	326	284	311	195	245	252	306	198	208	251	200	13
Family Pleurosigmataceae												
<i>Pleurosigma</i> spp.	54	80	41	82	46	35	99	61	60	34	52	48
Order Thalassiophysales												
Family Catenulaceae												
<i>Amphora</i> spp.	309	295	259	239	291	277	426	286	298	285	267	268
Order Bacillariales												
Family Bacillariaceae												
<i>Psammodictyon</i> sp.	0	8	0	19	4	29	12	20	5	24	10	18
<i>Nitzschia</i> spp.	663	499	546	537	452	402	567	491	575	549	454	583

ตารางผนวกที่ ข8 (ต่อ)

รายชื่อเพลงกั๊ตตอน	หญ้าทะเล <i>Halophila ovalis</i>											
	Pacth 1			Pacth 2			Pacth 3			Pacth 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Order Surirellales												
Family Surirellaceae												
<i>Surirella</i> spp.	110	145	133	75	79	94	147	139	105	81	102	138

ประวัติการศึกษา และการทำงาน

ชื่อ –นามสกุล	นางสาวจิตติมา นิยมศิลป์ชัย
วัน เดือน ปี ที่เกิด	วันที่ 23 มีนาคม 2526
สถานที่เกิด	จังหวัดชัยนาท
ประวัติการศึกษา	วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน	-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	-
ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ	-
ทุนการศึกษาที่ได้รับ	- ทุนผู้ช่วยสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา จากโครงการ พัฒนาความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร ชีวภาพในประเทศไทย (BRT) รหัสโครงการ T 351167