

ภาวะปวดท้องเฉียบพลันเป็นปัญหาสำคัญทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจประเมิน วินิจฉัยโรคและรับการรักษาพยาบาล เพื่อบรรเทาอาการปวดท้อง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ และเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด จำนวน 60 คน ซึ่งเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล แบบสัมภาษณ์ความต้องการแบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้ศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินของ โสภารัตน์ พรหมพุก (2548) ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดของ ยูรา และ วอลส์ (Yura & Walsh, 1983) ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าความตรงตามเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ความต้องการเท่ากับ 0.94 และแบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการเท่ากับ 0.94 และนำไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการเท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการด้านความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านสิทธิเสรีภาพ และมีความต้องการด้านการดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำดับ
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันได้รับการตอบสนองความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้รับการตอบสนองความต้องการด้านความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาได้รับการตอบสนองความต้องการด้านสิทธิเสรีภาพ และได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำดับ
3. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการวางแผนให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

Acute abdominal pain is a major problem which affect patients suffering physically, psychologically and socially and require assessment, diagnosis and treatment to reduce abdominal pain. The purposes of this study were to investigate and compare needs and need responses of patients with acute abdominal pain . The sample was 60 of acute abdominal pain patients who did not receive an operation, admitted to Fang hospital, Chiang Mai province. Data were collected during August 2006 to November 2006. The instrument used for data collection were needs and need responses interview forms, composed of the patient's demographic data forms, patient's diagnosis and treatment forms, needs and need responses interview forms which were developed by the researcher and advisory committee and modified from patient's need interview form in the emergency room by Soparat Prompuk (2005) based on the concepts of human needs by Yura and Walsh (1983) including reviewed literature. The content validity of the instrument was assessed by experts, the validities of needs and need responses interview forms were 0.94 and 0.94 respectively. The reliability was measured by using Cronbach's alpha coefficients. The reliabilities of needs and need responses interview forms were 0.97 and 0.97, respectively. Data were analysed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t- test.

The results of this study revealed that:

1. Total needs in acute abdominal pain patients were at a high level. The closeness needs was the highest followed by freedom needs and survival needs, respectively.
2. Total need responses in acute abdominal pain were at a high level. The closeness needs was the highest followed by freedom needs and survival needs, respectively.
3. There was no difference between needs and need responses in acute abdominal pain patients.

The results of this study could be used as the baseline data for nursing personnel to plan quality nursing care for increasing need responses of patients.