

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางผนวกที่	หน้า
ก51	ค่าเฉลี่ยของค่าเศษส่วนเหลือกำลังสองในการพยากรณ์ค่าด้านน้อยของข้อมูลที่เป็นช่วงด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีของ Yule-Walker ร่วมกับวิธีการแยกแบบ คิว อาร์ เพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกัน เป็นเวลานาน โดยใช้สมการพยากรณ์คือ $\hat{y}_t = \hat{\phi}_1 y_{t-1} + \hat{\phi}_2 y_{t-2} + \dots + \hat{\phi}_p y_{t-p} \dots\dots\dots$ 144
ก52	ค่าเฉลี่ยของค่าเศษส่วนเหลือกำลังสองในการพยากรณ์ค่าด้านมากของข้อมูลที่เป็นช่วงด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีของ Yule-Walker ร่วมกับวิธีการแยกแบบ คิว อาร์ เพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยใช้สมการพยากรณ์คือ $\hat{y}_t = \hat{\phi}_1 y_{t-1} + \hat{\phi}_2 y_{t-2} + \dots + \hat{\phi}_p y_{t-p} \dots\dots\dots$ 145
ก53	เวลาที่ใช้ในการดำเนินการพยากรณ์ข้อมูลที่มีวัฏจักรด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีกำลังสองน้อยสุด ร่วมกับวิธีเมตริกซ์ผกผัน เพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน..... 146
ก54	เวลาที่ใช้ในการดำเนินการพยากรณ์ข้อมูลที่มีวัฏจักรด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีกำลังสองน้อยสุดที่มีการถ่วงน้ำหนักแบบมีส่วนลด ร่วมกับ วิธีเมตริกซ์ผกผัน และวิธีปรับเรียบโดยตรง เปรียบเทียบกับ วิธีของ Yule-Walker เพื่อพยากรณ์ไป ข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน..... 147
ก55	ค่าเฉลี่ยของค่าเศษส่วนเหลือกำลังสองจากการพยากรณ์ข้อมูลที่มีวัฏจักรด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีแยกส่วนประกอบ และวิธี กำลังสองน้อยสุด ร่วมกับวิธีเมตริกซ์ผกผัน เพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน..... 148
ก56	ค่าเฉลี่ยของค่าเศษส่วนเหลือกำลังสองที่ได้จากการพยากรณ์ข้อมูลที่มีวัฏจักรด้วยตัวแบบ AR(p) เมื่อใช้วิธีกำลังสองน้อยสุดที่มีการถ่วงน้ำหนักแบบมีส่วนลดร่วมกับวิธีเมตริกซ์ผกผัน และวิธีปรับเรียบโดยตรง เปรียบเทียบกับวิธีของ Yule-Walker เพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าทีละหนึ่งช่วงเวลา แต่พยากรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน..... 145